







JANVIER 1914

LISTE DES GRAINES

OFFERTES PAR LE

JARDIN CORREVON

(Jardin alpin d'acclimatation)

Floraire — Chêne-Bourg, GENÈVE

31^{me} CATALOGUE DE GRAINES

Terrestria sidera, flores.



For English Customers

Orders and communications may be addressed to M. E.-W. Clayforth, Oak Mount, Higfield, Southampton. He will be able too to send catalogues and seedlist.

AVIS

La plupart des volumes de M. Correvon sont épuisés. Nous venons de retrouver 5 exemplaires du volume "Fougères rustiques" (6 fr.) qui nous a été fréquemment demandé et que nous avons dû refuser. Avis aux amateurs. Par contre, il est inutile de nous demander les ouvrages suivants : "Plantes des Alpes", "Album des Orchidées", "Flore coloriée" et sa traduction italienne. Voir pour de plus amples renseignements à la p. 3 de la couverture.

Le nouvel ouvrage de M. Correvon est annoncé par circulaire dans ce catalogue; c'est un résumé des ouvrages épuisés, sous le titre : "Les plantes des montagnes et des rochers", leur alimentation et leur culture dans les jardins. Treize chapitres dont un est le dictionnaire-vademecum du cultivateur de ces plantes et contient la liste de toutes les espèces introduites avec l'indication de leur indigénat, de l'époque de leur floraison, de la hauteur de la plante, couleur des fleurs et mode de culture. Un chapitre Fougères, un autre Orchidées rustiques; un sur les Cactées rustiques, un sur les Lys, etc.

Prix : 10 fr., port en sus.

12 kinds for	5 francs (4 sh.)
25 » »	10 » (8 sh.)
50 » »	20 » (16 sh.)
100 » »	40 » (32 sh.)

GRAINES DE PLANTES

DE

Montagnes et de Rochers, d'Arbustes de Rocailles

ET DE

PLANTES VIVACES

Pour simplifier, nous avons placé sous cette rubrique les graines reçues en 1913 du Canada, des Balkans, du Japon, de l'Himalaya, du Caucase, des Etats Unis, du Turkestan, d'Orient, des Canaries, des Carpathes, de Grèce, du Groënland, etc. La plupart de nos graines pourtant ont été récoltées par nous soit à Floraire, soit dans les Alpes en 1913.

Pour la première fois nous offrons quelques-unes de nos graines, celles qui sont le plus demandées et dont nous avons plus ample provision, au poids.

10 grammes (10 gr.) = $\frac{1}{3}$ once. 5 gr. = $\frac{1}{6}$ etc.

Toutes se vendent à raison de 50 cent., soit 5 d. le paquet :

Abutilon vitifolium.

Acæna australis.

- » *brevibracteata.*
- » *Buchanani.*
- » *cæsiiglauca.*
- » *glabra.*
- » *glaucophylla.*
- » *microphylla.*
- » *multiglomerulans.*
- » *myriophylla.*
- » *ovalifolia.*
- » *ovinamaxima.*
- » *sarmentosa.* 10 gr. 2 fr.
- » *sericea.*

Charmanes plantes gazonnantes propres à garnir les rocailles et les sous-bois.

Acantholimon Fomini.

- » *glumaceum.*
- » *graminifolium.*
- » *lepturoides.*
- » *tenuiflorum.*
- » *venustum.*

Acanthus mollis. 10 gr. 1 fr.

Acanthus spinosus. 10 gr. 1 fr.

Achillea abrotanoides.

- » *ageratifolia.*
- » *ageratum.* 10 gr. 2 fr.
- » *atrata.*
- » *carpathica.*
- » *Clavenæ.*
- » *Correvoniana.*
- » *fililoba.*
- » *filipendula.*
- » *herba Rota.*
- » *hybrida.*
- » *impatiens.*
- » *impunctata.*
- » *Kellereri.*
- » *ligustica.* 10 gr. 4 fr.
- » *lingulata.*
- » *macrophylla.* 5 gr. 2 fr.
- » *moschata.* 5 gr. 5 fr.

Achillea nana.

- » *Ptarmica « The Pearl ».*
- » *pyrenaica.*
- » *rupestris.*
- » *serbica.*

chillea serrata.
 » setacea, belle espèce basse à fl. jaune vif. 10 gr. 5 fr.
 » sibirica.
 » Taygetæa.
 » tomentosa.
 » umbellata.
 » Vandasii. 5 gr. 5 fr.
Aconitum anthora. 5 gr. 2 fr.
 » autumnale.
 » barbatum.
 » Cammarum. Belle plante vigoureuse et solide aux fleurs bleu violacé. 10 gr. 3 fr.
 » Columbianum.
 » ferox.
 » flavescens.
 » japonicum.
 » lycoctonum.
 » napellus. 10 gr. 2 fr.
 » » à fl. blanches.
 » » à fl. roses.
 » paniculatum. Espèce élancée, aux tiges étalées en candélabres.
 » pyrenaicum.
 » septentrionale.
 » tauricum.
 » umbrosum.
 » uncinatum.
 » variegatum.
 » » var. album.
 » Wilsoni, superbe esp. nouvelle. 5 gr. 5 fr.
Actæa rubra. 5 gr. 2 fr.
 » spicata. 5 gr. 2 fr.
Adenocarpus complicatus
Adenophora communis. 10 gr. 5 fr.
 » denticulata. 10 gr. 5 fr.
 » liliifolia. 10 gr. 5 fr.
 » » à fl. blanches.
 » polymorpha. 10 gr. 5 fr.
 » Potanini. 10 gr. 6 fr.
 » » alba.
 » stylosa.
 » verticillata (vrai). 5 gr. 5 fr.
 Les Adénophores sont des campanules gracieuses à floraison prolongée et très solides.
Adenostyles albifrons, 10 gr. 4 fr.
 » alpina, 10 gr. 4 fr.
 » Kernerii.
 » leucophylla, 10 gr. 5 fr.
Adonis apennina.
 » pyrenaica, 10 gr. 5 fr.
 Plante rare et belle, à floraison précoce.

Adonis vernalis. Grande Anémone à fl. d'or; Mars-Avril, 10 gr. 2 fr.
Aethionema armenum.
 » arabicum.
 » Cappadocicum.
 » cardiophyllum.
 » cordatum (*Eunomia cordata*).
 » coridifolium.
 » diastrophis.
 » gracilis.
 » grandiflorum, 10 gr. 8 fr.
 » ibericum.
 » persicum.
 » pulchellum.
 » rotundifolium.
 » saxatile, 10 gr. 4 fr.
 » schistosum.
 » stylosum.
 » Thomasianum (rarissime).
 » trinervium.
 Les Aethionèmes sont de jolies pl. naines à fl. générale-ment roses; abondante floraison; soleil.
Agrimonia repens.
Agrostemma coronaria (coquelourde), 10 gr. 1 fr.
Ajuga pyramidalis.
 » genevensis.
Akebia quinata, pl. grimpante.
Alchemilla alpina.
 » fissa.
 » Helvetica.
 » incisa.
 » Lapeyrousei.
 » splendens.
 » vulgaris.
Alfredia cernua.
 » nivea.
 » stenolepis.
Alhagi Camelorum.
Alkana orientalis (Bourrache jaune), 10 gr. 2 fr.
Allium neapolitanum.
 » odorum.
 » pedemontanum.
 » Schuberti.
 » Ursinum.
 » Victorialle (Herbe à 9 chemises).
Alsine austriaca.
 » Banatica.
 » caucasica.
 » cerastioides.
 » gerardi.
 » hirsuta.
 » imbricata.
 » Jacquinii.

Alsine juniperifolia.

- » *laricifolia.*
- » *liniflora.*
- » *pinifolia.*
- » *recurva.*
- » *Rosani.*
- » *setacea.*
- » *stricta.*
- » *tenuifolia.*
- » *verna.*
- » *villarsii.*

Althæa rosea (Rose trémière).

- » *fimbriata alba.*
- » à fl. simples, de toutes couleurs, 10 gr. 1 fr.
- » à fl. pleines, dans les plus belles variétés, 10 gr. 2 fr.
- » à fl. roses doubles, 10 gr. 2 fr.
- » à fl. jaunes doubles, »
- » à fl. noires, doubles, »
- » *Theresina.*

Les Passeroses sont des pl. vivaces d'ornement de premier ordre et de cult. facile.

Alyssum alpestre.

- » *amanum.*
- » *arenarium.*
- » *argenteum*, 10 gr. 1 fr. Bon à semer dans les grands rochers et les pentes sèches.
- » *calycarpum.*
- » *condensatum.*
- » *creticum.*
- » *cypriense.*
- » *gemonense.*
- » *halimifolium.*
- » *hirsutum* (récolté en Orient).
- » *idaeum.*
- » *leucadeum.*
- » *lucidum.*
- » *Mœllendorffianum.*
- » *montanum.*
- » *obovatum.*
- » *orientale.*
- » *ovirene.*
- » *petræum.*
- » *pyrenaicum.* 1 gr. 2 fr.
- » *rostratum.*
- » *saxatile*, 10 gr. 2 fr.
- » » *var. citrinum.*
- » » *var. compactum.*
- » *scardicum.*
- » *serpyllifolium*, 5 gr. 4 fr.
- » *spinosum speciosum*, 5 gr. 4 fr.
- » *stribnyi.*
- » *tortuosum.*
- » *transylvanicum.*
- » *Wiersbickii*, 10 gr. 1 fr.

Alyssum Wulfenianum.**Amelanchier canadensis.**

- » *rotundifolia.*
- » *utahensis.*
- » *vulgaris* (*arbre aux Edelweiss*)

Amphirapis albescens.**Amygdalus nana.****Amsonia latifolia**, 10 gr. 2 fr.

- » *salicifolia*, 10 gr. 2 fr.

Très jolies pl. de la famille des Pervenches.

Anagallis grandiflora (mouron à grandes fleurs) 5 gr. 1 fr.**Anchusa Barrelieri.**

- » *Droptmoreana*, 10 gr. 4 fr.
- » *italica*, 10 gr. 2 fr.
- » » *var. Opale.*
- » » *var. Lissadell.*
- » » *var. Perry.*

Bonnes Bourraches vivaces de grandes dimensions, aux innombrables fl. d'un bleu intense (Mai-octobre).

- » *officinalis.*

- » *sempervirens.*

Andrachne colchica.**Androsace albana.**

- » *arachnoidea.*
- » *Brigantiaca.*
- » *carnea*, 1 gr. 1 fr.
- » *chamaejasme.*
- » *Charpentieri.*
- » *Chumbyi.*
- » *ciliata.*
- » *cylindrica.*
- » *elongata.*
- » *foliosa.*
- » *glacialis*, 1 gr. 1 fr. 50.
- » *Halleri.*
- » *Hedreantha*, 5 gr. 5 fr.
- » *Helvetica*, 1 gr. 1 fr. 50
- » *hirtella.*
- » *imbricata* (*argentea*), 1 g. 1 f. 50.
- » *lactea.*
- » *Laggeri.*
- » *lanuginosa.*
- » *Mathildæ.*
- » *multiceps.*
- » *obtusifolia.*
- » *occidentalis.*
- » *oculata.*
- » *Pacheri.*
- » *primuloides.*
- » *pubescens.*
- » *pyrenaica.*
- » *sarmentosa.*
- » *sempervivoides.*
- » *septentrionalis.*

Androsace villosa.
 » *vitaliana*, 1 gr. 1 fr.
 » *Wulfeniana*.
Anemone albana.
 » *alpina*, 10 g. 2 fr., 100 g. 10 fr.
 C'est la grande et belle anémone à fl. blanches des régions alpines. On l'élève facilement de graines, mais celles-ci germent lentement.
 » *apennina*.
 » *Baikalensis*.
 » *Baldensis*, 10 gr. 4 fr.; 5 gr. 2 francs.
 » *canadensis*.
 » *cernua*.
 » *decapetala*.
 » *dichotoma*.
 » *globosa*.
 » *Halleri*.
 » *Hepatica* (Hépatique), 10 g. 4 f.
 » *japonica*.
 » *lactea*.
 » *Lyalli* (ex Canada).
 » *montana*, 10 gr. 2 fr.
 » *multifida*.
 » *narcissiflora*, 10 gr. 2 fr.
 L'une des plus faciles à cultiver, mais à germination lente; fl. roses en jolis bouquets dressés.
 » *narcissiflora* var. *villosa*.
 » *nigricans*.
 » *patens*.
 » *lutea*.
 » *pennsylvanica*.
 » *polyantha*.
 » *pratensis*.
 » *var. obsoleta*.
 » *propera*.
 » *pulsatilla*, 10 gr. 2 fr.
 » *var. alba*.
 » *Regeliana*.
 » *riparia*.
 » *rivularis*.
 » *rubra*, 10 gr. 2 fr.
 » *sulfurea*, la belle anémone soufrée des Alpes, 100 gr. 10 fr.; 10 gr. 2 fr.
 » *sylvestris*, 10 gr. 4 fr.
 Grande fl. blanche à reyers rose; pl. envahissante et de culture facile.
 » *sylvestris major*.
 » *trifoliata*.
 » *Udensis*.
 » *vernalis* (à fl. de soie et d'opale), 100 g. 15 f.; 10 g. 3 f.

Anémone virginica.
 » *vitifolia*.
Anemonopsis macrophylla.
Angelica Archangelica (*Angélique*).
 » *pyrenaica*.
Antennaria alpina.
 » *carpathica*.
 » *dioica*.
 » *monocephala*.
 » *plantaginea*.
 » *triplinervis*.
Anthemis aetnensis.
 » *carpathica*.
 » *cinerea*.
 » *Hausknechtii*.
 » *macedonica*.
 » *montana*.
 » *nobilis* (camomille romaine).
 » *petraea*.
 » *rigescens*.
 » *tenuifolia*.
 » *tinctoria*.
Anthericum ramosum. Petit lys blanc des rochers, très florifère.
Anthyllis montana, 10 gr. 4 fr.
 » *vulneraria*.
Antirrhinum asarina, 10 gr. 5 fr.
 Excellent pour les murs et rochers au soleil.
 » *gibraltaricum*.
 » *glutinosum*.
 » *majus*, type sauvage.
 » *(Muffler)*, 10 gr. 1 fr.
 » *albus*, 10 gr. 1 fr.
 » *atrosanguineum*, 10 gr. 2 fr.
 » *coralinum*, 10 gr. 2 fr.
 » *Lightrose*, 10 gr. 2 fr.
 » *sempervirens*.
 » *siculum*.
 » *tortuosum* (récolté dans les ruines romaines de Fréjus).
Aphyllanthes monspeliensis.
Aplopappus croceus.
 » *Parryi*.
Apocynum venetum.
Aponogeton dystachion (aquatique).
Aposeris foetida.
Aquilegia alba.
 » *grandiflora*.
 » *alpina*, 10 gr. 8 fr.; 1 gr. 1 fr.
 C'est la plus belle des Anco- lies; très grande fleur d'un azur intense. Récoltée dans les Alpes.
 » *arctica*.
 » *atrata*, 10 gr. 1 fr.
 » *baikalensis*.

Arter Ibericus.

- » *grandiflorus.*
- » *Paterissonii.*
- » *laevis.*
- » *Porteri* (ex Colorado) 10 g. 2 fr.
- » *Ptarmicoides.*
- » *Pseudo-Amellus.*
- » *pumilus.*
- » *pyreneus* (vrai).
- » *sericeus* (ex Colorado).
- » *sibiricus.*
- » *sikkimensis*
- » *simplex.*
- » *Townsendi.*
- » *trinervius.*
- » *turbinellus.*

Astilbe Davidi, 10 gr. 4 fr. : 5 gr. 2 fr.

Délicate panicule de fl. roses,
dressée en gros épis; pour lieux
humides.

- » *Japonica.*
- » *rivularis.*

Astragalus alopecuroides (vrai), 10 gr. 4 fr.

- » *alpinus.* 10 gr. 4 fr.
- » *angustifolius* (ex Oriens).
- » *aristatus*, 10 gr. 4 fr.
- » *cicer.*
- » *confirmans.*
- » *depressus.*
- » *galegiformis.*
- » *glyciphylloides.*
- » *juvenalis.*
- » *massiliensis.*
- » *maximus.*
- » *melilotoides.*
- » *monspessulanus*, 10 gr. 4 fr.
- » *Onobrychis.*
- » *pseudo-Onobrychis,*
- » *racemosus.*
- » *reflexistipulus.*
- » *sanguinolentus.*
- » *Sieversianus.*
- » *Transoxanus.*
- » *uliginosus.*

Astrantia bavarica.

- » *Biebersteinii.*
- » *carinthiaca.*
- » *carniolica.*
- » *gracilis.*
- » *helleborifolia.*
- » *major*, 10 gr. 2 fr.

Plante très montagnarde et
des plus facile à cultiver; l'une
des meilleures pl. mellilères.

- » *major* à fl. roses.
- » *minor.*
- » *neglecta.*

*Astrantia pauciflora.**Astrocarpus sésamoides.**Astydamia canariensis.**Athamantè cretensis.*

- » *Matthioli.*

Atragene alpina, 10 gr. 4 fr.

- » à fl. blanc pur.
- » à fl. rouges.

Atriplex hortensis.

- » *rosea.*

Atropa Belladona (*Belladone*).

- » à fruits jaunes.

Aubrietia antilibani.

- » *cilicica.*
- » *Columnæ.*
- » *deltoidea*, 10 g. 5 fr.; 5 g. 3 fr.
- » *D. Mules.*
- » *Eyrii.*
- » *erubescen* (ex mont Athos)
- » *græca.*
- » *Hendersonni.*
- » *Leichtlini.*
- » *libanastica.*
- » *Lilac Queen.*
- » *"Lloyd Edward"*
- » *Mauve Queen.*
- » *Moehreimi.*
- » *Olympica.*
- » *Pinardi.*
- » *purpurea.*
- » *Richardsoni.*
- » *violacea.*

Petites Crucifères vivaces for-
mant des tapis couverts de fl.
d'un lilas plus ou moins vil
suivant les espèces. Excellentes
pour les murailles.

Avena argentea.

- » *elator.*
- » *flavescens.*

Azalea mollis (var. anglaises).

- » *procumbens.*

*Ballota spinosa.**Banffia petræa.**Baptisia australis.* 10 gr. 1 fr.

- » *exaltata.*
- » *minor.*

Gros Lupins vivaces à fl.
bleues.

*Bartsia alpina.**Bellidiastrum Michelli.**Bellis cœrulescens.*

- » *integrifolia.*
- » *perennis.*
- » *sylvestris.*

Bellium bellioides.

- » *crassifolium.*
- » *minutum.*

- Berardia subacaulis*. Pl. très curieuse et très rare, récoltée dans la station classique du Haut Queyras, 5 gr. 3 fr.
- Berberis stenophylla*.
 » *Wilsoni*: le plus beau du genre, nouvellement introduit de l'Asie centrale.
 » *Yunnanenense*.
- Berkheya purpurea*.
 » *Adlami*.
- Berteroa incana*.
- Beta trigyna*.
- Betonica alopecurus*.
 » *grandiflora*, 5 gr. 2 fr.
 » *grandiflora superba*, 5 g. 2 f. 50.
 » *hirsuta*, 5 gr. 1 fr.
 » *macrostachya*.
 » *officinalis*, 5 gr. 1 fr.
 » » *alba*
 » *orientalis*.
 » *scardica*.
 » *stricta*.
- Betula nana*.
- Biebersteinia orphanidis*.
- Bigelowia graveolens*.
- Biscutella lævigata*.
 » *lucida*.
- Blitum capitatum*.
 » *virgatum* (Epinard-fraise), 10 gr. 2 fr.
 Plantes très curieuses, portant comme des fraises d'un vermillon très vif, à l'aisselle des feuilles.
- Bocconia cordata*.
 » *microcarpa*.
- Borago laxiflora*.
- Boykinia aconitifolia*.
 » *elata*.
 » *occidentale*.
 » *rotundifolia*.
- Brassica repanda*.
 » *Richeri*.
- Braya alpina*.
 » *pinnatifida*.
 » *supina*.
- Brickelia grandiflora*.
- Briza media*.
 » *lutescens*.
- Bromus squarrosus*.
 » *tectorus*.
- Budleya albiflora*.
 » *nivea*.
- Budleya variabilis*, 10 gr. 2 fr.
 Arbuste à croissance rapide, à floraison abondante (fleurs en grappes violet et or) et qu'on élève facilement de graines.
- Bulbocodium vernum*.
- Buphtalmum grandiflorum*, 5 gr. 2 fr.
 » *salicifolium*.
 » *speciosissimum* (très rare).
- Bupleurum falcatum*.
 » *fruticosum*.
 » *longifolium*.
 » *ranunculoides*.
 » *stellatum*.
- Caesalpinia Giliesi*.
 » *japonica*.
- Caccinia glauca*, 5 gr. 1 fr.
- Calamintha acynos*.
 » *alpina*.
 » *grandiflora*.
 » *Vuachensis*.
- Calandrinia compressa*.
 » *discolor*.
 » *grandiflora*.
 » *sedicea*.
 » *speciosa*.
 » *umbellata*.
- Calendula grandiflora*.
 » *sulfurea*.
 » à fl. pleines (soucis), 5 gr. 1 fr.
- Calceolaria pinnata*.
 » *polyrrhiza*.
- Calla palustris* (aquatique).
- Calliopsis* (*Coreopsis*) *versicolor*.
- Callirhoe pedata*.
 » *verticillata*.
- Caltha alpina*.
 » *leptosepala*.
 » *palustris*.
 » *polysepala*.
 » *radicans*.
- Calypso borealis* (ex Canada).
- Calystegia dahurica*.
- Camassia esculenta*.
- Camomille* (*v. Anthemis nobilis*).
- Campanula abietina*.
 » *acutangulare*.
 » *aggregata*.
 » *alaskana* (ex Canada).
 » *alliarifolia*, 10 gr. 2 fr.
 » *Allionii*, 10 g. 8 fr.; 5 g. 5 fr.
 » *alpina*.
 » *barbata*, 10 g. 5 fr.; 5 g. 3 fr.
 » à fl. blanches.
 » *Baumgartenii*.
 » *betonicaefolia*.
 » *bononiensis*.
 » *Burgalti*.
 » *cæspitosa*, 5 gr. 4 fr.
 » *cantburyana*, 5 gr. 3 fr.
 » *capitata*.

Campanula carnica.

- » *carpathica*, 10 gr. 1 fr.
- » » à fl. blanches 10 g. 1 f.
- » » à fl. lilas clair, 10 g. 2 f.
- » » var. *compacta*, 10 g. 2 f.
- » » var. *Dutton's blue*.
- » » var. *grandiflora*, 10 g. 4 f.
- » » var. *pelviformis*.
- » » *Riverslea*.

Le *C. carpathica* et ses variétés (faciles à élever de semis) sont d'excellentes pl. de rochers, de plate-bandes et de bordures; fleurissent de mai jusqu'en automne; grandes fl., violettes ou blanches; pl. basses et formant tapis.

- » *carpathica* × *pulla*.
- » *caucasica*.
- » *cenisia*.
- » *collina*.
- » *Correvoniana*.
- » *crispa*.
- » *cristallocalyx*, 5 gr. 2 fr.
- » *dahurica*.
- » *elatinoïdes*.
- » *ericalix*.
- » *eriocarpa*.
- » *excisa*.
- » *Fergusoni*.
- » *flexuosa*.
- » *fragilis*.
- » *garganica*.
- » *glomerata*.
- » » var. à fl. blanches.
- » » var. *acaulis*.
- » *grandis*.
- » » à fl. blanches.
- » *Grossekii*.
- » *Hohenackeri*.
- » *Imeritina*, 5 gr. 2 fr.
- » *incurva*.
- » *Kolenatiana*, 5 gr. 2 fr.
- » *lactiflora*, 5 gr. 3 fr.
- » *lamiifolia*, 5 gr. 2 fr.
- » *latifolia*, 5 gr. 2 fr.
- » » à fl. blanches.
- » » *alba grandiflora*.
- » *libanotica*.
- » *lingulata*.
- » *longistyla*.
- » *macrantha*, 10 gr. 2 fr.
- » » à fl. blanches.
- » *macrostachia*.
- » *macrorhiza*.
- » *medium*, type des Hautes-Alp.
- » *michauxioides*.
- » *médium*, des jardins.

Campanula mirabilis.

- » *multiflora*.
 - » *muralis* (*Portenschlagiana*).
 - » *nobili-macrantha*.
 - » *pelviformis*.
 - » *persicifolia*, 5 gr. 2 fr.
 - » » à fl. blanches.
 - » *petiolata*.
 - » *petraea*.
 - » *phytidocalix*.
 - » *primulæfolia*.
 - » *pulla*.
 - » *pulloides*.
 - » *punctata*.
 - » » var. à fl. blanches.
 - » *pusilla*, 5 gr. 3 fr.
 - » » var. à fl. blanches.
 - » » var. *Willmottiana*.
 - » *pyramidalis*, 10 gr. 4 fr.
 - » » à fl. bl., 5 g. f. 2.50.
 - » *Raddeana*.
 - » *Raineri* (ex *Alpi Bergamensis*), 1 gr. 1 fr.
 - » *rapunculus*.
 - » *rapunculoides*.
 - » *rhomboidalis*.
 - » » à fl. blanches.
 - » *rotundifolia*, 10 gr. 2 fr.
 - » » à fl. blanches.
 - » » *ruthenica*.
 - » *Sarmatica*, 10 gr. 2 fr.
- Très belle espèce voisine de *barbata*, facile à cultiver et très florifère.
- » *Saxifraga*, 1 gr. 1 fr.
 - » *Scheuchzeri*.
 - » » à fl. blanches.
 - » *Scouleri*.
 - » *sibirica*.
 - » *speciosa*, 1 gr. 1 fr.
 - » *spicata*, 5 gr. 3 fr.
 - » *spicato* × *thyrsoidæa*.
 - » *stenocodon*.
 - » *Steveni*.
 - » *subpyrenaica*, 5 gr. 2 fr.
 - » *Tenorii*.
 - » *thyrsoidæa*, 5 gr. 3 fr.
- Belle espèce montagnarde à fl. jaunes.
- » *tomentosa*.
 - » *Tommasiniana*.
 - » *Trachelium*, 5 gr. 2 fr.
 - » » à fl. bl., 5 gr. 2 fr.
 - » » à fl. doubl., 5 g. 2 fr.
 - » *turbinata*, 5 gr. 2 fr.
 - » » à fl. blanch., 5 g. 2 fr.
 - » *tyroliensis*.
 - » *uniflora* (ex *Laponia*).

Campanula urticifolia, 5 gr. 2 fr.

- » *Valdensis*.
- » *Vanneri*, 1 gr. 1 fr.
- » *velutina*.
- » *Venzloi*.
- » *versicolor*.
- » *Vidali*.
- » *Waldsteiniana*.
- » *Wilsoni*.
- » *Zoyzii*.

Les *Camp.* sont faciles à élever par semis. Les espèces les plus faciles, les plus florifères et les plus jolies sont : *Alliariaefolia*, *carpathica*, *eryocarpa*, *lactiflora*, *persicifolia*, *pusilla*, *sarmatica* et *turbinata*. Les *alliariaef.* et *nobilis* sont à fl. blanches, *thyrsoidæa* à fl. jaunes et les autres à fl. lilas plus ou moins foncé, sauf leurs var. à fl. blanches. Toutes fleurissent dans l'été, à partir de la fin de mai, et sont excellentes pour les rocailles ou la platebande.

Canarina campanula.

Capparis rupestris (*Câprier*).

Capsella pauciflora (rare).

Caragana Altagana.

Cardamine alpina.

- » *asarifolia*.
- » *chenopodifolia*.
- » *glauca*.
- » *Jezoensis*.
- » *macrophylla*.
- » *resedifolia*.
- » *sibirica*.

Carduus acanthoides.

- » *aurisocus*.
- » *deffloratus*.
- » *eriocephalus*.
- » *nutans*.

Carex atrata.

- » *Baldensis*.
- » *bicolor*.
- » *Buchanani* (à verdure brune).
- » *flava*.
- » *Grayi*.
- » *nigra*.

Carlina acanthifolia, 10 gr. 3 fr.; 5 gr. 2 fr.

- » *acaulis*, 10 gr. 3 fr.; 5 gr. 2 fr.
- Ce sont les superbes chardons d'argent qui, l'automne, animent les pentes de nos monts, où ils forment des touffes naines d'une grande beauté.
- » *vulgaris*.

Castilleja angustifolia.

- » *lutea*.

Catananche coerulea.

Cathcartia villosa.

Cedronella triphylla.

Celmisia coriacea (ex Nov. Zeland).

Celsia acaulis.

- » *betonicaefolia*, 10 gr. 1 fr.
- » *Coromandelica*.
- » *orientalis*.

Centaurea alpina.

- » *axillaris*.
- » *Babylonica*.
- » *cyanus variabilis* (bleuet en mélange), 5 gr. 1 fr.
- » *dealbata*.
- » *deusta*.
- » *lutea*.
- » *macrocephala*.
- » *monantha*.
- » *montana*.
- » » (à fl. blanches).
- » *nervosa*.
- » *orientalis* (à fl. jaunes).
- » *præalta*.
- » *Ruthenica* à fl. jaune citron.
- » *uniflora*.

Centranthus angustifolius, 10 gr. 2 fr.; 5 gr. 1 fr.

Excellente pour garnir les éboulis pierreux.

- » *longiflorus*.
- » *ruber* (*Valér. rouge des murs*), 10 gr. 2 fr.; 5 gr. 1 fr.
- » » à fl. blanches, 10 gr. 2 fr.; 5 gr. 1 fr.
- » » *atrorubens* (rouge sang), 10 gr. 2 fr.; 5 gr. 1 fr.

Les *Centranthus* ou *Valériane* des murs sont recommandables comme pl. de haute décoration pour la garniture de platebandes, des grands rochers, des murailles surtout. Elles fleurissent abondamment de juin jusqu'en hiver et font un tableau merveilleux dans un paysage.

Cephalaria alpina, 10 gr. 2 fr.

- » *leucantha*.
- » *uralensis*.

Grandes scabieuses jaunes aux formes architecturales.

Cerastium album.

- » *alpinum*.
- » *argenteum*.
- » *Biebersteini*.
- » *carinthiacum*.

Cerastium chloræfolium.

- » *columnæ.*
- » *fontanum.*
- » *glaciale.*
- » *glandulosum.*
- » *grandiflorum.*
- » *illyricum.*
- » *lanatum.*
- » *Lerchenfeldianum.*
- » *lineare.*
- » *tomentosum (ex Græcia).*
- » *uniflorum.*
- » *uralensis.*
- » *villosum.*
- » *vulgatum.*

Ce sont de petites pl. traînantes aux innombrables fl. blanches formant de solides gazons.

Cerinth alpine.

- » *minor.*

*Chamæmelon caucasicum.**Chamæpeuce casabone.*

- » *diacantha.*

*Chamænerium latifolium (ex Groënlandia).**Chænostoma polyantha.*

- » *fastigiata.*

Cheiranthus Allionii, sorte de giroflée odorante aux fleurs du plus bel orangé, se succédant de Juin à fin Novembre; pl. de grand effet; 10 gr. 2 fr.; 5 gr. 1 fr.

- » *Allionii grandiflorus.*
- » *Cheiri. (Giroflée des murs).*
- » » var. des jardins, Giroflée jaune ou Violier des murs. Les var. suivantes : *Aurora*, *grandiflora*, jaune double, parisienne hâtive, *Tom Pouce* en mélange, *Vulcain* et *White Gem*, à 50 cent. le paquet, 1 fr. le gr.

- » *Kewensis.*

- » *mutabilis.*

- » *nanus.*

Chelidonium Franchetianum.

- » *laciniatum.*
- » *lasiocarpum.*

Chelone barbata, 10 gr. 2 fr. 5 gr. 1 fr.

- » » *hybrida*, 5 gr. 2 fr.
- » *coloradensis.*
- » *glabra.*

Chenopodium Bonus Henricus (Epinaud des Alpes) 10 gr. 2 fr.*Cherleria sedoides.**Chicorium Intybus.*

- » » à fl. blanches.

*Chionodoxa Boissieri.**Chrysanthemum alpinum.*

- » *arcticum.*
- » *cappadocium.*
- » *carinatum*, *Chrysanth.* annuel en mélange.
- » *caucasicum.*
- » *ceratophylloides.*
- » *cinerariæfolium.*
- » *coronopifolium.*
- » *lacustre.*
- » *macrophyllum.*
- » *maximum.*

*Chrysanthemum uliginosum.**Chrysopsis foliosa.*

- » *villosa.*

Chrysosplenium flagelliforme.

- » *oppositifolium.*

Cimicifuga foetida.

- » *cordifolia.*
- » *racemosa.*

Cineraria aurantiaca.

- » *campestris.*
- » *maritima.*
- » *suaveolens.*

Cirsium Eriophorum.

- » *Erysithales.*
- » *ferox.*
- » *heretophyllum.*
- » *lanceolatum.*
- » *monspessulanus.*
- » *oleraceum.*
- » *spinosissimum.*

Cistus albidus.

- » *corsicus.*
- » *creticus.*
- » *crispus.*
- » *cyprius.*
- » *incanus.*
- » *ladaniferus.*
- » *ladaniferus* × *villosus.*
- » *laurifolius.*
- » *monspeliensis.*
- » *purpureus.*
- » *salviæfolius.*
- » *villosus.*

Clarkia elegans, fl. pl. en mélange (annuelle), 5 gr. 1 fr.*Claytonia asarifolia.*

- » *parviflora.*
- » *perfoliata.*
- » *sibirica.*
- » *virginiana.*

Clematis Buchanani.

- » *Douglasi (ex America).*
- » *graveolens (fl. jaunes).*

Clematis flammula (liane de neige).

- » *Fremonti.*
- » *integrifolia.*
- » *ligusticifolia.*
- » *montana.*
- » « var. *rosea.*

- » *recta.*
- » *recta purpurescens.*
- » *stans.*
- » *Tangutica.*
- » *tubulosa.*
- » *verticillaris.*
- » *virginiana.*
- » *vitalba.*
- » *viticella.*

Clintonia borealis.

- » *uniflora* (ex America).

Cneorum tricocum.

Cochlearia danica.

Codonopsis lanceolata.

- » *ovata.*

Colletia chilensis.

- » *sylvestris.*
- » *Tanghu.*
- » *viridiflora.*

Collomia grandiflora.

Collusia geoides.

Coluteocarpus reticulatus.

Comarum palustre.

Convallaria majalis (*Muguet*).

Convolvulus altheoides.

- » *aureus superbus.*
- » *cantabricus.*
- » *mauritanicus.*
- » *tricolor* (annuel), (Belle de jour), 10 gr. 1 fr.

Coreopsis grandiflora, 10 gr. 2 fr.

- » *lanceolata.*
- » *palmata.*
- » *tripteris.*

Coris monspeliensis.

Cornus canadensis.

- » *florida.*
- » *suecica* (Norvège).

Coronilla cappadocica, 10 gr. 4 fr.

- » *coronata.*
- » *emeroides.*
- » *Emerus.*

- » *montana*, 10 g. 2 fr., 5 g. 1 fr.
- » *varia*, 10 gr. 2 fr., 5 gr. 1 fr.

Corrigiola telephiifolia.

Cortusa hirsuta.

- » *Matthioli.*
- » « *grandiflora.*
- » *pubens.*
- » *villosa.*

Corydalis australis.

- » *bulbosa* (cava), 10 gr. 3 fr.

Corydalis cheilanthisifolia.

- » *glauca.*
- » *Halleri.*
- » *lutea.*
- » *nobilis.*
- » *ochroleuca.*
- » *ophiocarpa.*
- » *rupestris.*
- » *solida.*
- » *thalictrifolia.*
- » *tomentella.*
- » *tuberosa* (excellente pl. d'ombre), 10 gr. 3 fr.
- » *vaginans.*

Cosmos sulfureus.

Cotoneaster adpressa (espèce naine et de rocaille).

- » *applanata.*
- » *congesta.*
- » *Davidiana* (*horizontalis*), 10 gr. 1 fr.
- » *depressa*, très nain et rampant.
- » *Franchetti.*
- » *frigida.*
- » *laxiflora.*
- » *microphylla* 10 gr. 1 fr.
- » *nummularia.*
- » *pannosa*, 10 gr. 1 fr.
- » *sinensis.*
- » *tomentosa*, 10 gr. 1 fr.
- » *vulgaris*, 10 gr. 1 fr. Excellents arbustes p rocailles.

Cotyledon (*Umbilicus*) *chrysanthus.*

- » *ciliolatus.*
- » *erectus.*
- » *oppositifolius.*
- » *platyphyllus.*
- » *Sempervivum* (*Sedum sempervivum*).
- » *spinosus.*
- » *umbilicus.*

Crambe cordifolia.

- » *grandiflora.*
- » *Kotschyana.*
- » *maritima.*
- » *orientalis.*
- » *tatarica.*

Crepis aurea.

- » *blattarioides.*
- » *micrantha.*
- » *montana.*
- » *pygmæa.*
- » *rubra.*
- » *sibirica.*
- » *Terglouensis.*

Crocus vernus.

Crucianella stylosa (fl. roses très abondantes).

Crucianella stylosa à fl. carmin.

Crythmum maritimum.

Cuphæa lanceolata.

» *miniata*.

Cyananthus lobatus.

Cyclamen coum.

» » à fl. blanches.

» *hederæfolium*.

» » à fl. blanches.

» *ibericum*.

» *latifolium*.

» *libanoticum*.

» *repandum*.

Cynoglossum nervosum.

Cypella Herberti.

Cypripedium calceolus.

» *venticosum*.

Cytisus albus.

» *argenteus*.

» *austriacus*.

» *biflorus*.

» *capitatus*, 10 gr. 1 fr.

Excellent arbrisseau de 1 m.

à 1 m. et demi, qui se recouvre

de fleurs jaunes pendant une

bonne partie de l'année

» *filipes* (ex. Ins. Canar.).

» *Laburnum*, 10 gr. 1 fr.

» *nigricans*, 10 gr. 1 fr.

» *radiatus*, 10 gr. 1 fr.

(Délicieux petit arbuste bas

aux rameaux étalés, propre à

garnir les rocailles).

» *scoparius*.

» *sessilifolius*.

» *Shipkænsis*.

» *stenopetalus* (ex Ins. Canar.)

» *supinus*.

Daphne alpina.

» *altaica*.

» *caucasica*.

» *cneorum*.

» *Gnidium*.

» *Laureola*.

» *mezereum*, 10 gr. 1 fr.

» » à fl. blanches.

» *oleoides*.

» *Philippi*.

» *pontica*.

» *pseudo-mezereum*.

» *striata*.

Datisca cannabina.

Datura stramonium, 10 gr. 1 fr.

Delphinium Ajacis (annuel), var. mélang., 10 gr. 2 fr.

» *azureum*.

» *Belladonna*.

» *Brunonianum*.

Delphinium californicum.

» *cachemirianum*.

» » *atropurpureum*.

» » à fl. blanches.

» » var. mélangées.

» *cardinale*.

» *caucasicum*.

» *chinense*. Esp. superbe à fl.

d'un bleu très pur; 10 gr.

4 fr.

» *conspicuum*.

» *elatum* (type).

» *formosum*, 10 gr. 3 fr.

» » *cœlestinum*.

» *Geyeri*.

» *grandiflorum*, 10 gr. 2 fr., 5 gr.

1 fr.

» *grandiflorum* var. *album*.

» » var. *azureum*.

» » var. *compactum*.

» » var. *roseum*.

» » var. *Tom Thumb*.

» *hybridum*, mélange des meil-

leures variétés, 10 gr. 2 fr.,

5 gr. 1 fr.

Delphinium hybridum, fl. pl.

» » *Diana*, fl. pl.

» » *Perfection*, fl. pl.

» » "Prince of Wales".

» *Lugdunum*.

» *nudicaule*.

» *occidentale*.

» *puniceum*.

» *Requienii*.

» *scapulorum*.

» *sulfureum* (Zalil), à fl. jaunes.

» *superbissimum*.

» *Tatsuense*.

» *Thunbergi*.

» *tirolense*.

» *triste*.

» *trolliifolium*.

» *vestitum*.

Dentaria bulbifera.

Desmodium penduliflorum.

» *pinnata*.

Dianthus acaulis.

» *alpestris*.

» *alpinus*.

» *arenarius*.

» *aridus*.

» *armeria*.

» *arvernensis*.

» *asper*.

» *atrorubens*.

» *barbatus* (Oeillet des poètes),

» *albus*.

» » *atrococcineus*.

Dianthus barbatus, variétés en mélange.

- » 10 gr. 3 fr.
 - » *bicolor*.
 - » *brevicaulis*.
 - » *cæsius*.
 - » *caesio* × *Plumarius*.
 - » *capitatus*, 10 gr. 3 fr., 5 gr. 2 fr.
 - » *cärthusianorum*. Le joli petit œillet rose vif des pentes sèches, 10 gr. 3 fr., 5 gr. 2 fr.
 - » *caucasicus*.
 - » *chinensis*, var. en mélange, 10 gr. 2 fr.
 - » *chinensis laciniatus*, en mél., 10 gr. 2 fr.
 - » *controversus*.
 - » *corsicus*.
 - » *crinitus*.
 - » *cruentus*.
 - » *Cyri*.
 - » *deltoides*, 10 gr. 2 fr.
 - » *albus*.
 - » *superbus*, 10 gr. 3 fr.
- Le *D. deltoides* est une esp. tapissante et naine. très florifère et solide, de cult. facile.
- » *dentosus*.
 - » *diadematus*.
 - » *Falconeri*.
 - » *fimbriatus*.
 - » *fragrans*, 10 gr. 3 fr.
 - » *Freynii*.
 - » *frigidus*.
 - » *furcatus*.
 - » *gallicus*, tardif, à parfum suave.
 - » *giganteiformis*.
 - » *glacialis*.
 - » *glutinosus*.
 - » *graniticus*.
 - » *Holzeri*.
 - » *Hungaricus*.
 - » *integer*.
 - » *Kamtschaticus*.
 - » *Liburnicus*.
 - » *monspessulanus*, 1 gr. 1 fr.
 - » *montanus*, 10 gr. 3 fr., 5 gr. 2 fr.
 - » *neglectus*.
 - » *Orestis*.
 - » *pallens*.
 - » *pelviformis*.
 - » *petraeus*.
 - » *pinifolius*.
 - » *Plumarius*, 10 gr. 1 fr.

L'une des meilleures pl. à borduré et aussi l'une de celles qui garnissent le mieux les rocs, les sommets des murs,

les pentes arides au soleil; flor. prolongée et abondante; fl. très odorantes.

Dianthus Plumarius variété *candidus*, 10 gr. 2 fr.

- » *Plumarius* var. *bicolor*, idem.
- » *Plumarius* var. *Cyclope*, 10 gr. 3 fr.
- » *Plumarius* var. *floribundus*, 10 gr. 2 fr.
- » *Plumarius* var. *grandiflorus*, id.
- » » » *hortensis*, idem.
- » » » *laciniatus*, id.
- » » » *lilacinus*, idem.
- » » » *maximus*, idem.
- » » » *nanus*, idem.
- » » » *robustus*, idem.
- » » » *suaveolens*, id.
- » » » *zonatus*, idem.
- » variété à fl. pleines, 10 gr. 5 fr.

Ces variétés d'œillets rampants sont excellentes pour former des bordures, garnir des talus secs et le sommet des murs.

- » *polycladus*.
- » *puberulus*.
- » *pungens*.
- » *pyridicola*.
- » *Requini*.
- » *Seguieri*.
- » *speciosus*.
- » *spinosus*.
- » *squarrosus*.
- » *Sternbergi*.
- » *striatus*.
- » *subacaulis*.
- » *subfastigiatus*.
- » *superbus*.
- » » var. *albus*.
- » » var. *nanus*.
- » *sylvaticus*.
- » *sylvestris*, 5 gr. 3 fr.
- » *tener*.
- » *vaginatus*.
- » » *roseus*.
- » *Velenowskyi*.
- » *versicolor*.
- » *virgineus*.
- » *viscidus*.
- » *wimmeri*.

Les œillets, surtout dans le groupe des *Plumarius*, sont excellents pour garnir les lieux arides et ensoleillés; ils se contentent de peu et donnent avec abondance de délicieuses fl.

odorantes; tous s'élèvent facilement de semis.

Dicentra formosa (ex Canada).

Dichondra repens.

Dictamnus albus.

» *Fraxinella*.

Digitalis ferruginea.

» *grandiflora*, 10 gr. 2 fr., 2 gr. 1 fr.

» *lutea*, 10 gr. 2 fr., 5 gr. 1 fr.

» *mædia*.

» *ochroleuca*.

» *orientalis*.

» *persiflora*.

» *purpurea*, 10 gr. 2 fr., 5 gr. 1 fr.

» » à fl. blanches.

Ce sont des pl. solides, à flor. prolongée; cult. très facile.

Dimorphotheca aurantiaca, 1 gr. 1 fr.

Dioscorea caucasica.

» *pyrenaica*.

Diospyros kaki (type ex Japon).

Diphylleia cymosa.

Dipsacus asper.

Dodecatheon integrifolium.

» *Mædia*.

» *pauciflorum*.

» *radicatum*.

Doronicum austriacum.

» *corsicum*.

» *excelsum*.

» *hirsutum*.

» *hybridum*.

» *Pardalianches*.

Dorycnium herbaceum.

» *ibericum*.

» *suffrutescens*.

Downingia pulchella (ex America).

Draba affinis.

» *aizoides*, 1 gr. 1 fr.

» » v. *grandiflora*.

» *alpina*.

» *altaica*.

» *arabisans*.

» *armata*.

» *athoa*.

» *aurea*.

» » *grandiflora*.

» *australis*.

» *borealis*.

» *bronchialis*.

» *brunifolia*.

» *cadmea*.

» *cappadocica*.

» *carinthiaca*.

» *chamæjasme*.

» *contorta*.

» *corsica*.

Draba cuspidata.

» *dichranoides*.

» *Fladnizensis*.

» *frigida*.

» *glacialis*.

» *Haynaldi*.

» *hispanica*.

» *incana*.

» *Johannis*.

» *Kotschy*.

» *lactea*.

» *lasiocarpa*, 1 gr. 1 fr.

» *laxa*.

» *Lereschei*.

» *longirostra*.

» *nivalis*.

» *olympica*.

» *pynosperma*.

» *pyrenaica* (*Petrocalis*), 1 gr. 1 fr. 50.

» *repens*, 1 gr. 1 fr.

» *rigida*.

» *rupestris*.

» *Sauteri*.

» *Scandinavica*.

» *stellata*.

» *streptocarpa*.

» *subamplexicaulis*.

» *Thomasii*.

» *tomentosa*.

» *Traunsteineri*.

» *tridentata*.

» *vesicaria*.

Dracocephalum argunense.

» *austriacum*, 5 gr. 3 fr.

» *botryoides*.

» *canariense*.

» *integrifolium*.

» *nutans*.

» *peregrinum*.

» » à fl. blanches.

» *Ruprechtii*.

» *Ruyschianum*, 5 gr. 2 fr.

» *speciosum*.

» *thymifolium*.

» *turkestanicum*.

Dryas Drummondii.

» *integrifolia* (ex Groënland).

» *lanata*, 5 gr. 5 fr.

» *octopetala* (*Dryade*), 10 gr. 5 fr.

L'une des plus gracieuses pl. tapissantes pour rochers; grandes fl. blanches; semis facile.

Drypis Jacquinianus.

» *spinosus*.

Echinacea intermedia, 10 gr. 4 fr.

» (*Rudbeckia*) *purpurea*, 10 g. 2 f.

Echinacea purpurea nana.

» » *splendida.*

Les *Echinacea* sont d'excellentes pl. vivaces à gros capitules rouge carmin, excellentes pour la fleur coupée et fleurissant de juillet en décembre.

Echinops niveus.

» Ritro (chardon bleu sphérique du Dauphiné) récolté en Queyras, 10 gr. 2 fr.

» Ritro Floraire, 10 gr. 2 fr.

» *sphærocephalus*, 10 gr. 2 fr.

Echium petraeum (Lithospermum petraea), 5 gr. 5 fr.

» *Bourgeanum.*

» *Moltkia petraea.*

» *simplex.*

Edelweiss (voir *Leontopodium*).

Edrayanthus (Hedraeanthus) bosniacus.

» *carcinus.*

» *caudatus.*

» *croaticus.*

» *dalmaticus*, 1 gr. 1 f.

» *dinaricus.*

» *graminifolius*, 1 gr. 1 f.

» *Kitaibelii.*

» *pumilio.*

» *pumiliorum.*

» *serpyllifolius.*

» *tenuifolius*, 1 gr. 1 f.

Elaeagnus argentea, 5 gr. 1 f.

Elymus canadensis.

Empetrum nigrum.

Ephedra altissima, 5 gr. 2 f.

» *distachya*, 5 gr. 3 f.

» *fragilis.*

» *Helvetica*, 5 gr. 2 f.

L'une des pl. les plus curieuses de la flore suisse.

Epilobium abyssinicum, 10 gr. 4 f.

Grande pl. à grands fl. carmin très vif.

» *alpinum.*

» » *anagallifolium.*

» *angustifolium.*

» » à fl. blanches.

» *Fleischeri*, 5 gr. 3 f.

» *frigidum.*

» *glabellum.*

» *Hectori.*

» *hirsutum*, 10 gr. 4 f.

» » à fl. blanches.

» *latifolium.*

» *luteum.*

» *nummulariaefolium.*

» *obcordatum.*

Epilobium origanifolium.

» *pedunculare.*

» *pubens.*

» *rosmarinifolium*, 10 gr. 3 f.

Excellente espèce propre à garnir les lieux arides, fl. rose et carmin.

Epipactis palustris.

Eranthis cilicica.

» *yemalis.*

Eremurus altaicus.

» *Bungei.*

» *caucasicus.*

» *Elwesianus.*

» *Himalaicus.*

» *Him-robustus.*

» *inderiensis.*

» *Kaufmannicum.*

» *marginatus.*

» *multiflorus.*

» *robustus.*

» *spectabilis.*

» *tauricus.*

» *turkestanicus.*

Erica stricta, 10 gr. 5 f.

Bruyère corse arborescente, formant dans le jardin de superbes buissons qui se couvrent de fleurs roses tout l'été; esp. résistant aux sols calcaires et à nos hivers.

» *tetralix.*

Erigeron alpinus.

» *armeriaefolius.*

» *aurantiacus.*

» *caucasicus.*

» *compositus.*

» *Coulteri.*

» *elation.*

» *elatius grandiflorus.*

» *flagellaris.*

» *glabellus*, 10 gr. 2 f.

Très voisine de l'aster des alpes.

» *glaucus.*

» *leiomerus.*

» *macranthus.*

» *montanensis.*

» *neo-mexicanus.*

» *oreganum.*

» *Philadelphicus.*

» *pulchellus.*

» *roseus.*

» *rupestris.*

» *salsuginosus.*

» *speciosus*, 10 gr. 2 f.

Excell. pl. vivace, à grands capitules lilas foncé autour

d'un disque d'or; juin-automne.

Eremurus trifidus.

» *uniflorus*.

» *Villarsii*.

Erinacea pungens.

Erinus alpinus, 1 gr. 1 f. 50.

» » à fl. blanches.

» *hirsutus*, 1 gr. 1 f. 50.

» » à fl. blanches.

» *hispanicus*.

» *roseus*.

Très jolies petites pl. à semer dans les vieux murs ou les rochers au soleil.

Eriogonum arboreum.

» *flavum*.

» *racemosum*.

» *umbellatum*.

Eriophorum angustifolium.

» *latifolium*.

» *Scheuchzeri*.

» *vaginatum*.

Eriophyllum caespitosum.

Eritrichium nanum (Roi de l'Alpe).

Erodium absinthoides.

» *amanum*.

» *cheilanthifolium*.

» *corsicum*.

» *daucoides*.

» *Guicciardi*.

» *hymenodes*, 1 gr. 1 f.

Erodium macradenum, 1 gr. 1 f.

» *Manescavi*, 10 gr. 5 fr., 5 gr. 3 fr.

L'une des meilleures pl. de roc. fleurissant tout l'été et l'automne. Grandes et belles fl. carmin vif.

» *oxyrynchus*.

» *Romanum*.

Erpetion reniforme.

Eryngium alpinum (*Panicaut* ou *Chardon bleu des Alpes*); 10 gr.

4 f.; 5 gr. 2 f.

» *amethystinum*, 10 gr. 3 f.; 5 gr. 2 f.

» *Bourgati* (**Le superbe Chardon bleu des Pyrénées**), 10 gr. 4 f.; 5 gr. 2 f.

» *cæruleum* (chardon bleu grec) esp. de gros effet (août-octobre), à semer ou planter dans les sols arides et les pentes ensoleillées; 10 gr. 2 fr.

» *Davosianum* (C'est la variété très foncée de l'*E. alpinum*).

» *Florariensis*.

» *album*.

Eryngium giganteum (chardon bleu du Caucase); 10 gr. 2 f.

» *maritimum*.

» *multifida*.

» *Olivierianum*.

» *planum* (chardon bleu de l'Atlas); 10 gr. 2 fr.

» *serbicum* (vrai), 5 gr. 3 f.

» *Spinalba* (c'est le superbe et rare chardon bleu des Hautes-Alpes), 10 gr. 5 f.

» *tripatitum*.

» *Zabeli*.

Erysimum Allionii (*Cheiranthus*); 10 gr. 2 f.; 5 gr. 1 f.

Plante excellente à floraison prolongée; fl. orangé très vif; parfum suave; culture extra facile.

» *cheiranthoides*.

» *Helveticum*, 10 gr. 2 f.; à semer dans les talus arides.

» *leptophyllum*.

» *nanum*, 10 gr. 2 f.

» *ochroleucum*.

» *odoratum*.

» *pachycarpum*.

» *pulchellum*.

Très jolie pl. rampante à fl. jaune vif; floraison prolongée; cult. facile; 10 gr. 3 f., 5 gr. 2 f.

» *pumilum*.

» *purpureum*.

» *Rhæticum*.

Erythræa centaureum.

» *alba*.

» *diffusa*.

» *gothica*.

» *latifolia*.

» *linarifolia*.

» *littoralis*.

» *ramosissima*.

» *Rumelica*.

Erythronium Johnsoni.

Eschscholzia aurantiaca.

Plante bisannuelle naine qui se resème d'elle-même avec abondance et donne toute l'année et jusqu'en hiver de grandes fl. de pavots d'un orangé très vif; 10 gr. 2 f.

» *californica*, 10 gr. 2 f.

» *var. alba*.

» *carmin*.

» *cinabre*.

» *glauca*.

Eupatorium ageratoides, 5 gr. 2 f.

» *cannabinum album*, 5 gr. 2 f.

- Eupatorium serotinum.*
 » *verticillatum.*
- Euphorbia altissima.*
 » *bimaculata.*
 » *canescens.*
 » *Characias.*
 » *Dendroides.*
 » *Gerardiana.*
 » *Kotschyana.*
 » *Lathyris.*
 » *Myrsinites.* Excellente pl. à semer dans les endroits arides et secs; 10 gr. 2 fr.
 » *pilosa.*
 » *polychroma.*
 » *robusta.*
 » *songarica.*
 » *spinosa.*
 » *Wulfeni.*
- Euphrasia lutea.*
 » *minor.*
 » *montana.*
- Euryangium Sumbul.*
- Falcaria latifolia.*
 » *Rivini.*
- Falkia repens.*
- Farsetia eriocarpa,* 10 gr. 4 f., à semer dans les lieux arides.
 » *triquetra* (rare).
- Ferula Asa foetida.*
 » *communis.*
 » *Jaeskeana.*
 » *oopoda.*
 » *Orientalis.*
 » *Tetenema.*
 Grandes ombellifères au feuillage finement divisé et hautement décoratives.
- Festuca alpina.*
 » *flavescens.*
 » *glauca.*
 » *valesiaca.*
 » *violacea.*
 Petits gazons des montagnes à feuillage fin.
- Fragaria Daltoniana.*
 » *indica.*
 Fraisier retombant, à fl. jaunes.
 » *mexicana.*
 » *monophylla.*
 » *roseiflora.*
- Francoa appendiculata.*
 » *sonchifolia.*
- Frasera speciosa.*
- Fritillaria askabadensis.*
 » *delphinensis,* de la station classique du Queyras, 5 gr. 4 f.
- Fritillaria imperialis* (couronne impériale).
 » *Meleagris.*
 » *pallidiflora.*
- Fumana procumbens.*
- Funkia coerulea.*
 » *cordata.*
- Gagea lutea.*
- Galanthus nivalis.*
- Galatella incisa.*
- Galax aphylla.*
- Galega officinalis.*
 » *alta.*
 » *orientalis.*
 » *persica.*
- Gaillardia aurantiaca.*
 » *grandiflora,* 5 gr. 1 f.
 Belle pl. vivace à très grandes fl. de soleil, rouge et jaune; grand effet; cult. facile.
- Galium Mollugo.*
 » *purpureum.* Très précieuse pl. d'ornement p. rochers et jardins alpins; gazon fin, fl. d'un brun noir, 5 gr. 2 f.
 » *tenue.*
- Galtonia candicans* (Jacynthe du Cap).
- Gaura coccinea.*
 » *Lindheimeri.* Pl. vivace à longs épis défil. rose chair, excellente p. la fleur coupée; 10 gr. 2 f.
- Gaya simplex.*
- Genista aetnensis.*
 » *Andreana.*
 » *anglica.*
 » *cinerea.*
 » *germanica.*
 » *horrida.*
 » *juncea,* 10 gr. 1 f.
 Le brillant Genêt jaune d'Espagne, l'un de nos meilleurs et plus solides arbustes.
 » *pilosa.*
 » *radiata,* 10 gr. 1 fr.
 Petit arbuste nain très propre à décorer les rochers.
 » *sagittalis.*
 » *sericea.*
 » *sibirica.*
 » *tinctoria.*
 Tous ces Genêts sont excellents pour garnir les rocailles au soleil. Floraison prolongée, pl. solides.
- Gentiana acaulis,* 10 gr. 3 fr., 5 gr. 2 fr.
 L'une des meilleures pl. des

Alpes; germination lente, mais sûre.

Gentiana alba.

- » *alpina* (vrai), 1 gr. 1 f.
- » *altaica*.
- » *amarella* (annuelle).
- » *Andrewsi*.
- » *angulosa*.
- » *angustifolia*.
- » *asclepiadea*, 1 gr. 1 f.
- » » à fleurs blanches.
- » *austriaca* (annuelle).
- » *barbata*.
- » *bavarica*.
- » *Bigelowi*.
- » *brachyphilla*.
- » *brevidens*.
- » *Burseri*.
- » *campestris* (annuelle), 10 gr.
- 3 f. (à semer dans les gazons des jardins alpins).
- » *Clusii*.
- » *cruciata*, 10 gr. 4 f., 5 gr. 2 f.
- » *depressa*.
- » *detonsa*.
- » *Favrati*.
- » *Fetisowii*.
- » *Freyniana*.
- » *frigida*.
- » *Frœchlichii*.
- » *Gentianella* (Hort. Angl.), 5 gr.
- 3 f.
- » *germanica* (annuel.), 5 gr. 2 fr.
- » *glomerata*.
- » *hybrida* (*straminea* × *Kesselringi*), 5 gr. 2 f.
- » *imbricata*.
- » *Kesselringii*.
- » » à fl. blanches.
- » *Kochiana*, 10 gr. 4 f.
- » *lutea*, 10 gr. 2 f., 5 gr. 1 f. 50.
- » *macrophylla*.
- » » *cyanea*.
- » *mongolica*.
- » *Moorcroftiana*.
- » *nivalis* (annuelle), 1 gr. 1 f. 50.
- » *Olivieri*.
- » *pannonica*.
- » *parryi*.
- » *phlogifolia*, 5 gr. 3 f.
- » *Pneumonanthe*.
- » *Przewalskyi*.
- » *pumila*.
- » *punctata*; 10 gr. 3 f., 5 gr. 2 f.
- » *purpurea*; 10 gr. 3 f., 5 gr. 2 f.
- » » *alba*.
- » » *nana*.
- » *Regeli*.

Gentiana Rocheliana.

- » *Rostani*.
 - » *Saponaria*.
 - Très belle espèce reçue du Canada.
 - » *Sceptum* (ex. Canada).
 - » *septemfida*, 1 gr. 1 f.
 - » » *latifolia*, 1 gr. 1 f.
 - » *straminea*.
 - » *straminea* × *Tibetica*.
 - » *tenella* (annuelle), 1 gr. 1 f. 50.
 - » *Tibetica*, 2 gr. 1 f.
 - » *Tshiantanica*.
 - » » *glomerata*.
 - » *triflora*.
 - » *uliginosa* (annuelle).
 - » *utriculosa* (annuelle).
 - » *verna*, 1 gr. 1 f. 50.
 - » » var. à fl. blanches.
 - » » » *azurea*.
 - » » » *grandiflora*.
 - » » » *atrocœrubea*.
 - » *Walujevii*.
- Geranium aconitifolium* (*rivulare*), 5 gr. 2 f.
- » *albanum*.
 - » *albiflorum*.
 - » *argenteum*, 1 gr. 1 f.
 - » *armœnum*.
 - » *carolinianum*.
 - » *cinereum*.
 - » *Endresii*.
 - » *Fremonti*.
 - » *grandiflorum*.
 - » *Grevilleanum*.
 - » *Ibericum*.
 - » *macrorrhizum*.
 - » *nepalense*.
 - » *nodosum*.
 - » *palustre*.
 - » *phaeum*.
 - » *platyanthum*.
 - » *platypetalum*.
 - » *pratense*.
- Excellente plante pour rochers et plates-bandes, fleurissant tout l'été; germe de suite et produit la même année ses belles fleurs bleu violet foncé, 10 gr. 2 f., 5 gr. 1 f.
- » *Richardsoni*.
 - » *sanguineum*, 10 gr. 4 f.
 - » » à fleurs blanches.
 - 10 gr. 5 f.
 - » *sessiliflorum*.
 - » *subcaulescens*.
 - » *sylvaticum*.
 - » *tuberosum*.

Gerardia tenuifolia.
Gerbera Abyssinica.
 » *Jamesoni.*
 » » var. horticoles.
 » *Kunzeana.*
Geum *atrosanguineum*, 10 gr. 4 f.
 » *bulgaricum.*
 » *chiloense* (à fl. rouge très vif).
 » *coccineum (idem)*, 10 gr. 4 f.
 » » *grandiflorum*, 10 g., 5 f.
 » *Heldreichii*, 5 gr. 3 f.
 » *heterocarpum*, 5 gr. 3 f.
 » *intermedium.*
 » *laciniatum.*
 » *macrophyllum.*
 » *magellanicum.*
 » *montanum*, 5 gr. 3 f.
 » *Mrs Bradschaw.*
 » *pyrenaicum*, 5 gr. 3 f.
 » *reptans.*
 » *Rhæticum.*
 » *rivale*, 10 gr. 2 f.
 » » *grandiflorum.*
 » *rubellum.*
 » *triflorum.*
 » *tyrolense.*
 » *Wildenowi.*
Gilia coronopifolia, 10 gr. 4 f.
 Superbe fl. californienne d'un rouge éclatant.
Gillenia trifoliata, 10 gr. 4 f.
 L'une des meilleures et des plus florifères d'entre les pl. vivaces d'ornement, fl. blanc-rosé, gracieusement suspendues sur tiges rouge-brun, mai-sept.
Gladiolus palustris.
Glaucium cappadocicum.
 » *corniculatum.*
 » *leiocarpum.*
 » *luteum*, 10 gr. 1 f.
 » *rubrum*, 10 gr. 2 f.
 » *tricolor*, 10 gr. 2 f.
 » » *grandiflorum*, 10 gr. 3 f.
Glaux maritima.
Globularia bellidifolia.
 » *cordifolia*, 5 gr. 4 f.
 » *nana.*
 » *nudicaulis*, 5 gr. 3 f.
 » *trychosantha*, 5 gr. 3 f.
 » *vulgaris*, 5 gr. 3 f.
Glossocomia Clématidea.
Gnaphalium Leontopodium, 1 g. 1 f. 50.
 » *norvegicum.*
 » *supinum.*
 » *sylvaticum.*
Grindelia cuneifolia, 10 gr. 2 f.
 » *robusta*, 10 gr. 2 f. Composées

vivaces à grandet capitules jaunes.
Gutierrezia Euthamiæ.
Gymnolomia multiflora.
Gypsophila acutifolia, 10 gr. 2 f.
 » *alpicola*, 10 gr. 4 fr.
 » *altissima.*
 » *cerastioides.*
 » *libanotica.*
 » *paniculata*, 10 gr., 2 f.
 L'une des meilleures pl. p^r la fleur coupée et l'ornementation des jardins.
 » *paniculata compacta.*
 » *repens* (pl. tombante de grande valeur ornementale p. les rochers), 10 gr. 3 f. 5 gr. 2 f.
 » *repens* var. *major.*
 » *Rokejeka.*
 » *scorzoneræfolia*, 10 gr. 2 f.
 » *Steveni.*
 » *transylvanica.*
 » *trichotoma.*
Haberba Rhodopensis.
Hablitzia tamnoides.
Hacquetia Epipactis.
Halimodendron argenteum.
Haplocarpha Leichtlini.
Hebenstreitia comosa.
Hedysarum boreale.
 » *esculentum.*
 » *microcalyx.*
 » *multijugum.*
 » *neglectum.*
 » *obscurum.*
 » *polymorphum.*
 » *Semenowi.*
 » *sericeum.*
 » *sibiricum.*
 » *songaricum.*
Heimia salicifolia.
Helenium autumnale.
 » *Bolanderi.*
 » *Hooperi.*
 Bonnes pl. vivaces à capitules jaunes.
Helianthella quinquænervis.
Helianthemum alpestre (jaune).
 » *amabile* (carmin), 10 gr. 4 f.
 » *apenninum* (blanc), 10 gr. 2 f.
 » *atrosanguineum* (rouge grenat).
 » *aurora.*
 » *bicolor* (jaune et rouge), 10 gr. 4 f.
 » *canum* (jaune).
 » *coccineum* (rouge ardent).
 » *cruentum* (rouge vif).
 » *Fumana* (jaune), 10 gr. 2 f.

Helianthemum Garibaldi.

- » grandiflorum (jaune), 10 gr. 2 f.
- » mutabile (de plusieurs teintes), 10 gr. 2 f.
- » obscurum (jaune).
- » œlandicum (jaune).
- » polyfolium (blanc), 10 gr. 4 f.
- » rhodanthum.
- » roseum (rose clair), 10 gr. 3 f.
- » rubrum (rouge sombre).
- » salicifolium.
- » sulfureum.
- » tomentosum (à feuilles blanch. fl. jaun.), 10 gr. 2 f.
- » velutinum (jaune).
- » vulgare (jaune), 10 gr. 2 f.

Ce sont des pl. à gracieux feuell. persistant, aux fl. nombreuses, se succédant presque toute l'année quand on a soin de couper les tiges après la fleur ; culture très facile. Pl. naines et touffues, excell. pour les rochers et talus arides. Lèvent facilement et rapidement.

Helianthus (Tournesols vivaces).

- » ciliaris (ex America).
- » Maximilianus (ex America).
- » pumilus (ex America).

Helichrysum angustifolium.

- » anatolicum.
- » antennarium.
- » arenarium.
- » lanatum.
- » odoratum.
- » Stoeckas.

Heliopsis-laevis, 10 gr., 1 fr.

- » Pitcherianus.
- » scabra.
- » "Soleil d'or", 10 gr. 1 fr.

Grandes composées vivaces à fl. jaune orangé.

Helleborus abschasicus.

- » atropurpureus.
- » corsicus.
- » foetidus.
- » niger (Rose de Noël), 10 g. 3 fr.
- » orientalis.
- » purpurascens.
- » viridis.

Heracleum alpinum.

- » giganteum, 10 g. 2 fr.
- » lanatum (Etats-Unis).
- » Lehmannianum.
- » Mantegazzianum, 10 gr. 2 fr.

Les gr. de cet Heracleum nous ont été apportées du Caucase en 1892. C'est une bonne

pl. viv., propre à isoler dans les pelouses, de culture extrêmement facile et à forte odeur anisée ; l'une des meilleures plantes mellifères.

Heracleum montanum.

- » orientale.
- » pubescens.
- » pyrenaicum.
- » villosum.

Herniaria glabra.

- » hirsuta.
- » incana.

L'H. glabra est la meilleure pl. tapissante pour garnir les lieux secs et arides, en plein soleil, les sols maigres et stériles qu'elle recouvre rapidement, 10 g. 5 fr. ; 5 gr. 3 fr.

Hesperis matronalis (Giroflée vivace).

- » var. candidissima.

La Girarde ou Giroflée vivace est une pl. solide, aux nombreuses fl. violettes, odorantes et qu'on peut utiliser pour garnir les coins arides, les grands rochers, les lieux pittoresques, 10 gr. 1 fr.

- » nivea.
- » sibirica.
- » tristis.

Heuchera glabra.

- » purpurascens.
- » rubescens.
- » sanguinea, 5 gr. 3 fr.

Délicieuse saxifragée des montagnes du Mexique, aux fl. rose vif et se succédant de mai en août.

- » sanguinea alba.
- » grandiflora.
- » maxima.
- » splendens.

Hibiscus argentinus.

- » militaris.
- » alba.
- » palustris.
- » roseus.

Hieracium albidum.

- » aurantiacum.
- » Bormülleri.
- » lanatum.
- » stoloniflorum.
- » villosum.

Hippocrepis comosa.**Homogyne alpina.**

- » discolor.
- » sylvestris.

Honkeya peploides.
Horminum pyrenaicum.
 » » splendens.
Houstonia cœrulea.
Hugueninia tanacetifolia, 5 gr. 3 fr.
Hutschinsia alpina. (Lepidium alpinum).
Hydrophyllum virginicum.
Hypericum Androsæmum, 5 gr. 3 fr.
 » aureum, 5 gr. 3 fr.
 » Balearicum.
 » calycinum.
 » Coris, 1 gr. 1 fr. 50.
 » delphicum.
 » empetrifolium.
 » fragile.
 » Gebleri.
 » Henryi.
 » hircinum.
 » Hookerianum.
 » hyssopifolium.
 » Kalmianum, 5 gr. 2 fr.
 » Kotschyanum.
 » linarifolium.
 » maculatum.
 » montanum.
 » nummulariæfolium.
 » Olympicum, 1 gr. 1 fr.
 » Orientale, 5 gr. 2 fr.
 » organifolium.
 » patulum, 5 gr. 3 fr.
 » perforatum. (Millepertuis).
 » poliphyllum.
 » prolificum.
 » Przewalskyi.
 » ptarmicæfolium, 5 gr. 4 fr.
 » pulchrum.
 » quadrangulum.
 » repens. L'une des meilleures pl. tapissantes, 5 gr. 4 fr.
 » reptans.
 » Rhodopeum.
 » Richeri.
 » rumelicum.
 » scabrum.
 » tomentosum, 5 gr. 2 fr.
 » transylvanicum
 » uralum.
Hypochæris carpathica.
 » Helvetica.
 » maculata.
Hyssopus aristatus, 5 gr. 2 fr.
 » creticæus.
 » officinalis, 10 gr. 2 fr.
 L'hyssope, à fl. bleu très foncé, au feuillage fortement aromatique, est une excellente pl. pour les pentes arides et

lieux secs, recherchée des abeilles.
Hyssopus officinalis à fl. blanches.
 10 gr. 3 fr.
 » » à fl. rouges, 10 gr. 3 fr.
 » recticaulis.
 » sibiricus.
Iberis commutata.
 » gibraltarica, 10 gr. 2 fr.
 Belle et bonne pl. à fl. lilas, se succédant pendant une grande partie de l'année.
 » Gibraltarica × Tenoreana.
 » Jordani.
 » jucunda.
 » saxatilis.
 » semperflorens.
 » sempervirens, 10 gr. 3 fr.; 5 gr. 2 fr.
 L'une des meilleures pl. à rocailles et bordures : fl. blanc pur, de mai en juillet ; effet éclatant.
 » sempervirens nana, 5 gr. 3 fr.
 » stylosa.
 » Taurica.
Impatiens glanduligera.
 » noli tangere.
Imperatoria angustifolia.
 » Ostruthium.
Incarvillea brevipes.
Incarvillea Delavayi, 5 gr. 2 fr.
 (Gloxinia vivace). L'une des meilleures pl. viv. d'ornement que nous ait fourni l'Asie ; s'élève facilement de semis.
 » grandiflora.
 » Olgae.
Inula Ascheronianana.
 » acaulis.
 » ensifolia, 5 gr. 3 fr.
 Belle pl. de rochers à fl. jaunes. (Juin-octobre.)
 » glandulosa, 5 gr. 3 fr.
 Sorte d'Arnica à très grandes fl. originaire du Caucase.
 » grandiflora.
 » Helenium (aulnée), 5 g. 2 fr.
 Pl. officinale stomachique de grande valeur, appréciée déjà des Romains ; belle pl. d'ornement.
 » hirta.
 » limonifolia.
 » macrocephala.
 » montana.
 » Royleana.
Ipomæa rubro-cœrulea.

Iris albida.

- » *acutiloba* (ex Oriens).
- » *arenaria*.
- » *caucasica*.
- » *Constantinopolitana*.
- » *Douglasiana*.
- » *Fieberi*.
- » *fetidissima*.
- » *Fontanesi*.
- » *gigantea*.
- » *iberica*.
- » *Junionana* (ex Oriens).
- » *Kumaonensis*.
- » *laevigata* (*Kæmpferi*).
- » *musulmanica*.
- » *orchioides*.
- » *paradoxa* (ex Oriens).
- » *Polakii*.
- » *prismatica*.

Iris pseudo-Acorus (Le lis héraldique).

- » *pyrenaica*.
- » *reticulata*.
- » *sibirica*.
- » *alba*.
- » *sisyrinchium*.
- » *Suziana superbissima*.
- » *versicolor*.
- » *virginica*.

Isatis alpina (vraie, récoltée dans le Haut-Queyras, sa station classique). 1 gr. 1 fr.

- » *brachycarpa* (ex Armenia).
- » *tinctoria*.

Jacaranda mimoseefolia.**Jasione humilis.**

- » *montana*.
- » *perennis*.

Jeffersonia diphylla.**Juniperus Cedrus (du Pic de Ténériffe).**

5 g. 4 fr.

- » *communis*.
- » *nana*, 5 gr. 2 fr.
- » *Phœnicea*.
- » *prostrata*.
- » *Sabina*, 5 gr. 2 fr.

Kernera saxatilis.**Kitaibelia vitifolia.****Knautia arvensis alba.****Kniphofia (Tritoma).**

- » *caulescens*.
- » *grandiflora*.
- » *Saundersi*.
- » *Tuckyi*.
- » *Uvaria*.

Kochia trichophylla.**Lactuca chondrillaeflora.**

- » *perennis*.
- » *alba*.

Lagerstroemia indica.**Lamium album.****Laserpitium gallicum, 10 gr. 3 fr.**

- » *halleri*, 10 gr. 3 fr.
- » *hispidum*.
- » *latifolium*, 10 gr. 3 fr.
- » *peucedanoides*.
- » *siler*, 10 gr. 3 fr.

Grandes Ombellifères au feuillage ornemental, propres à semer dans les talus arides pour retenir le sol.

Lasiagrostis Calamagrostis.**Lathyrus alatus.**

- » *heterophyllus*.
- » *incurvus*.
- » *latifolius*, 10 gr. 1 fr.
- » *à fl. blanc pur*, 10 g. 1 fr.
- » *maritimus*.
- » *neurolobus*.
- » *odoratus* (*Pois de senteur*). Collection anglaise en mélange, 10 gr. 2 fr.
- » Collection de floraison, mélange, 10 gr. 2 fr.
- » *pratensis*.
- » *pyrenaicus*.
- » *rotundifolius*.
- » *sylvestris*.

Laurentia tenella.**Lavandula abrotanifolia.**

- » *delphinensis*, 10 gr. 4 fr.

La vraie lavande du Dauphiné.

- » *nana compacta*.
- » *officinalis*, 10 gr. 4 fr.
- » *spica*.
- » *Stœkas*.
- » *vera*.

- » *à fl. blanches*.

Leontopodium alpinum (Edelweiss).

Semer dans un sol léger et tenir plutôt sec; repiquer jeune et cultiver au soleil et dans sol calcaire. Diviser tous les deux ans, 1 gr. 1 fr. 50.

Leontopodium altaicum.

- » *depaupertum*.
- » *Himalayense*.
- » *japonicum*.
- » *Lindavicum*.
- » *sibiricum*.
- » *sikkimense*.
- » *tibeticum*.
- » *transylvanicum*.

Lepachrys columnaris (Obeliscaria).**Lepidium alpinum (*Hutschinsia*).**

Lepidipm Auerswaldii.
 » *stylatum.*
Lepigonum rubrum.
Leucanthemum maximum (*Grand marguerite*).
Leucojum aestivum.
Leuzea conifera.
Liatris graminifolia.
 » *punctata.*
 » *pyncnostachya.*
 » *scariosa*, 5 gr. 3 fr.
 » *spicata*, 5 gr. 3 fr.
 Belles fl. d'ornement vivaces, à fl. roses en épis dressés.
Libertia grandiflora.
Ligularia afghanistanica.
 » *areneosa.*
 » *calthæflora.*
 » *macrophylla*, 5 gr. 2 fr.
 » *sibirica*, 5 gr. 2 fr.
 » *turkestanica.*
Lilium bulbiferum.
 » *candidum.*
 » *Catanæ.*
 » *cordifolium* (ex Japon).
 » *croceum.*
 » *dalmaticum.*
 » *Glehni.*
 » *Martagon* (excellent pour les sous-bois), 5 gr. 2 fr.
 » *Martagon* à fl. blanches.
 » *monadelphum.*
 » *pomponium.*
 » *pumilum* (ex Sibéria).
 » *pyrenaicum* (*Martagon* jaune), 5 gr. 3 fr.
 » *superbum.*
 » *tenuifolium.*
 » *tigrinum.*
Linaria alpina, 5 gr. 3 fr.
 » *alba.*
 » *concolor.*
 » *rosea.*
 » *anticaria.*
 » *canadensis.*
 » *cilicica.*
 » *cymbalaria.*
 » *à fl. blanches.*
 » *var. compacta.*
 » *dalmatica.*
 » *genistifolia* (le vrai).
 » *italica.*
 » *macedonica.*
 » *organifolia.*
 » *pallida*, 1 gr. 1 fr.
 » *rosea.*
 » *Pancicii.*
 » *petræa* (voisin d'*alpina*).

Linaria pilosa.
 » *purpurea.*
 » *spuria.*
 » *striata.*
 » *trionitophora* (superbe espèce portugaise).
 » *tristis.*
Lindelofia spectabilis, 5 gr. 1 fr. (*Myosotis d'Orient*).
 Jolie et solide Boraginée à fl. bleu foncé.
Linnæa borealis.
 » *canadensis* (ex Canada).
Linum alpinum.
 » *campanulatum.*
 » *capitatum.*
 » *catharcticum.*
 » *flavum*, à fl. jaune pâle, très beau, excellent pour rochers ensoleillés et bonne fl. vivace pour fl. coupée, 10 gr. 3 fr.; 5 gr. 2 fr.
 » *grandiflorum* (à fl. rouge vif).
 » *maritimum.*
 » *narbonense.*
 Le meilleur de tous; grandes fl. bleues, à pétales persistantes.
 » *perenne*, 10 gr. 2 fr.
 » *à fl. blanches*, 10 g. 2 f.
 » *à fl. roses.*
 Le *L. perene* est l'une des meilleures pl. d'ornement pour platebandes et grands rochers, au soleil; fl. bleu d'azur, très abondantes, de mai en novembre. Culture des plus faciles.
 » *salsoloides.*
 » *tenuifolium.*
 » *viscosum* à fl. rose tendre.
Lithospermum Froebeli.
 » *fruticosum.*
 » *Gastonis.*
 » *graminifolium*, 1 gr. 1 fr.
 » *intermedium*. 1 gr. 1 fr.
 » *oleoides.*
 » *petræum* (*Echium* ou *Moltkia petræa*), 1 g, 1 fr.; 5 g. 4 fr.
 » *prostratum.*
 » *purpureo-cœrulum.*
 » *Sibthorpiatum.*
Lloydia serotina.
Lobelia cardinalis, (vrai).
 » *fulgens.*
 » *Gerardi.*
 » *Kalmii.*
 » *Kamtschatica.*
 » *linnaeoides.*

- Lobelia Lugdunensis.*
 » *speciosa.*
 » *syphilitica*, 5 gr. 5 fr.
Lonicera alpigena.
 » *cœrulea*, 10 gr. 2 fr.
 » *etrusca.*
 » *nigra*, 10 gr. 2 fr.
 » *pyrenaica* (vrai), 10 gr. 2 fr.
Lotus corniculatus.
Luhea divaricata (ex Chili).
Lunaria rediviva.
Luzula albida.
 » *rubra.*
 » *nivea.*
 » *parviflora* (ex Groenland).
Lychnis alpina, 2 gr. 1 fr.
 » *à fl. blanches.*
 » *chalcedonica* (Croix de Malte),
 10 gr. 2 fr.
 » *chalcedonica alba*, 5 gr. 2 fr.
 » *rosea.*
 » *flos Jovis* (*Fl. de Jupiter*),
 5 gr. 2 fr.
 » *à fl. blanches.*
 » *fulgens.*
 » *Haageana.*
 » *Lagascæ* (*Petrocoptis Lagascæ*).
 » *Laponica.*
 » *viscaria*, 5 gr. 2 fr.
 Jolie Caryophyllée rose car-
 min vif, facile à élever de grai-
 nes.
 » *viscaria alba.*
 » *rosea.*
 » *splendens*, 5 gr. 2 fr.
Lynosiris punctata.
 » *vulgaris.*
Lysimachia atropurpurea.
 » *clethroides.*
 » *dahurica.*
 » *dubia*, 5 gr. 2 fr.
 » *epheumerum.*
 » *japonica.*
 » *kindigeri.*
 » *lobelioides.*
 » *punctata.*
 » *quadrifolia*, 5 gr. 2 fr.
 » *thyrsiflora.*
 » *verticillata*, 5 gr. 2 fr.
 » *vulgaris*, 5 gr. 2 fr.

Plante propre à garnir les
 lieux humides et dont plu-
 sieurs (*dubia*, *punctata*, *verti-*
cillata) sont également de bon-
 nes pl. vivaces, à grand effet,
 grâce à leurs grands panicules
 d'innombrables fl. jaune vif ou
 blanc rosé.

- Lythrum Salicaria*, 5 gr. 2 fr.
 Excellente pl. pour les lieu
 humides.
Macrotys actaeoides.
Malva Alcea.
 » *alba.*
 » *moschata.*
 » *alba.*
Malvastrum lateritium.
 » *limense.*
Mamillaria vivipara.
Mandragora officinalis.
Margyricarpus setosus.
Marrubium candidissimum.
 » *cyllaneum.*
 » *Kotschy.*
 » *lanatum.*
 » *sericeum.*
 » *spinulosum.*
 » *velutinum.*
Matthiola fenestralis.
 » *fragrantissima.*
 » *incana* type.
 » *var.* (Giroflées en va-
 riétés).
 » *var. Augusta-Victoria.*
 » *odoratissima* (ex Oriens).
 » *rupestris.*
 » *sinuata.*
 » *tristis.*
 » *valesiaca.*
Mayanthemum canadense.
Meconopsis aculeata.
 » *cambrica* 5 gr. 4 fr.
 (Pavot jaune des bois). Cett
 pl. est excellente pour les lieu
 frais et ombragés.
 » *cambrica à fl. orangées.*
 » *à fl. pleines.*
 » *heterophylla.*
 » *integrifolia.*
 » *nepalensis.*
 » *paniculata.*
 » *petiolata.*
 » *racemosa.*
 » *simplicifolia.*
 » *sinuata latifolia.*
 » *Wallichiana.*
Medicago Echinus. (Pl. de la Passion)
 feuilles maculées de sang).
Melandrium rubrum (Lychnis des pré
 alpins), 10 gr. 3 fr.
 » *affine* (ex Groenland).
Melica altissima.
 » *atropurpurea.*
 » *ciliata.*
 » *nutans.*
 » *uniflora.*

Melissa officinalis (Mélisse), 5 gr.
1 fr.

Mertensia ciliata.

» *echioides*.

» *lanceolata*.

» *oblongifolia*.

» *paniculata* (*sibirica*).

» » à fl. blanches.

» *primuloides*.

Meum athamanticum, 10 gr. 2 fr.

L'une des plus fines verdures
qu'on puisse imaginer.

Meum Mutellinum.

Michauxia campanuloides.

Micromeria rupestris.

Mimulus alsinoides

» *cardinalis*.

Le *M. cardinalis* a les fl.
rouge vermillon.

Mimulus cardinalis de couleurs va-
riées.

» *Lewisii* (ex Canada).

» *luteus*.

Mirabilis multiflora.

Mitchella repens.

Mitella diphylla.

» *pentandra*.

Mœhringia ciliata.

» *Jankæ*.

» *muscosa*.

» *papulosa*.

» *pendula*.

» *Ponæ*.

Monarda didyma.

» » *alba*.

» *fistulosa* (thé d'Oswego).

» *florariensis*.

» *Kalmiana*.

» *purpurea*.

» *stricta*.

» *superba*.

Molospermum cicutarium.

Molucella spinosa.

Moræa iridioides.

Morine longifolia, 10 gr. 2 r.

» *persica*.

Muhlenbeckia nana.

Mulgedium alpinum, 1 gr. 1 fr.

» *Bourgæi*, 1 gr. 1 fr.

» *plumieri*, 1 gr. 1 fr.

Grandes laitues vivaces à fl.
lilas bleu.

Myosotis alpestris (fl. bleu pur). 5 gr.
2 fr.

» *cæspitosa*.

» *lithospermifolia*.

» *palustris*, bleu d'azur, 5 gr.
3 fr.

Myosotis palustris, var. « perfection ».
» var. *semperflorens*.

» *pygmaea*.

Myosotis rupicola.

» *Welwitschii*.

Myriactis Wallichii

Myricaria (*Tamarix*) *germanica*.

Myrrhis odorata.

La Myrrhe, dont les racines
sont fortement anisées.

Nardus stricta.

Nepeta lanceolata.

» *macrantha*.

» *Nepetella*.

» *nuda*.

» *Tibetica*.

Nuphar luteum (*Nénuphar jaune*).
5 gr. 2 fr.

Nymphæa alba (*nénuphar blanc*), 5 g.
2 fr.

Obeliscaria pulcherrima.

Oenothera acaulis.

» *arguta*.

» *cæspitosa*.

» *densiflora*.

» *Fraseri* (*fruticosa*), 5 gr.
3 fr.

» *macrocarpa* (*O. Missouriensis*).

L'une des meilleures plantes
de rocailles; grandes fl. jaune
clair, de juin en novembre :
culture facile; 10 gr. 2 fr.

» *pumila*.

» *rosea*.

» *rosea mexicana*.

» *serrulata*.

» *speciosa*.

Omphalodes cappadocica.

» *linifolia* (annuel).

» *Luciliæ*.

» » à fl. blanches.

» *nitida*.

Onobrychis laconica.

» *montana*.

Ononis cenisia, 5 gr. 2 fr.

» *fruticosa*.

» *natrix*, 10 gr. 1 fr.

» *rotundifolia*, 10 gr. 2 fr.

Onopordon bracteatum.

Onosma armena.

» *albo-rosea*.

» *Bourgæi*.

» *Cassium*.

» *Helveticum*, 5 gr. 3 fr.

» *pallida*.

» *poliphyllum*.

» *rupestris*.

» *stellulatum*, 5 gr. 3 fr.

*Opuntia albospina*¹.

- » *arborescens*.
- » *arkansana*.
- » *Camanchica*, 5 gr. 2 fr.
- » *major*, 5 gr. 2 fr.
- » *cantabrigensis*.
- » *cymochila*, 5 gr. 2 fr.
- » *fulgens* (à fl. rouge vif).
- » *gigantea*, 5 gr. 2 fr.
- » *greenii*, 5 gr. 2 fr.
- » *macrorhiza*, 5 gr. 2 fr.
- » *mesacantha*, 5 gr. 2 fr.
- » *missouriensis*, 5 gr. 2 fr.
- » *orbicularis*.
- » *Raffinesquiana*, 5 gr. 2 fr.
- » *rubra*, 1 gr. 1 fr.
- » *Salmonea* (fl. rouge saumon).
- » *spinacantha*, 2 gr. 1 fr.
- » *vulgaris*.
- » *Xanthostemma rosea*.

Origanum pulchrum.*Orobis lathyroides*.

- » *luteus*.

Orobis niger.

- » *tuberosus*.
- » *vernus*.

Ostrowskya magnifica.*Othonna cheirifolia*.*Oxalis acetosella*.

- » *rosea*.
- » *atrosanguinea*.
- » *enneaphylla*.

Oxybaphus nyctaginus.*Oxyria digyna*.

- » *elatior*.

Oxytropis Baikalensis, 5 gr. 3 fr.

- » *campestris*, 5 gr. 3 fr.
- » *Halleri*, 5 gr. 3 fr.
- » *Laponica*.
- » *ochroleuca*.
- » *Pallasi*.
- » *pilosa*.
- » *sordida*.
- » *spicata*.
- » *sulfurea*.
- » *Tyrolense*.

Pachystigma Cambyi (ex Canada).*Paeonia albiflora*.

- » *anomala*.
- » *coralina*.
- » *decora* (Romanica), 10 gr. 2 fr.
- fl. couleur vermillon très vif.

Paeonia decora major.

- » *lutea*, 10 gr. 5 fr.
- » *officinalis*, 10 gr., 2 fr.
- » *Pallasi*.
- » *peregrina*.
- » *Russi*.
- » *alba*.
- » *tenuifolia*.
- » *triternata*, 10 gr. 3 fr.
- » *Witmanniana*.

Palafoxia mexicana.*Pancratium maritimum*.*Papaver alpinum*, 10 gr. 6 fr.

- » *alpinum*, var. à fl. rouge vif, rouge cinabre, rose et jaune. Ces pavots alpins sont d'entre les plus florifères, les plus gracieuses et les meilleures des pl. de roc. Leurs fleurs, très abondantes, affectent toutes les teintes. On peut les semer dans les rochers, les graviers, les fentes de murs et les lieux pierreux. Sol maigre et rocailleux.

Papaver alpino-nudicaule.

- » *atlanticum*.
- » *bracteatum* (*involucratum*).
- » *Burseri*.
- » *caucasium*.
- » *croceum*.
- » "Croix helvétique".
- » *Heldreichii*.
- » *Kernerii*.
- » *maximum*.
- » *monanthum*.
- » *nudicaule*, 10 gr. 4 fr.
- » à fl. blanches.
- » » jaune vif.
- » » rouge cramoisi.
- » Toutes teintes mélang.

Le pap. nudicaule est l'une des plus florifères et des plus précieuses d'entre les plantes alpines ou vivaces. Il aime la fraîcheur et la mi-ombre et constitue l'un des meilleurs ornements des rochers. Fleurit tout l'été et jusqu'en hiver, très facile à cultiver; bon pour la fl. coupée.

oreophyllum.

¹ Ces *Opuntia* sont des Cactées dont les graines lèvent facilement et qui sont rustiques à nos hivers. Il suffit, dans les pays du Nord, de tenir les plantes au sec (recouvertes de planches inclinées) pendant la mauvaise saison. Elles fleurissent abondamment l'été si l'on a soin de les planter au grand soleil. En Allemagne, on en cultive de grandes collections sans même les recouvrir de planches.

Papaver orientale, 10 gr. 2 fr.

» » variétés en mélange,
10 gr. 3 fr.

Le pavot d'Orient est la plus éclatante de nos fleurs de pl. terre. Sa grosse corolle d'un rouge ardent fait un effet grandiose dans les jardins. Culture facile. On en possède de nombreuses variétés, mais, comme les semis varient beaucoup, nous préférons les offrir en mélange plutôt que de tenir les variétés de graines séparées.

» *persicum*.
» *pilosum*.
» *pyrenaicum*.
» *radicatum*.
» *Rhæticum* (de la Bernina).
» *splendidissimum*.
» *strictum*.
» *strigosum*.
» *tauricum*.
» *triniae-folium*.

Paracarium azureum.

Paradisia Liliago.

» *Liliastrum*. Lis de Saint-Bruno facile à élever.
» *Liliastrum major*.

Pardanthus chinensis.

Paris quadrifolia.

Parnassia alpina.

» *asarifolia*.
» *fimbriata* (ex Canada).
» *mysorensis*.
» *palustris*.

Paronychia argentea.

» *Kapellae*.
» *nivea*.

Parrotia persica.

Parrya Menziesii.

Pastinaca aureo-reticulata (à fl. panachées en échiquier).

Patrinia heterophylla.

» *palmata* (triloba).
» *rupestris*. Très belle valériane à fl. jaune vif, de grand effet et de culture facile, 5 gr. 2 fr.

» *scabiosæfolia*.

Pedicularis atrorubens.

» *cenisia*.
» *foliosa*.
» *palustris*.
» *recutita*.
» *retroflexa*.
» *tuberosa*.

Pedicularis verticillata.

Pl. semi-parasites à semer avec du gazon.

Peganum Harmala.

Pelargonium Endlicherianum.

Peltaria alliacea, 5 gr., 2 fr.

Penthorum sedoides.

Pentstemon acuminatus.

» *albus*.
» *alpinus*.
» *antirrhinoides*.
» *arizonicus*.
» *atropurpureus*.
» *Bradbury*.
» *Bridgesi*.
» *cæruleus*.
» *carinatus*.
» *Cobœa*.
» *confertiflora*.
» *confertus*.
» *cyananthus*.
» *diffusus* (ex Canada).
» » (Floraire), 10 g. 3 fr.
» *digitalis*. Excellente pour la fl. coupée; fl. blanc opalin, 10 gr. 3 fr.
» *gentianoides*.
» *glaber*, 5 gr. 3 fr.
» *glaucus*, 5 gr. 2 fr.
» *Gordoni splendens*.
» *gracile*.
» *gracilentus*.
» *heterophyllus*.
» *humilis*, jolie pl. alpine aux fl. d'un bleu de Gentiane, 1 g. 1 fr.
» *hybridus hortensis* (les meilleures variétés des jardins; excellentes pl. de décoration).
» *Jamesi*, 1 g. 1 fr.

Pentstemon lævigatus, 10 gr. 3 fr., fl. blanc lilacé.

» *latifolius*.
» *linarioides*, 1 gr. 1 fr.
» *Menziesii*.

» » type canadian, bas et rampant (ex Canada).

» *Murrayanus grandiflorus*.

» *ovatus*, 5 gr. 2 fr.

» *procerus*.

» *pubescens*, 5 gr. 2 fr.

Fl. très nombreuses, de teinte opale se succédant tout l'été, excellent pour la fleur coupée.

» *puniceus*.
» *pygmaeus*.
» *rubricaulis*.
» *scouleri* 1 gr. 1 fr.
» *speciosus*.

Pentstemon spectabilis.

- » *venustus*, 5 gr. 2 fr.
- » *virgatus*.
- » *Watsoni*.
- » *Wrightii*.

Les *Pentstemon* sont les Digitaies de l'Amérique du Nord; ce sont de bonnes pl. vivaces de plates-bandes ou de rochers qui fleurissent longtemps et sont très ornementales. On ne saurait trop en vanter la rusticité et la longue floraison; leurs fl. sont d'entre les meilleures pour les bouquets. Il en est dont les teintes bleu d'azur rappellent les gentianes des Alpes.

*Pericome caudata.**Petalostemon candidus.*

- » *tenuifolius*.

Petasites albus.

- » *niveus*.
- » *palmatus* (Canada).

*Petrocoptis Lagascæ.**Peucedanum angustifolium.*

- » *Austriacum*.

Phaca alpina, 5 gr. 2 fr.

- » *astragalina* (*Astragalus alpinus*), 5 gr. 3 fr.

*Phacelia tanacetifolia.**Phleum alpinum.**Phlomis alpina.*

- » *Samia*.
- » *tuberosa*.

Phlox acuminata.

- » *decussata*, les meilleures variétés des jardins en mélange; 10 gr. 2 fr.
- » *Douglasii*.
- » *fruticosa*.
- » *maculata*.

Phygellus capensis, 5 gr. 4 fr. Curieuse pl. vivace à fl. rouge cocciné.*Physalis alkekengi* (Akékege ou Coqueret), 5 g. 1 fr.

- » *Franchetti*.

*Physochlaina orientalis.**Physostegia virginiana*, 10 gr. 2 fr.

Très jolie pl. vivace avec de longs épis de fl. d'un rose tendre; juillet-octobre.

- » à fl. blanches.

Phyteuma austriaca.

- » *betoniæfolium*.
- » *canescens*, 5 gr. 2 fr.
- » *carestia*, 5 gr. 2 fr.

Phyteuma charmeli.

- » *comosum*.
- » *corniculatum*.
- » *globulariæfolium*.
- » *hemisphæricum*, 1 gr. 1 fr.
- » *humile*.
- » *nigrum*.
- » *orbiculare*, 2 gr. 1 fr.
- » *pauciflorum*.
- » *repandum*.
- » *Scheuchzeri*.
- » *Scorzonerifolium*.
- » *serratum*.
- » *Sieberi*.
- » *spicatum*, 5 gr. 3 fr., pl. d'ombre.

Pinguicula alpina.

- » *grandiflora*.
- » *longifolia*.
- » *Reuteri*.
- » *vulgaris*.

Pinus Cembro (Arolle).*Plagius ageratifolius.**Plantago alpina.*

- » *argenta*.
- » *asiatica*.
- » *Cynops*, à semer en terrains arides, 10 gr. 2 fr.
- » *montana*.

Platycodon grandiflorum. (Campanule à grande fleur), 10 gr. 2 fr.

- » à fl. blanches.

10 gr. 5 fr.

- » à fl. doubles.

Mariesi, 10 gr. 2 fr.

- » à fl. blanch., 10 g. 2 f.
- » *grandiflora*.

Ce sont les superbes campanules japonaises, aux grandes fl. fraîchement découpées et vivement colorées en bleu intense, blanc, opale ou azur. Très rustiques, très florifères (juillet-octobre), ce sont des pl. de grand effet et de premier ordre pour la décoration des plates-bandes et rochers.

Podophyllum Emodi.

- » *peltatum*.

*Poincianna Gillesii.**Polemonium cœruleum*, 10 gr. 2 fr.

Pl. mellifère, éminemment propre à orner un jardin; fl. bleues très odorantes et se succédant sur la pl. de juin à septembre.

- » *cœruleum album*. 10 g. 2 fr.

Berninæ.

Polemonium filicinum.

- » flavum.
- » flavo-cœruleum.
- » foliossissimum.
- » grandiflorum.
- » humile.
- » Himalayensè.
- » molle.
- » pauciflorum.
- » pulchellum.
- » reptans.
- » Richardsoni.
- » scapulorum.
- » Tanguticum.

Les Polémoines sont d'admirables pl. viv., formant de jolies touffes d'une verd. fine et gaie, et portant de beaux panicules de fl. bleues, blanches ou jaunes odorantes.

Polygala anatolica.**Polygala chamæbuxus, 5 gr. 4 fr.**

- » Varedæ.

Polygonatum giganteum.

- » multiflorum.
- » verticillatum.
- » vulgare.

Polygonum alpinum.

- » amplexicaule.
- » Baldschuanicum, 10 gr. 3 fr.
- » Bistorta, 10 gr. 4 fr.
- » » v. angustifolia.
- » Brunonis.
- » capitatum.
- » Emodi.
- » sphaerostachyum.
- » ussuriense.
- » viviparum.
- » Weyrischii.

Potentilla adjarica.

- » alchemilloides.
- » alpestris.
- » ambigua.
- » argentea.
- » argyrophylla.
- » atrosanguinea, 5 gr. 2 fr.

Fl. d'un rouge sanguin foncé; pl. décorative et bonne pour fl. coupées.

- » aurea.
- » Baldensis.
- » bifurca.
- » caucasica.
- » caulescens.
- » chinensis.
- » chrysantha, 10 gr. 4 fr.
- » Jolie fl. jaune clair.
- » Clusiana.

Potentilla crinita.

- » delphinensis.
- » Engadinensis.
- » Fenzlii.
- » fragiformis.
- » Friedrichseni.
- » frigida.
- » fruticosa (*Potentille en arbre*).
- » fulgens.
- » glandulosa.
- » gracilis.
- » grandiflora.
- » Hippiana.
- » Hookeriana.
- » Hortensis (var. hortic. mélang.)
- » incanescens.
- » Kurdica.
- » Langeana (ex Groënland).
- » Lapponica.
- » Leopolina.
- » Levieri.
- » montenegrina.
- » mooniana.
- » multiida.
- » Nepalensis, 5 gr. 2 fr.
- » Superbe esp. à fl. rose tendre veinées de carmin.
- » nitida.
- » nivalis.
- » nivea.
- » pedemontana.
- » peduncularis.
- » petiolulata.
- » pulcherrima.
- » pyrenaica.
- » Ranunculus (ex Groënland).
- » recta.
- » rupestris (fl. blanch.), 2 gr. 2 fr.
- » Salesowiana.
- » sanguisorbæfolia.
- » Saxifraga.
- » sibbaldi.
- » speciosa.
- » » discolor.
- » tanacetifolia.
- » taurica.
- » Tormentilla.
- » Transcaspiensis.
- » tridentata.
- » tuberosa.
- » Vahli (ex Groënland).
- » valderia.
- » viscosa.
- » Visiani.
- » Willmottiana.

Pratia angulata.**Prenanthes purpurea.**

Primula acaulis.

- » » var. à fl. bleu foncé.
 - » » var. *orientalis*.
 - » *admontensis*.
 - » *algida*.
 - » *Allionii*.
 - » *angustidens*.
 - » *Arctotis*.
 - » *Auricula* (type alpin). 5 gr. 4 f.
 - » » var. *horticoles*.
 - » » *marginata*.
 - » » *pallida*.
 - » *auriculata*.
 - » *Balbisii*.
 - » *Beesiana*.
 - » *bella*.
 - » *Bel unensis*.
 - » *Berninæ*.
 - » *Bulleyana*.
 - » *capitata* (vrai, bleu foncé).
 - » *capitellata*.
 - » *carniolica*.
 - » *carpathica*.
 - » *cashmeriana*.
 - » » à fl. blanches.
 - » » *grandiflora*.
 - » *ciliata*.
 - » *Cockburniana*.
 - » *commutata*.
 - » *cortusoides*.
 - » *Cottia*.
 - » *crenata*.
 - » *darialica*.
 - » *decipiens*.
 - » *denticulata*.
 - » » var. à fl. blanches.
 - » *discolor*.
 - » *elatior*.
 - » *farinosa*.
 - » *floribunda* (non rust. chez nous).
 - » *Forbesi*.
 - » *Forresti*.
 - » *Freynei*.
 - » *frondosa*.
 - » *glaucescens* (*calycina*).
 - » *grandis*.
 - » *Heucherifolia* (*Gagnepainii*).
 - » *hirsuta* (très belle esp. à fl. carmin), 5 gr. 4 fr.
 - » *integrifolia*.
 - » *intricata*.
 - » *Isabellina*.
 - » *japonica*, 2 gr. 2 fr.
- L'une des plus robustes, les hampes florales portent plusieurs étages de fl. du carmin le plus vif. Elle aime l'humidité.
- » *japonica* à fl. blanches.

Primula japonica à fl. pourpre foncé.

- » » *picta*.
 - » *Juliae*.
 - » *kewensis*.
 - » *latifolia* (*graveolens*).
 - » *leucophylla*.
 - » *Lishangiensis*.
 - » *Littoniana*.
 - » *longiflora*.
 - » *luteola*.
 - » *macrocalyx*.
 - » *magellanica*.
 - » *malacoides*.
 - » *marginata*.
 - » *megasæfolia*.
 - » *mollis*.
 - » *monacensis*.
 - » *muscaroides*.
 - » *obovata*.
 - » *officinalis*.
 - » *patens*.
 - » *pedemontana*.
 - » *Poissoni*.
 - » *Portæ*.
 - » *pseudo-Sikkimensis*.
 - » *pubescens*.
 - » *pulverulenta*, 5 gr. 4 fr., 2 gr. 2 fr.
 - » *rosea*, 1 gr. 1 fr. 50.
- Du rose le plus vif qui se puisse rêver.
- » *rosea grandiflora*.
 - » *saxatilis*.
 - » *scottica*.
 - » *Sieboldi*.
 - » *Sikkimensis*.
 - » *spectabilis*.
 - » *suaveolens*.
 - » *variabilis* (var. anglaises), mélange.
 - » *superbe*, 5 gr. 2 fr.
 - » *Veitchi*.
 - » *venusta*.
 - » *veris* (les meilleures var. anglaises), 5 gr. 2 fr.
 - » » à fl. bleues.
 - » *verticillata*.
 - » *villosa*.
 - » *viscosa*, 5 gr. 4 fr. (*P. hirsuta*).
- La jolie Primevère carmin des Alpes granitiques.
- » *viscosa alba*.
 - » *hybrida*.
 - » *vittata*.
 - » *Warei*.
 - » *Wulfeniana*.
- Prunella alba*.
- » *grandiflora* ; 5 gr. 3 fr.

Prunella grandiflora purpurea.
 » incisa rubra, couleur rouge.
 » laciniata, 5 gr. 3 fr.; superbe.
Prunus prostrata.
Psoralea bitumimosa.
 » macrostachya.
Pterocephalus (scabiosa) Parnassi.
Pulmonaria rubra.
Putoria calabrica.
Pycnanthemum lanceolatum.
Pyrethrum achillæfolium.
 » argenteum.
 » corymbosum.
 » densum.
 » macrophyllum.
 » roseum.
 » sericeum.
 » Tschihatscheffi.
Pyrus nigra (Petit arbuste de rocaille
 à feuillage rougissant l'au-
 tomne), 10 gr. 2 fr.
Ramondia pyrenaica.
 » » rosea.
 » serbica.
Ranunculus aconitifolius, 10 gr. 2 fr.
 Excellent pour les lieux frais
 et ombragés.
 » alpestris.
 » amplexicaulis.
 » anemonoides.
 » Baldshuanensis.
 » bilobus.
 » caucasicus.
 » Constantinopolitanus.
 » crenatus.
 » creticus.
 » glacialis, 1 gr. 1 fr.
 » graminæus, 5 gr. 2 fr.
 » hybridus.
 » Illyricus.
 » Lyalli (ex Nov. Zéland.).
 » millæfoliatus.
 » monspessulanus.
 » montanus.
 » orthorhynchus (ex Canada).
 » parnassifolius, 2 gr. 1 fr.
 » platanifolius.
 » pygmaeus.
 » pyrenæus, 5 gr. 2 fr.
 » rutæfolius.
 » Segneri.
 » serbicus.
 » Thora, 5 gr. 2 fr.
Rehmania angulata.
Reseda complicata.
 » fruticulosa.
 » virgata.
Rhamnus pumila.

Rhaponticum cinarioides, 10 gr. 2 fr.
 » Heleniifolium, 10 gr. 2 fr.
 » pulchrum.
Rhazia orientalis.
Rheum caspicum.
 » Collinianum.
 » corallinum.
 » Emodi.
 » officinale.
 » palmatum.
 » tataricum.
 » Wilsonianum.
Rhodiola linifolia.
 » rubra.
 » rosea (*Sedum Rhodolia*).
Rhododendron chamæcistus.
 » ferrugineum (*La Rose des Alpes*)
 » ferrugineum à fl. blanches.
 » hirsutum.
 » intermedium.
 » Kamtschaticum.
 » lapponicum (ex Groënland).
 » myrtifolium.
Rodgersia æsculifolia.
 » tabularis.
Rodhea japonica.
Romanzoffia Sitchensis.
Romneya Coulteri.
Roripa pyrenaica.
Rosa alpina (*Eglantine des Alpes*).
 10 gr. 1 fr.
 » Fortunei.
 » dumetorum, 10 gr. 1 fr.
 » microcarpa.
 » multiflora, 10 gr. 1 fr.
 » pimpinellifolia (*Eglantine blan-
 che des Alpes*), 10 gr. 1 fr.
 » rugosa, 10 gr. 1 fr.
 » rubiginosa (Sweet bryar), 10 gr.
 1 fr.
Rosmarinus officinalis.
 » prostratus.
Rubia peregrina.
Rubus arcticus.
 » chamæmorus (Norwège).
 » laciniatus.
 » leucodermis.
 » saxatilis.
Rudbeckia ampla.
 » bicolor.
 » californica, 10 gr. 2 fr.
 » conspicua, 10 gr. 2 fr.
 » flava, 10 gr. 2 fr.
 » fulgida, 10 gr. 2 fr.
 » » vass., 10 gr. 2 fr.
 » hirta, 10 gr. 2 fr.
 » » var. hungarica, pl. natu-
 ralisée en Hongrie.

- Rudbeckia intermedia, 10 gr. 3 fr.
 » laciniata, 10 gr. 2 fr.
 » Neumanni.
 » nitida.
 » » *Autumn glory*.
 » occidentalis.
 » purpurea, 10 gr. 2 fr.
 » » grandiflora, 10 gr.
 3 fr. Excellente pour la fl.
 coupée.
 » purpurea nana.
 » » splendens, 10 gr. 3 fr.
 » pinnata.
 » submentosa.

Les Roubecques sont d'entre les meilleures et les plus précieuses des pl. vivaces ; leurs fleurs. très apparentes, en capitules jaune et noir chez la plupart, rouge sombre ou carmin chez intermedia purpurea, durent longtemps et sont excellentes pour la fleur coupée. Culture des plus facile.

- Ruellia ciliosa.
 Rumex alpinus.
 » flexuosus (feuillage brun foncé).
 » hydrolapathum.
 » venosus.
 Ruscus aculeatus.
 » racemosus.
 Ruta angustifolia.
 » graveolens, 10 gr. 1 fr.
 » patavina.
 Sagina Linnæi.
 » subulata.
 Salix reticulata.
 » retusa.
 Salvia æthiopis.
 » argentea.
 » azurea, 2 gr. 1 fr.
 » » grandiflora, 2 gr. 1 fr. 50.
 » » alba.
 » Bertoloni.
 » candelabrum.
 » cypria.
 » exigua.
 » globosa.
 » glutinosa (sauge à fl. jaunes).
 » Horminum (bractées colorées).
 » mellifera.
 » officinalis.
 » » major.
 » » à fl. blanches.
 » pratensis.
 » » à fl. blanches.
 » » à fl. roses.
 » » bicolor.

- Salvia ringens.
 » scabiosæfolia.
 » Sclarea.
 » verbascifolia.
 » verticillata alba.
 Samolus Valerandi.
 Sanguinaria canadensis.
 Sanguisorba canadensis.
 » Vallistellina.
 Sanicula europaea.
 » Marylandica.
 Santolina chamæcyparissus.
 » pectinata.
 » rosmarinifolia.
 Saponaria bellidifolia (à fl. jaunes),
 5 gr. 2 fr.
 » cæspitosa.
 » glutinosa.
 » lutea, 5 gr. 4 fr.
 » ocymoides, 5 gr. 2 fr.
 » » v. splendens.
 Le sap. ocym. est l'une des meilleures des pl. de rocailles ; elle croît au soleil, retombe gracieusement et se recouvre, en mai-juillet, de nombreuses fl. roses.
 » officinalis.
 » pulvinaris.
 Sarcocapnos speciosa (*Corydale à fl. roses*).
 Sarothamnus scoparius.
 Sarracenia purpurea.
 Satureya diffusa.
 » intermedia.
 » montana, l'une des meilleures pl. pour garnir les lieux secs et stériles (mellifère), 10 gr. 2 fr.
 » pygmæa.
 » repanda.
 Saussurea albescens.
 » alpina.
 » decurrens.
 » depressa.
 » discolor.
 » pymæa.
 Saxifraga aizoides, 5 gr. 3 fr.
 » » var. atrorubens.
 » Aizoon, 5 gr. 3 fr.
 » » à fl. rose vif.
 » ajugæfolia.
 » Alberti.
 » Allionii, tapissante et très basse.
 » altissima.
 » ambigua.
 » auceps.

Saxifraga androsacea.

- » *aphylla.*
- » *apiculata.*
- » *aquatica.*
- » *arachnoidea.*
- » *aretioides.*
- » *aspera.*
- » *atropurpurea.*
- » *augustana.*
- » *australis.*
- » *Bertoloni.*
- » *biflora.*
- » *blepharophylla.*
- » *Boryi.*
- » » *major.*
- » *brevifolia.*
- » *bronchialis.*
- » *Brunoniana.*
- » *bryoides.*
- » *bulbifera.*
- » *Burseriana.*
- » *caesia.*
- » *cæspitosa*, 5 gr. 4 fr.
- » *californica.*
- » *Camposii.*
- » *canaliculata.*
- » *capitata.*
- » *carinthiaca.*
- » *caroliolica.*
- » *carpathica.*
- » *cartilaginea.*
- » *catalaunica.*
- » *ceratophylla.*
- » *cernua.*
- » *cervicornis.*
- » *chrysoplenifolia.*
- » *circuenta.*
- » *cochlearis*, 5 gr. 4 fr.
- » *coniferæe.*
- » *controversa.*
- » *coriophylla.*
- » *Cotyledon.*
- » *Cotyledon* × *aizoon.*
- » *Cotyledon angustifolia.*
- » *crustata.*
- » » *major.*
- » *cuneata.*
- » *cuneifolia.*
- » *Cymbalaria* (annuel à fl. jaunes).
- » *cymosa.*
- » *decipiens*, 1 gr. 1 fr. 50.
- » *demissa.*
- » *diapensioides.*
- » *diversifolia.*
- » *elatior.*
- » *erosa.*
- » *exarata.*
- » *Facchini.*

Saxifraga Ferdinand-Coburgi.

- » *flagellaris.*
- » *flavescens.*
- » *florulenta.*
- » *Forbesi.*
- » *Fortunei.*
- » *Friedrich-Augusti.*
- » *Gaudini.*
- » *gemmifera.*
- » *geranioides.*
- » *Geum*, 5 gr. 3 fr.
- » *Gibraltarica.*
- » *globulifera.*
- » *gracilis.*
- » *granulata.*
- » » × *decipiens.*
- » *Grisebachii.*
- » *Guilford seedling.*
- » *Hausmanni.*
- » *hederacea.*
- » *Hedærantha.*
- » *heucherifolia.*
- » *Hieracifolia.*
- » *Hirculus*, 1 gr. 1 fr. 50.
- » » *var. grandiflora.*
- » *Hostei.*
- » *Huetii.*
- » *hypnoides.*
- » *intacta.*
- » *intricata.*
- » *Iratiana.*
- » *irrigua.*
- » *Islandica.*
- » *juniperina.*
- » *Kinlayi.*
- » *Kolenatiana.*
- » *Labradorica.*
- » *lævis.*
- » *Lantoscana.*
- » *lasiohylla.*
- » *latepetiolata.*
- » *leucanthemifolia.*
- » *lingulata* (vrai).
- » *longifolia* (vrai), 5 gr. 6 fr.,
1 gr. 1 fr. 50.
- » *longifolia* × *pyramidalis.*
- » » × *cochlearis.*
- » » *multicaulis.*
- » *luteo-purpurea.*
- » *luteo-viridis.*
- » *Mac Nabiana.*
- » *madeiren-sis.*
- » *mædia* (*calyciflora*).
- » *mandschouriensis.*
- » *marginata.*
- » *Mertensiana.*
- » *micrantha.*
- » *micranthidifolia.*

Saxifraga moschata.

- » muretti.
- » murithii (Mont-Cenis).
- » muscoides.
- » » atrorubens.
- » mutata (fl. orangé), 5 gr. 4 fr.
- » nervosa.
- » nivalis.
- » Nutkana (Canada).
- » oppositifolia, 1 gr. 1 fr. 50.
- » » grandiflora.
- » patens (caesia \times mutata).
- » pectinata.
- » pedata.
- » pedatifida.
- » pedemontana.
- » peltata.
- » pennsylvanica.
- » pentadactylis.
- » pentaphylla.
- » petræa.
- » planifolia.
- » polyphylla.
- » porophylla.
- » Portæ.
- » primuloides.
- » Probyni.
- » Prostii.
- » pseudo-Kotschyi.
- » pseudo-sancta.
- » pubescens.
- » pulchella.
- » punctata.
- » purpurescens.
- » pyramidalis.
- » pyrenaica.
- » ranuncifolia (ex Canada).
- » recta.
- » retusa.
- » rhætica.
- » Rhei superba.
- » rivularis.
- » Rocheliana.
- » rosularis.
- » rotundifolia.
- » Salomoni.
- » sancta.
- » sarmentosa.
- » scardica.
- » Segueri.
- » serratifolia.
- » sibirica.
- » Siebthorpi.
- » splendens.
- » sponhemica.
- » squarrosa.
- » Stabiana.
- » stellaris.

Saxifraga stenoglossa.

- » stenopetala.
- » Sternbergi.
- » sturmiana.
- » supraaizoides.
- » Tellimoides.
- » tenella.
- » Thessalica.
- » Tolmiae (ex Canada).
- » Tombeanensis.
- » tricuspidata (ex Groënland).
- » trifida.
- » umbrosa, 5 gr. 3 fr.
- » Valdensis.
- » varians.
- » villosa.
- » virginienensis (ex Canada).
- » Vochinensis.
- » Wettsteini.
- » Willkommiana.
- » Zelebori.
- » Zimeterii.

Germent avec facilité, mais, à cause de l'extrême ténuité de leurs graines, il faut soigner les semis et ne pas arroser trop fort. Il est bon de ne pas recouvrir les gr. et de semer à la surface du sol.

Scabiosa agrestis.

- » » alba.
- » amoena.
- » argentea.
- » caucasica.
- » » perfecta.
- » » à fl. blanches.
- » » alba grandiflora.
- » cretica.
- » graminifolia, 5 gr. 2 fr.
- » japonica (Japon).
- » Lagodechiana.
- » lucida.
- » » à fl. blanches.
- » lyratifolia (fl. grenat vif).
- » ochroleuca.
- » Olgae, 2 gr. 1 fr.
- » petræa.
- » songarica.
- » suaveolens.
- » talishensis.
- » Wulfeni.

Schivereckia Bornmülleri.

- » podolica.

*Scopolia carniolica.**Scorodonia foetida.**Scorzonera austriaca.*

- » rosea.

Scrophularia alata.

Scrophularia Hoppii.

- » juratense.
- » Marylandica.
- » pyrenaica.
- » vernalis.

Scutellaria alpina.

- » » à fl. blanches.

La Scut. alp. est une excell.
pl. traînante à fl. bleu lilas et
blanc chez le type, très robuste
et florifère.

- » altissima.
- » Baikalensis. Superbe pl. à gran-
des fl. bleues.
- » macrantha.
- » orientale.
- » tuberosa.

Sedum acre.

- » acutifolium (Orient).
- » aizoon.
- » albescens.
- » albidum.
- » album.
- » alsinæfolium.
- » altissimum.
- » anacampseros.
- » anopetalum.
- » asiaticum.
- » atratum.
- » atropurpureum.
- » Beyrichianum.
- » Brownei.
- » carpathicum.
- » corsicum.
- » cruciatum.
- » dasiphyllum.
- » divergens.
- » Douglasi.
- » elegans.
- » Euphorbioides.
- » Ewersii.
- » fabaria.
- » Forsterianum.
- » gemmi ferum.
- » glaucum.
- » Hispanicum.
- » kamtschaticum.
- » Kirilowi.
- » Laggeri.
- » Littoreum.
- » Lydium.
- » maximowiczii.
- » maximum.
- » nicaense.
- » obtusatum.
- » olympicum.
- » oppositifolium.
- » oreganum.

Sedum pallidum.

- » pilosum.
- » populifolium
- » Pottsi.
- » pruinatum.
- » pulchellum.
- » purpurescens.
- » reflexum.
- » Rhodantum.
- » rigidum.
- » rubens.
- » rubricaula (Tessin).
- » serotinum.
- » Sempervivum (Cotyled. Semp).
- » sexifidum.
- » spathulifolium.
- » spectabile.
- » » splendens.
- » spurium.
- » Stahli.
- » stenopetalum
- » stoloniferum.
- » telephium.
- » turgidum.
- » villosum.
- » wallichianum.

*Selliera radicans (Goodenia radicans).**Sempervivum acuminatum.*

- » alpinum.
- » anomalum.
- » arachnoideum.
- » arvernense.
- » assimile.
- » atrovioleaceum.
- » boutignanum.
- » Braunii.
- » bungeanum.
- » Christii.
- » ciliosum.
- » cinarescens.
- » comoli.
- » debile.
- » dolimiticum.
- » Fauconnetti.
- » fimbriatum.
- » flagelliforme.
- » Fontanae.
- » gaudini.
- » glaucum.
- » globiferum.
- » Haussmanni.
- » heuffeli.
- » hirtum.
- » Juratense.
- » Kapaornikense.
- » Lamottei.
- » leucanthum.
- » mettenianum.

Sempervivum montanum.

- » Morelianum.
- » parvulum.
- » patens.
- » Pittonii.
- » pomelii.
- » pyrenaicum.
- » Reginae-Amaliae.
- » Requiennii.
- » robustum.
- » rubicundum.
- » rupicolum.
- » spinulifolium.
- » tectorum.
- » tenellum.
- » Theobaldi.
- » Thomayeri.
- » tomentosum.
- » triste.
- » Valesiacum.
- » veninensis.
- » Verloti.
- » Wulfeni.
- » Zelebori.
- » diverses espèces en mélange.

Senecillis carpathica.**Senecio abrotanifolius.**

- » adonidifolius.
- » ætnensis.
- » alpinus.
- » aurantiacus (*Cineraria aurant.*).
- » carniolicus.
- » clivorum.
- » cordatus.
- » coriaceus.
- » Correvonianus.
- » doricum, 10 gr. 5 fr.

C'est le beau « *Soleil d'or* »
des Alpes, à capitules orange :
pl. très brillante et aimant le
soleil et la rocaille.

- » Fendleri.
- » Fuchsii, 5 g. 2 fr., pr ombre
- » incanus, 1 gr. 1 fr. 50.
- » jacquinianus.
- » Ligularia.
- » macrophyllus.
- » nebrodensis.
- » palmatifidus.
- » pseudo-Arnica.
- » pulcher.
- » quinqueligulatus.
- » sarracenicus, 10 gr. 5 fr., pour
l'ombre.
- » stenocephalus.
- » Tanguticus.
- » thapsoides.
- » tyrolense.

Senecio uniflorus.

- » Veitchianus.
- » Wilsonianus.

Serratula monticola.

- » nudicaulis.
- » radiata.
- » Vulpii.

Seseli caespitosa.

- » gummifer.

Sibbaldia maxima.**Sibbaldia parviflora.**

- » procumbens.

Sidalcea candida.

- » malvæflora.

Sideritis condensata.

- » Eubæa.

- » hyssopifolia.

Silene acaulis, 5 gr. 4 fr.; 1 gr. 1 fr.

- » » à fl. blanches.

- » » grandiflora.

- » alpestris.

- » alpina.

- » asterias (fl. en capitules, d'un
rouge ardent), 10 gr. 2 fr.

- » asterias grandiflora.

- » auriculata.

- » biflora.

- » bryoides, 5 gr. 4 fr.; 1 gr. 1 fr.

- » ciliata.

- » cordifolia.

- » Correvoniana.

- » dinarica.

- » Drummondii.

- » Elisabethæ.

- » elongata.

- » exscapa, 1 gr. 1 fr.

- » fimbriata.

- » flavescens.

- » Fortunei, 5 gr. 2 fr.

Ressemble à l'œillet superbe.

- » fruticulosa.

- » galatea.

- » Græfferi.

- » Legionensis.

- » Lerchenfeldiana.

- » maritima.

- » melandriiformis.

- » mollissima.

- » monachorum.

- » nutans.

- » odontopetala.

- » oreades.

- » Otita.

- » Parnassi.

- » petræa.

- » pumilio.

- » pusilla.

- » quadrifida.

Silene reichenbachiana.
 » *rupestris.*
 » *rupicola.*
 » *saxifraga*, 5 gr. 2 fr.
 » *Schafta*, 5 gr. 2 fr.
 L'une des rares pl. saxatiles
 d'automne; fl. d'un carmin vif,
 cult. facile.
 » *Tatarica.*
 » *Tomasiniana.*
 » *tridensata.*
 » *valesia.*
 » *Veselowskyi.*
 » *Zawadsky*, 10 gr. 2 fr.
Silphium lanceolatum.
 » *terebinthaceum.*
Sissimbrium strictissimum.
Sissyrinchium anceps.
 » *Bermudianum.*
Smilacina amplexicaulis (Canada).
 » *racemosa.*
 » *californicum.*
 » *stellata.*
Smilax aspera.
Sobolewsia clavata.
Solanum calophyllum.
 » *Rantonnetii* (ex. Rep. Argent.).
Soldanella alpina.
 » *montana.*
 » *pusilla.*
Solidago alpestris.
 » *canadensis.*
 » *Drummondi.*
 » *humilis.*
 » *missouriensis.*
 » *nitida.*
 » *pallida.*
 » *puberula*, 10 gr. 4 fr.
 » *pygmæa.*
 » *reflexa.*
 » *Riddeli.*
 » *rigida*, 10 gr. 4 fr.
 » *rigidiscula*, 10 gr. 4 fr.
 » *serotina.*
 » *Shortii.*
 » *spectabilis.*
Spartium junceum, 10 gr. 2 fr. Le
 beau genêt d'or du Midi.
Sphaeralcea munroana.
Spigelia Marylandica.
Spiræa cæspitosa.
 » *filipendula.*
 » *Kamtschatica.*
 » *palmata.*
Specularia speculum (*Miroir de Vé-*
 nus).
Stachys coccinea.
 » *corsica.*

» *citrina.*
 » *Strybnuy.*
 » *lanata.*
 » *scardica.*
Statice auriculata.
 » *coccinea.*
 » *Gmelini.*
 » *latifolia.*
 » *Limonium.*
 » *occidentalis.*
 » *sinensis.*
 » *Suworowi.*
 » *virgata.*
Statice des Canaries, non rustiques
 chez nous, mais qui constituent
 une ressource précieuse pour
 la serre froide et les appartements,
 grâce à leur perpétuelle
 floraison :
 » *arborescens* (*Statice* en arbre).
 » *brassicæformis.*
 » *fruticans* (*Statice* en arbre).
 » *hybrida.*
 » *imbricata.*
 » *macrophylla.*
 » *macroptera.*
 » *Perezii.*
 » *Perezii* × *imbricata.*
 » *puberula.*
 Ces superbes pl. s'élèvent très facilement
 de graines.
Stipa gigantea.
 » *pennata.*
Stobæa membranifolia.
 » *radula.*
Stockesia cyanea.
Streptopus amplexifolius.
 » *brevipes* (ex Canada).
 » *roseus* (ex Canada).
Stylophorum diphyllum.
 » *japonicum.*
 » *lasiocarpum.*
Styrax Japonica.
 » *Obassia.*
Suæda glauca (ex Japon).
Swertia connata.
 » *longifolia.*
 » *perennis.*
Symphandra armena.
 » *Hoffmanni.*
 » *transcaucasica.*
Symphitum Bohemicum.
 » *bulbosum.*
Synedesis aconitifolia.
Synthiris pinatifida.
 » *reniformis.*
Tamus communis.
Tanacetum macrophyllum.

Tanacetum vulgare.

Tanakæ radicans.

Telekia speciosa, 10 gr. 2 fr.

» *speciosissima* (vrai).

Telephium imperati, 10 gr. 2 fr.

Telephium orientale, 10 gr. 2 fr.

Tetragonolobus purpureus.

» *siliquosus.*

Teucrium aureum.

» *canum.*

» *Chamædrys*, 10 gr. 4 fr.

» *divaricatum.*

» *Eugenæum.*

» *flavum.*

» *lucidum.*

» *lusitanicum.*

» *massiliense* (Herbe aux pommes).

» *montanum.*

» *orientale*, à fl. très élégantes. 10 gr. 5 fr.

» *polium.*

» *pseudo-Chamædrys.*

» *pyrenaicum.*

» *Scorodonia.* Excellent pour sous-bois, 10 gr. 4 fr.

Thalictrum aquilegifolium, 10 g. 3 fr.

Le délicat Pigamont aux élégants panicules lilas.

» *adiantifolium.*

» *cornuti.*

» *Delavayi*, espèce chinoise superbe; 5 gr. 4 fr.

» *diphterocarpum* (id.), 1 g. 1 f. 50

» *dioicum.*

» *flavum.*

» *fœtidum.*

» *glaucum.*

» *macrocarpum.*

» *majus*, 10 gr. 2 fr.

» *minus.*

Jolie verdure fine et gracieuse.

» *occidentale* (ex Canada).

» *rubellum.*

» *saxatile.*

Thelesperma gracilis.

Thermopsis Fabacea.

» *lanceolata.*

» *montana.*

» *rhombifolia.*

Thladiantha dubia.

Thlaspi bellidifolia.

» *cepæfolia.*

» *Kowatzi.*

» *limosellaefolia.*

» *microstyla.*

» *montana.*

Thlaspi rotundifolia, 5 gr. 4 fr.

» *violascens.*

Thymus marchallianum.

» *serpyllum.*

Tiarella cordifolia (jolie pl. d'ombre).

» *poliphylla.*

» *purpurascens.*

Tithonia tagetiflora.

Tofieldia calyculata.

» *glacialis.*

Tofieldia glutinosa (ex Canada).

» *rubescens.*

Tolmizæ Menziesii.

Tournefortia heliotropioides.

Towsendia grandiflora.

» *Wilcoxiana.*

Trachelium coeruleum.

Tradescantia undulatifolia.

Tragopogon porrifolius.

Trautvetteria palmata (ex Canada).

Trientalis europea.

» *canadensis* (ex Canada).

Trifolium alpinum.

» *Badium.*

» *ochroleucum.*

» *pannonicum.*

» *spadiceum.*

Trillium atropurpureum.

» *californicum.*

» *cernuum.*

» *grandiflorum.*

» *Kamtschaticum.*

» *pendulum.*

Triosteum pinnatifidum.

Tritoma, voir *Kniphofia*.

Trollius albiflorus.

» *altaicus.*

» *americanus.*

» *asiaticus.*

» *aurantiacus.*

» *caltheoides.*

» *europæus*, 10 gr. 2 fr.

Le beau « Globe d'or » des reg. mont. qu'on élève et cultive facilement. Il fleurit abondamment si on lui donne un sol sain et une situation un peu fraîche. On en fait aussi de merveilleux bords d'étangs ou ruisseaux.

» *hybridus.*

» *japonicus.*

» *ledebourii.*

» *pumilus.*

» *sibiricus.*

Tropæolum poliphyllum.

» *pentaphyllum.*

Tulipa greigii, la plus belle des tulipes.

» *Darwini.*

Fulipa marjoletti.
 » *Turkestinaca.*
Tunica saxifraga, 10 gr. 3 fr.
 » à fl. blanches.
Tweedia cœrulea.
Ulex europæus (ajonc), 10 gr. 2 fr.
Umbilicus pendulinus.
 » *semenovi* (v. en outre *Cotyledon*).
Uniola latifolia.
Vaccinium Myrtillus (*Myrtille*).
 » *pennsylvanicum.*
 » *uliginosum.*
 » *Vitis-Idæa* (*Airelle*).
Valeriana alliariæfolia.
 » *Dioscoridis.*
 » *exaltata.*
 » *globulariæfolia.*
 » *longiflora* (merveille orientale aux fl. rouge carmin vif).
 » *macrophylla.*
 » *montana.*
 » *officinalis.*
 » *pyrenaica.*
 » *Saliunca.*
 » *sitchensis* (ex Canada).
 » *supina.*
 » *tripteris.*
Vancouveria hexandra.
Vella spinosa.
Veratrum album.
 » *californicum.*
 » *nigrum.*
Verbascum Blattaria.
 » *Hænki.*
 » *mucronatum.*
 » *Olympicum*, 5 gr. 2 fr.
 » *Phœniceum.*
 » *Songaricum.*
 » *Thapsus.*
Verbena venosa (*Verveine rustique*).
Vernonia altissima.
 » *Arkansana.*
 » *gigantea.*
 » *glauca.*
Veronica Allionii.
 » *alpina.*
 » *amethystina.*
 » *aphylla.*
 » *argentea.*
 » *austriaca.*
 » *Balcana.*
 » *bellidioides.*
 » *Bidwilli.*
 » *buxifolia.*
 » *carnea.*
 » *caucasica.*
 » *Chamœdrys.*

Veronica cinerea.
 » *crassifolia*, 10 gr. 3 fr.
 Grande pl. vivace à longs épis bleu foncé.
 » *foliosa.*
 » *fruticulosa.*
 » *gentianoides.*
 » *grandis.*
 » *Hulkeana.*
 » *incana.*
 » *longifolia*, 10 gr. 3 fr. } *melli-*
 » *maritima.* » } *fères.*
 » *alba.*
 » *maxima.*
 » *malisseæfolia.*
 » *multifida.*
 » *nummularia.*
 » *officinalis.*
 » *orchidea.*
 » *oxyphylla.*
 » *paniculata*, belle plante vivace recherchée des abeilles; longs épis bleus, 10 gr. 2 fr.
 » *pectinata.*
 » *Ponæ.*
 » *prenja.*
 » *prostrata.*
 « » *alba.*
 » *rupestris.*
 » *satureyoides.*
 » *saxatilis.*
 » » à fl. blanches.
 » *serpyllifolia.*
 » *spicata.*
 » » à fl. blanches.
 » *stenophylla.*
 » *tenuifolia.*
 » *Teucrium*, fl. bleu d'azur, mai-août, 10 gr. 3 fr.
 » *Traversi.*
 La V. *Traversi* est la meilleure et la plus rustique des véroniques en arbustes, à feuilles opposées, persistante, à fl. en grappes d'un bleu pâle; c'est l'une des meilleures décorations des jardins dans nos pays, où il est regrettable qu'elle ne soit pas plus répandue. Excellente aussi pour la fleur coupée, 10 gr. 2 fr.
 » *urticæfolia.*
Vesicaria sinuata.
 » *græca.*
 » *utriculata.* Belle esp. à fl. jaunes à planter dans les fentes de rochers, 10 gr. 3 fr.
Vicia aurantiaca.

Vicia dumetorum.

- » *fulgens.*
- » *Onobrychioides.*
- » *unijuga.*

Viola adunca (ex Canada).

- » *alpina.*
- » *altaica.*
- » *arenaria.*
- » *atlantica.*
- » *Bertolini.*
- » *biflora.*
- » *Bosniaca.*
- » *calcarata.*
- » » *à fl. blanches.*
- » » *flavescens.*
- » » *grandiflora.*
- » » *superflorens.*
- » *campestris.*
- » *canina.*
- » » *alba.*
- » » *rubra.*
- » *cenisia.*
- » *cognata.*
- » *comollia (vrai).*
- » *cornuta, 10 gr. 4 fr.*
- » » *à fl. blanches, 10 g. 4 f.*
- » » *var. perfection.*
- » » *var. à fl. roses.*
- » *declinata.*
- » *delphinantha (ex Mont Athos).*
- » *delphinifolia.*
- » *dissecta.*
- » *distans.*
- » *elatior.*
- » *Eugenia.*
- » *Florariensis (variété hybride,*
 voisine de rothomagensis et
 qui fleurit perpétuellement;
 l'une des meill. fl. alpines).
 10 gr. 6 fr.
- » *Florar. alba.*
- » » *tricolor.*
- » *glabella (ex Canada).*
- » *gracilis.*

Viola heterophylla.

- » *Jovi.*
- » *Labradorica (ex Canada).*
- » *latisejala.*
- » *lutea.*
- » *macedonica.*
- » *multifida.*
- » *munbyana.*
- » *nuttalli (ex Canada).*
- » *oreocallis (ex Canada).*
- » *orphanides.*
- » *palustris.*
- » *Patrini.*
- » *pedatifida.*
- » *pinnata.*
- » *praemorsa (ex Canada).*
- » *prionantha.*
- » *pubescens (ex Canada).*
- » *rothomagensis.*
- » *sagittata.*
- » *sarmentosa (ex Canada).*
- » *stagnina.*
- » *sudetica.*
- » *Taygetea (ex Graecia).*
- » *Tommasiniana.*
- » *uliginosa.*
- » *Wiedemanni.*
- » *Zoyzii.*

Vittadenia triloba. Délicieuse pâquerette rose en touffe, qui fleurit perpétuellement et décore admirablement rocailles, talus et vieux murs.

Waldstenia fragarioides.

Wahlenbergia lobelioides.

- » *nutabunda.*

- » *saxicola.*

Wiedemannia orientalis.

Wulfenia carinthiaca.

Xanthoceras sorbifolia, 10 gr. 1 fr.

Yucca glauca.

Zauschneria californica.

Zoyzinia absinthifolia.

Ouvrages de M. H. CORREVON
EN VENTE CHEZ L'AUTEUR A FLORAIRE
(Les frais de port sont comptés en plus)

- Les Fougères rustiques**, Genève 1890, à disposition : 4 ex. **Fr. 6.—**
- Les Orchidées rustiques**. Ouvrage de 250 pages, illustré de 34 gravures. (Il en reste 8 ex.) » **5.—**
- Les plantes alpines et de rocailles**. *Leur culture et leur acclimatation dans nos jardins*. Un volume relié toile, de 200 pages avec plusieurs illustrations » **2.50**
- Les Fougères de pleine terre, les Prêles, Lycopodes et Sélaginelles rustiques**. Un volume relié toile, 140 pages avec illustrations » **2.50**
- Les iris dans les jardins**, par MM. H. CORREVON et H. MASSÉ.
 Un volume de 204 pages, avec 9 figures » **4.—**

Culture des plantes alpines dans le sphagnum
pour les climats méridionaux et secs
Prix : 1 franc.

LE MÊME EN LANGUE ITALIENNE : 1 franc.

LISTE DES OUVRAGES DE M. CORREVON

qui sont épuisés et que l'auteur rachèterait volontiers

- Les plantes des Alpes**, Genève 1885 tiré à 1200 ex.
- Les Fougères rustiques**, Genève 1890. » 1200 »
- Flore coloriée de poche**, Paris 1898 » 10000 »
La traduction italienne du D^r Vacari qui est également épuisée.
- Le Jardin de l'Herboriste** (2^e édition). » 1400 »
- Album des Orchidées**, Genève 1899 » 800 »
- Fleurs et Montagnes**, volume de poésies, Genève 1902 » 1200 »

Les personnes qui pourraient offrir ces volumes ou nous indiquer où nous pourrions les trouver, nous obligeraient en le faisant, plusieurs amateurs désirant les obtenir.

La Collection des ouvrages de M. CORREVON a obtenu le prix d'honneur
offert par la Société d'horticulture de Neuchâtel
à l'Exposition nationale suisse, en 1896, et plusieurs médailles d'or, de vermeil
et d'argent dans les Expositions françaises, italiennes et suisses

EN VENTE CHEZ L'AUTEUR A FLORAIRE

ATLAS DE LA FLORE ALPINE

Edition française par H. CORREVON

Edité par le Club Alpin allemand et autrichien. — 500 planches coloriées, admirablement exécutées, en 5 volumes et un volume de texte (épuisé); il en reste 2 ex. fr. 75.—

LE JARDIN DE L'HERBORISTE

Nouvelle édition avec index très complet (110 gravures). — Propriétés et culture des simples et plantes officinales (épuisé; il en reste 6 ex.). fr. 5.—

PAR MONTS ET PAR VAUX

Un vol. de 232 pages. — Avec nombreuses illustr. de M^{lle} Adèle CORREVON (épuisé; il en reste 5 exemplaires) fr. 5.—

NOS ARBRES

Un volume in-8°, richement illustré fr. 7.50

LA FLORE ALPINE

Par H. CORREVON et P. ROBERT

Ouvrage de luxe, richement et admirablement illustré, 100 planches coloriées et 178 figures de plantes alpines les plus répandues; 220 pages de texte donnant la description de la flore alpine, son acclimatation dans les jardins, etc. fr. 25.—

L'édition anglaise a paru en 1912, à Londres; trad. de M. Clayforth.

Fleurs des champs et des bois, des haies et des murs

Par Henry CORREVON. — Avec 100 planches en couleurs par M^{lle} S. RIVIER.

PLAN DE L'OUVRAGE :

Introduction : L'amour du beau et du vrai; sachons jouir de ce que nous trouvons dans la nature.

Chap. I. — Le printemps dans les prés, le long des haies, des murs et des taillis.

Chap. II. — Promenades d'été sous bois, à travers champs, dans les rochers et sur les monts.

Chap. III. — Fleurs d'automne.

Chap. IV. — Murailles fleuries. — Le jardin et ses joies.

Chez l'auteur au prix de fr. 25.— (£ 1).

Cet ouvrage, tiré à 3000 ex., a eu un succès si complet qu'il n'en est plus qu'un nombre limité d'exemplaires.

Vient de paraître :

Les plantes des montagnes et des rochers,

Fougères et Orchidées rustiques, Cactées et Lys.

Prix : fr. 10.—

FLORAIRE

1914-1915

≡ SEEDS ≡

32nd Catalogue of seeds

(alpine and herbaceous plants)



FLORAIRE
CHÉNE-BOURG
GENÈVE

Notice to English customers.

Orders for seeds received here at Floraire are punctually attended to, and the parcels of seeds are sent direct to England. We generally forward them as « samples » and the price of postage is very low. (1-6d) In war time we send them registered for the trifling extra charge of 2 ½ d more.

Our English agent is Mr E. W. Clayforth. Oak Mount, Highfield, Southampton. All orders sent to him are transmitted to us and executed as promptly and punctually as possible.

Application can also be made to him for catalogues and seeds from every part of the British Isles.

Good-sized packets of seeds are sold at 5 d. The only difference being that in the case of rarer seeds fewer are put into the packet.

There are some seeds of which we have larger quantities and they are offered by weight (per gramme, a gramme being the 30th part of an oz. so that 10 gr. = to 1/3 oz. As owing to the war no seeds can be procured from Germany, we foresee that our seeds will be in great request, so intending purchasers are invited to send in their orders at an early date. The first orders received will be the first executed. After the end of January a large lot of seeds will probably be sold out of those we offer by weight. Therefore we cannot guarantee this part of our selling.

LISTE DES GRAINES

OFFERTES PAR LE

JARDIN CORREVON

(Jardin alpin d'acclimatation)

Floraire — Chêne-Bourg, GENÈVE

Nous ne donnons pas ici la description des plantes parce que la plupart de nos clients possèdent le volume « Plantes de montagnes et de rochers et leur acclimatation », par H. Correvon et que, d'autre part, notre catalogue de plantes contient plusieurs de ces descriptions. Voir aux annonces.

Toutes nos semences se vendent au prix de 50 cent. le paquet

Cette année-ci nous sommes en mesure de fournir un certain nombre d'espèces au poids, et nous indiquons leurs prix spéciaux en marge des noms.

Les personnes que le choix d'une collection embarrasse peuvent nous abandonner ce soin. Nous faisons des collections de graines à notre choix :

12 espèces pour	5 francs
25 » »	10 »
50 » »	20 »
100 » »	40 »

This year we are able to offer any of our seeds in larger quantity, so we put the price for those kinds (the most valuable and popular) by weight. The gramme = $\frac{1}{30}$ oz.

Our seeds are all sold to the price of 50 cts. (5 d.) each paquet.

We make collections to our own choice :

12 kinds for	5 francs (4 sh.)
25 » »	10 » (8 sh.)
50 » »	20 » (16 sh.)
100 » »	40 » (32 sh.)

GRAINES DE PLANTES

DE

Montagnes et de Rochers, d'Arbustes de Rocaille

ET DE

PLANTES VIVACES

Pour simplifier, nous avons placé sous cette rubrique les graines reçues en 1913 du Canada, des Balkans, du Japon, de l'Himalaya, du Caucase, des Etats Unis, du Turkestan, d'Orient, des Canaries, des Carpathes, de Grèce, de Groënland, etc. La plupart de nos graines pourtant ont été récoltées par nous soit à Floraire, soit dans les Alpes en 1913.

Pour la première fois nous offrons quelques-unes de nos graines, celles qui sont le plus demandées et dont nous avons plus ample provision, au poids.

10 grammes (10 gr.) = $\frac{1}{3}$ once. 5 gr. = $\frac{1}{6}$ etc.

Toutes se vendent à raison de 50 cent., soit 5 d. le paquet :

Abutilon vitifolium.

Acæna australis.

- » *brevibracteata*.
- » *Buchanani*.
- » *cæsiiglauca*.
- » *glabra*.
- » *glaucophylla*.
- » *microphylla*.
- » *multiglomerulans*.
- » *myriophylla*.
- » *ovalifolia*.
- » *ovinamaxima*.
- » *sarmentosa*. 10 gr. 2 fr.
- » *sericea*.

Charmantès plantes gazonnantes propres à garnir les rocailles et les sous-bois.

Acantholimon Fomini.

- » *glumaceum*.
- » *graminifolium*.
- » *lepturoides*.
- » *tenuiflorum*.
- » *venustum*.

Acanthus mollis. 10 gr. 1 fr.

Acanthus spinosus. 10 gr. 1 fr.

Achillea abrotanoides.

- » *ageratifolia*.
- » *ageratum*. 10 gr. 2 fr.
- » *atrata*.
- » *carpathica*.
- » *Clavenæ*.
- » *Correvoiana*.
- » *fililoba*.
- » *filipendula*.
- » *herba Rota*.
- » *hybrida*.
- » *impatiens*.
- » *impunctata*.
- » *Kellereri*.
- » *ligustica*. 10 gr. 4 fr.
- » *lingulata*.
- » *macrophylla*. 5 gr. 2 fr.
- » *moschata*. 5 gr. 5 fr.

Achillea nana.

- » *Ptarmica* « The Pearl ».
- » *pyrenaica*.
- » *rupestris*.
- » *serbica*.

- Chillea serrata*.
 » setacea, belle espèce basse à fl. jaune vif. 10 gr. 5 fr.
 » sibirica.
 » Taygetæa.
 » tomentosa.
 » umbellata.
 » Vandasii. 5 gr. 5 fr.
Conium anthora. 5 gr. 2 fr.
 » autumnale.
 » barbatum.
 » Cammarum. Belle plante vigoureuse et solide aux fleurs bleu violacé. 10 gr. 3 fr.
 » Columbianum.
 » ferox.
 » flavescens.
 » japonicum.
 » lycoctonum.
 » napellus. 10 gr. 2 fr.
 » à fl. blanches.
 » à fl. roses.
 » paniculatum. Espèce élancée, aux tiges étalées en candélabres.
 » pyrenaicum.
 » septentrionale.
 » tauricum.
 » umbrosum.
 » uncinatum.
 » variegatum.
 » var. album.
 » Wilsoni, superbe esp. nouvelle. 5 gr. 5 fr.
Cytæa rubra. 5 gr. 2 fr.
 » spicata. 5 gr. 2 fr.
Adenocarpus complicatus
Adenophora communis. 10 gr. 5 fr.
 » denticulata. 10 gr. 5 fr.
 » liliifolia. 10 gr. 5 fr.
 » à fl. blanches.
 » polymorpha. 10 gr. 5 fr.
 » Potanini. 10 gr. 6 fr.
 » alba.
 » stylosa.
 » verticillata (vrai). 5 gr. 5 fr.
 Les Adénophores sont des campanules gracieuses à floraison prolongée et très solides.
Adenostyles albifrons, 10 gr. 4 fr.
 » alpina, 10 gr. 4 fr.
 » Kernerii.
 » leucophylla, 10 gr. 5 fr.
Adonis apennina.
 » pyrenaica, 10 gr. 5 fr.
 Plante rare et belle, à floraison précoce.

Adonis vernalis. Grande Anémone à fl. d'or; Mars-Avril, 10 gr. 2 fr.

- Aethionema armenum*.
 » arabicum.
 » Cappadocicum.
 » cardiophyllum.
 » cordatum (*Eunomia cordata*).
 » coridifolium.
 » diastrophis.
 » gracilis.
 » grandiflorum, 10 gr. 8 fr.
 » iberidum.
 » persicum.
 » pulchellum.
 » rotundifolium.
 » saxatile, 10 gr. 4 fr.
 » schistosum.
 » stylosum.
 » Thomasianum (rarissime).
 » trinervium.

Les Aethionèmes sont de jolies pl. naines à fl. généralement roses; abondante floraison; soleil.

Agrimonia repens.
Agrostemma coronaria (coquelourde), 10 gr. 1 fr.

Ajuga pyramidalis.
 » genevensis.

Akebia quinata, pl. grimpante.

Alchemilla alpina.

- » fissa.
 » Helvetica.
 » incisa.
 » Lapeyrousei.
 » splendens.
 » vulgaris.

Alfredia cernua.

- » nivea.
 » stenolepis.

Alhagi Camelorum.

Alkana orientalis (Bourrache jaune), 10 gr. 2 fr.

Allium neapolitanum.

- » odorum.
 » pedemontanum.
 » Schuberti.
 » Ursinum.
 » Victoriale (Herbe à 9 chemises).

Alsine austriaca.

- » Banatica.
 » caucasica.
 » cerastioides.
 » gerardi.
 » hirsuta.
 » imbricata.
 » Jacquini.

Alsine juniperifolia.

- » *laricifolia.*
- » *liniflora.*
- » *pinifolia.*
- » *recurva.*
- » *Rosani.*
- » *setacea.*
- » *stricta.*
- » *tenuifolia.*
- » *verna.*
- » *villarsii.*

Althæa rosea (Rose trémière).

- » *fimbriata alba.*
- » à fl. simples, de toutes couleurs, 10 gr. 1 fr.
- » à fl. pleines, dans les plus belles variétés, 10 gr. 2 fr.
- » à fl. roses doubles, 10 gr. 2 fr.
- » à fl. jannes doubles, »
- » à fl. noires, doubles, »
- » *Theresina.*

Les Passeroses sont des pl. vivaces d'ornement de premier ordre et de cult. facile.

Alyssum alpestre.

- » *amanum.*
- » *arenarium.*
- » *argenteum*, 10 gr. 1 fr. Bon à semer dans les grands rochers et les pentes sèches.
- » *calyocarpum.*
- » *condensatum.*
- » *creticum.*
- » *cypriense.*
- » *gemonense.*
- » *halimifolium.*
- » *hirsutum* (récolté en Orient).
- » *idaeum.*
- » *leucadeum.*
- » *lucidum.*
- » *Mœllendorffianum.*
- » *montanum.*
- » *obovatum.*
- » *orientale.*
- » *ovirens.*
- » *petraeum.*
- » *pyrenaicum*. 1 gr. 2 fr.
- » *rostratum.*
- » *saxatile*, 10 gr. 2 fr.
- » » *var. citrinum.*
- » » *var. compactum.*
- » *scardicum.*
- » *serpyllifolium*, 5 gr. 4 fr.
- » *spinosum speciosum*, 5 gr. 4 fr.
- » *stribnyi.*
- » *tortuosum.*
- » *transylvanicum.*
- » *Wiersbickii*, 10 gr. 1 fr.

Alyssum Wulfenianum.**Amelanchier canadensis.**

- » *rotundifolia.*
- » *utahensis.*
- » *vulgaris* (*arbre aux Edelweiss*).

Amphirapis albescens.**Amygdalus nana.****Amsonia latifolia**, 10 gr. 2 fr.

- » *salicifolia*, 10 gr. 2 fr.

Très jolies pl. de la famille des Pervenches.

Anagallis grandiflora (mouron à grands fleurs) 5 gr. 1 fr.**Anchusa Barrelieri.**

- » *Dropmoreana*, 10 gr. 4 fr.
- » *italica*, 10 gr. 2 fr.
- » » *var. Opale.*
- » » *var. Lissadell.*
- » » *var. Perry.*

Bonnes Bourraches vivace de grandes dimensions, aux innombrables fl. d'un bleu intense (Mai-octobre).

- » *officinalis.*

- » *sempervirens.*

Andrachne colchica.**Androsace albana.**

- » *arachnoidea.*
- » *Brigantiaca.*
- » *carnea*, 1 gr. 1 fr.
- » *chamaejasme.*
- » *Charpentieri.*
- » *Chumbyi.*
- » *ciliata.*
- » *cylindrica.*
- » *elongata.*
- » *foliosa.*
- » *glacialis*, 1 gr. 1 fr. 50.
- » *Halleri.*
- » *Hedreantha*, 5 gr. 5 fr.
- » *Helvetica*, 1 gr. 1 fr. 50
- » *hirtella.*
- » *imbricata (argentea)*, 1 g. 1 f. 50
- » *lactea.*
- » *Laggeri.*
- » *lanuginosa.*
- » *Mathildæ.*
- » *multiceps.*
- » *obtusifolia.*
- » *occidentalis.*
- » *oculata.*
- » *Pacheri.*
- » *primuloides.*
- » *pubescens.*
- » *pyrenaica.*
- » *sarmentosa.*
- » *sempervivoides.*
- » *septentrionalis.*

Androsace villosa.
 » *vitaliana*, 1 gr. 1 fr.
 » *Wulfeniana*.
Anemone alba.
 » *alpina*, 10 g. 2 fr., 100 g. 10 fr.
 C'est la grande et belle anémone à fl. blanches des régions alpines. On l'élève facilement de graines, mais celles-ci germent lentement.
 » *apennina*.
 » *Baikalensis*.
 » *Baldensis*, 10 gr. 4 fr. ; 5 gr. 2 francs
 » *canadensis*.
 » *cernua*.
 » *decapetala*.
 » *dichotoma*.
 » *globosa*.
 » *Halleri*.
 » *Hepatica* (Hépatique), 10 g. 4 f.
 » *japonica*.
 » *lactea*.
 » *Lyalli* (ex Canada).
 » *montana*, 10 gr. 2 fr.
 » *multifida*.
 » *narcissiflora*, 10 gr. 2 fr.
 L'une des plus faciles à cultiver, mais à germination lente ; fl. roses en jolis bouquets dressés.
 » *narcissiflora* var. *villosa*.
 » *nigricans*.
 » *patens*.
 » *lutea*.
 » *pennsylvanica*.
 » *polyantha*.
 » *pratensis*.
 » var. *obsoleta*.
 » *propéra*.
 » *pulsatilla*, 10 gr. 2 fr.
 » var. *alba*.
 » *Regeliana*.
 » *riparia*.
 » *rivularis*.
 » *rubra*, 10 gr. 2 fr.
 » *sulfurea*, la belle anémone souffrée des Alpes, 100 gr. 10 fr. ; 10 gr. 2 fr.
 » *sylvestris*, 10 gr. 4 fr.
 Grande fl. blanche à revers rose ; pl. envahissante et de culture facile.
 » *sylvestris major*.
 » *trifoliata*.
 » *Udensis*.
 » *vernalis* (à fl. de soie et d'opale), 100 g. 15 f. ; 10 g. 3 f.

Anémone virginica.
 » *vitifolia*.
Anemonopsis macrophylla.
Angelica Archangelica (*Angélique*).
 » *pyrenaica*.
Antennaria alpina.
 » *carpathica*.
 » *dioica*.
 » *monocephala*.
 » *plantaginea*.
 » *tripplinervis*.
Anthemis aetnensis.
 » *carpathica*.
 » *cinerea*.
 » *Hausknechtii*.
 » *macedonica*.
 » *montana*.
 » *nobilis* (camomille romaine).
 » *petraea*.
 » *rigescens*.
 » *tenuifolia*.
 » *tinctoria*.
Anthericum ramosum. Petit lys blanc des rochers, très florifère.
Anthyllis montana, 10 gr. 4 fr.
 » *vulneraria*.
Antirrhinum asarina, 10 gr. 5 fr.
 Excellent pour les murs et rochers au soleil.
 » *gibraltaricum*.
 » *glutinosum*.
 » *majus*, type sauvage.
 » *(Mufflier)*, 10 gr. 1 fr.
 » *albus*, 10 gr. 1 fr.
 » *atrosanguineum*, 10 gr. 2 fr.
 » *coralinum*, 10 gr. 2 fr.
 » *Lightrose*, 10 gr. 2 fr.
 » *sempervirens*.
 » *siculum*.
 » *tortuosum* (récolté dans les ruines romaines de Fréjus).
Aphyllanthes monspeliensis.
Aplopappus croceus.
 » *Parryi*.
Apocynum venetum.
Aponogeton dystachion (aquatique).
Aposeris foetida.
Aquilegia alba.
 » *grandiflora*.
 » *alpina*, 10 gr. 8 fr. ; 1 gr. 1 fr.
 C'est la plus belle des Anco-lies ; très grande fleur d'un azur intense. Récoltée dans les Alpes.
 » *arctica*.
 » *atrata*, 10 gr. 1 fr.
 » *baikalensis*.

Aquilegia bertoloni.

- » *burgeriana*.
- » *californica*.
- » *calif. hybrida*.
- » *canadensis*.
- » *caucasica*.
- » *chrysantha*, 10 gr. 2 fr.
- » » *grandiflora*.
- » » *nana*.
- » *cœrulea* (Floraire), 10 gr. 6 fr.
- » *cœrulea* (récoltée dans les Montagnes Rocheuses), 10 g. 8 fr.
- » *cœrulea alba*.
- » *cœrulea candidissima*.

L'Aq. *cœrulea* et ses var. est l'une des plus merveilleuses d'entre les plantes de montagne.

- » *Durandi*.
- » *Einseleana*.
- » *flabellata*. Blanc pur.
- » *formosa*. (ex Canada).
- » *glandulosa* (type), 1 gr. 1 fr.
- » » *var. rosea*.
- » *Haylodgensis*, 10 gr. 4 fr.
- » » *delicatissima*,
10 gr. 6 fr.
- » *Helenæ*.
- » *hybrida*, extra de Barr.
- » » *superba*, de Dod.
- » » *Floraire*.
- » *Jetschani*.
- » *jucunda*.
- » *lactiflora*.
- » *longicalcarata*.
- » *Olympica* (d'Orient).
- » *Othonis*.
- » *oxypetala* 1 gr. 1 fr.
- » *pyrenaica*, 1 gr. 1 fr.
- » *sibirica*.
- » *skinneri*. Fl. rouge et jaune.
- » *stenopetala*.
- » *thalict trifolia*.
- » *truncata*. Fl. rouge et jaune
brillante.
- » *viridiflora* (vraie).
- » *vulgaris*.

Les ancolies sont d'excellentes pl. d'ornement, de culture, très facile, s'accommodant également de l'ombre et du soleil, mais préférant la mi-ombre et la fraîcheur. Leurs graines germent de suite.

Arabis albida.

- » *alpina*.
- » *arenosa*.
- » *aubrietoides*.

Arabis bellidifolia.

- » *Berninæ*.
- » *bryoides* (ex Mont Athos).
- » *caucasica*.
- » *cebennensis*.
- » *cenisia*.
- » *cœrulea*.
- » *Collinsii*.
- » *Drummondi*.
- » *Halleri*.
- » *hirsuta*.
- » *Holbœlli*.
- » *hybrida*.
- » *incanescens*.
- » *japonica*.
- » *lucida*.
- » *nordmanniana*.
- » *ovirensis*.
- » *pendula*.
- » *petraea*.
- » *petrogena*.
- » *procurrens*.
- » *pumila*.
- » *purpurascens*.
- » *rosea*.
- » *Soyeri*.
- » *stelleri*.
- » *suecica*.

Arctium tomentosum.**Arctostaphylos alpina.**

- » *navadensis*.
- » *tomentosa*.
- » *Uva Ursi* (*Raisin d'Ours*).

Arctotis grandis.**Arenaria Armeriastrum.**

- » *Balearica*.
- » *biflora*.
- » *cæspitosa*.
- » *capitata*.
- » *cephalotes*.
- » *ciliata*.
- » *dianthifolia*.
- » *gracilis*, 1 gr. 1 fr.
- » *graminifolia*, 5 gr. 2 fr.
- » *grandiflora*, 5 gr. 2 fr.
- » *gypsophiloides*.
- » *hispida*.
- » *Kingii*.
- » *Koriniana*.
- » *Kotschyana*, 5 gr. 4 fr.
- » *lanceolata*.
- » *laricifolia*.
- » *longifolia*.
- » *montana*.
- » *nardiflora*.
- » *peplodes*.
- » *purpurascens*.
- » *Sajanensis*.

Arenaria Saxifraga.

- » sericea.
- » Steveni.
- » tridentina.
- » verna.

Argemone hispida.

- » mexicana.
- » platyceras.

Pavots épineux d'Amérique.

Arisarum vulgare.**Arsitochia ornithocephala.**

- » rotunda.

Armeria alpina.

- » arborea.
- » cæspitosa.
- » Halleri.
- » majellensis.
- » maritima.
- » plantaginea.
- » sibirica (ex Groënland).
- » vulgaris.

Pl. solides et florifères connues sous le nom de gazon d'Espagne ou d'Olympe.

Arnebia echinoides.**Arnica amplexicaulis.**

- » chamissonis.
- » cordifolia.
- » latifolia.
- » longifolia.
- » montana, 10 g. 3 fr.; 5 g. 2 fr.

Aronicum glaciale.

- » scorpioides, 1 gr. 1 fr.

Artemisia absinthium.

- » annua.
- » arborea.
- » argentea.
- » atrata.
- » austriaca.
- » canadense (ex Canada).
- » cœrulescens.
- » cretacea.
- » discolor.
- » frigida.
- » glacialis.

Le Genépi des Piémontais.

- » glauca.
- » granatensis.
- » lanata.
- » maritima.
- » mutellina (*genépi alp.*) 5 gr. 4 fr.
- » nana.
- » paniculata.
- » parviflora.
- » pedemontana.
- » rupestris.
- » sacrorum.
- » scoparia.

Artemisia spicata (le vrai genépi),

- 1 gr. 1 fr.
- » stelleriana.
- » suavis.
- » turkestanica.
- » valesiaca.

Jolies composées alpines aromatiques au feuill. finement divisé et généralement blanc d'argent. Soleil.

Arthropodium cirrhatum.**Arum Dracunculus.**

- » italicum.

Asarum canadense.

- » caudatum.
- » europæum.

Asclepias Cornuti (pl. aux oiseaux).

- » curassavica.
- » Hallii.
- » incarnata.
- » rubra.
- » speciosa.
- » tuberosa, 10 gr. 3 fr.

L'une des plus brillantes pl. vivaces; fl. orangé très vif.

Asparagus acutifolius.

- » tenuifolius.
- » verticillatus.

Asperula azurea, 10 gr. 2 fr.

- » cynanchica.
- » galioides.
- » hirta.
- » humi usa.
- » longiflora.
- » odorata (*Waldmeister*).
- » orientalis.
- » taurina.

Asphodelus albus (*Asphodèle*), 10 g. 1 f.

- » fistulosus.

Asphodeline Balansæ.

- » cretica, 10 gr. 1 fr.
- » gigantea.
- » lutea, 10 gr. 1 fr.

Aster alpinus, 5 gr. 2 fr.

- » » à fl. blanches, 5 gr. 2 fr.
- » » lapponicus.
- » » speciosus, 5 gr. 5 fr.
- » amelloides, 5 gr. 2 fr.
- » Amellus, 5 gr. 2 fr.
- » bessarabicus.
- » conspicuus (ex Canada).
- » curtisii (ex America).
- » diplostephoides, 5 gr. 4 fr.

Superbe espèce basse de l'Himalaya.

- » Fremonti.
- » Garibaldii.
- » himalaicus.

Arter Ibericus.

- » » *grandiflorus.*
- » *Patersonni.*
- » *lævis.*
- » *Porteri* (ex Colorado) 10 g. 2 fr.
- » *Parmicoides.*
- » *Pseudo-Amellus.*
- » *pumilus.*
- » *pyreneus* (vrai).
- » *sericeus* (ex Colorado).
- » *sibiricus.*
- » *sikkimensis*
- » *simplex.*
- » *Townsendi.*
- » *trinervius.*
- » *turbineus.*

Astilbe Davidi, 10 gr. 4 fr. : 5 gr. 2 fr.

- Délicate panicule de fl. roses,
- dressée en gros épis; pour lieux
- humides.
- » *Japonica.*
- » *rivularis.*

Astragalus alopecuroides (vrai), 10 gr. 4 fr.

- » *alpinus.* 10 gr. 4 fr.
- » *angustifolius* (ex Oriens).
- » *aristatus*, 10 gr. 4 fr.
- » *cicer.*
- » *confirmans.*
- » *depressus.*
- » *galegiformis.*
- » *glycyphylloides.*
- » *juvenalis.*
- » *massiliensis.*
- » *maximus.*
- » *melilotoides.*
- » *monspessulanus*, 10 gr. 4 fr.
- » *Onobrychis.*
- » *pseudo-Onobrychis,*
- » *racemosus.*
- » *reflexistipulus.*
- » *sanguinolentus.*
- » *Sieversianus.*
- » *Transoxanus.*
- » *uliginosus.*

Astrantia bavarica.

- » *Biebersteinii.*
- » *carinthiaca.*
- » *carniolica.*
- » *gracilis.*
- » *helleborifolia.*
- » *major*, 10 gr. 2 fr.

Plante très montagnarde et
des plus facile à cultiver; l'une
des meilleures pl. mellifères.

- » *major à fl. roses.*
- » *minor.*
- » *neglecta.*

Astrantia pauciflora.

- Astrocarpus sesamoides.*
- Astydamia canariensis.*
- Athamante cretensis.*
- » *Matthioli.*

Atragene alpina, 10 gr. 4 fr.

- » » à fl. blanc pur.
- » » à fl. rouges.

Atriplex hortensis.

- » *rosea.*

Atropa Belladonna (Belladone).

- » » à fruits jaunes.

Aubrietia antilibani.

- » *cilicica.*
- » *Columnæ.*
- » *deltoidea*, 10 g. 5 fr.; 5 g. 3 fr.
- » *D. Mules.*
- » *Eyrii.*
- » *erubescens* (ex mont Athos)
- » *græca.*
- » *Hendersonni.*
- » *Leichtlini.*
- » *libanstica.*
- » *Lilac Queen.*
- » "Lloyd Edward"
- » *Mauve Queen.*
- » *Moehreimi.*
- » *Olympica.*
- » *Pinardi.*
- » *purpurea.*
- » *Richardsoni.*
- » *violacea.*

Petites Crucifères vivaces for-
mant des tapis couverts de fl
d'un lilas plus ou moins vi-
sivant les espèces. Excellente
pour les murailles.

Avena argentea.

- » *elatior.*
- » *flavescens.*

Azalea mollis (var. anglaises).

- » *procumbens.*

Ballota spinosa.**Banffia petræa.****Baptisia australis, 10 gr. 1 fr.**

- » *exaltata.*
- » *minor.*

Gros Lupins vivaces à fl
bleues.

Bartsia alpina.**Bellidiastrum Michelli.****Bellis cœrulescens.**

- » *integrifolia.*
- » *perennis.*
- » *sylvestris.*

Bellium belliodes.

- » *crassifolium.*
- » *minutum.*

Berardia subacaulis. Pl. très curieuse et très rare, récoltée dans la station classique du Haut Queyras, 5 gr. 3 fr.

Berberis stenophylla.

» *Wilsoni*: le plus beau du genre, nouvellement introduit de l'Asie centrale.

» *Yunnanense*.

Berkheya purpurea.

» *Adlami*.

Berteroa incana.

Beta trigyna.

Betonica alopecuros.

» *grandiflora*, 5 gr. 2 fr.

» *grandiflora superba*, 5 g. 2 f. 50.

» *hirsuta*, 5 gr. 1 fr.

» *macrostachya*.

» *officinalis*, 5 gr. 1 fr.

» » *alba*

» *orientalis*.

» *scardica*.

» *stricta*.

Betula nana.

Biebersteinia orphanidis.

Bigelowia graveolens.

Biscutella lævigata.

» *lucida*.

Blitum capitatum.

» *virgatum* (Epinard-fraise), 10 gr. 2 fr.

Plantes très curieuses, portant comme des fraises d'un vermillon très vif, à l'aisselle des feuilles.

Bocconia cordata.

» *microcarpa*.

Borago laxiflora.

Boykinia aconitifolia.

» *elata*.

» *occidentale*

» *rotundifolia*.

Brassica repanda.

» *Richeri*.

Braya alpina.

» *pinnatifida*.

» *supina*.

Brickelia grandiflora.

Briza media.

» *lutescens*.

Bromus squarrosus.

» *tectorus*.

Budleya albiflora.

» *nivea*.

Budleya variabilis, 10 gr. 2 fr.

Arbuste à croissance rapide, à floraison abondante (fleurs en grappes violet et or) et

qu'on élève facilement de graines.

Bulbocodium vernum.

Buphtalmum grandiflorum, 5 gr. 2 fr.

» *salicifolium*.

» *speciosissimum* (très rare).

Bupleurum falcatum.

» *fruticosum*.

» *longifolium*.

» *ranunculoides*.

» *stellatum*.

Caesalpinia Giliesii.

» *japonica*.

Caccinia glauca, 5 gr. 1 fr.

Calamintha acynos.

» *alpina*.

» *grandiflora*.

» *Vuachensis*.

Calandrinia compressa.

» *discolor*.

» *grandiflora*.

» *sedicea*.

» *speciosa*.

» *umbellata*.

Calendula grandiflora.

» *sulfurea*.

» à fl. pleines (soucis), 5 gr. 1 fr.

Calceolaria pinnata.

» *polyrhiza*.

Calla palustris (aquatique).

Calliopsis (*Coreopsis*) *versicolor*.

Callirhoe pedata.

» *verticillata*.

Caltha alpina.

» *leptosepala*.

» *palustris*.

» *polysepala*.

» *radicans*.

Calypso borealis (ex Canada).

Calystegia dahurica.

Camassia esculenta.

Camomille (*v. Anthemis nobilis*).

Campanula abietina.

» *acutangulare*.

» *aggregata*.

» *alaskana* (ex Canada).

» *alliarifolia*, 10 gr. 2 fr.

» *Allionii*, 10 g. 8 fr.; 5 g. 5 fr.

» *alpina*.

» *barbata*, 10 g. 5 fr.; 5 g. 3 fr.

» » à fl. blanches.

» *Baumgartenii*.

» *betonicæfolia*.

» *bononiensis*.

» *Burgalti*.

» *cæspitosa*, 5 gr. 4 fr.

» *cantburyana*, 5 gr. 3 fr.

» *capitata*.

Campanula carnica.

- » *carpathica*, 10 gr. 1 fr.
- » » à fl. blanches 10 g. 1 f.
- » » à fl. lilas clair, 10 g. 2 f.
- » » *var. compacta*, 10 g. 2 f.
- » » *var. Ditton's blue*.
- » » *var. grandiflora*, 10 g. 4 f.
- » » *var. pelviformis*.
- » » *Riverslea*.

Le *C. carpathica* et ses variétés (faciles à élever de semis) sont d'excellentes pl. de rochers, de platebandes et de bordures; fleurissent de mai jusqu'en automne; grandes fl. violettes ou blanches; pl. basses et formant tapis.

- » *carpathica* × *pulla*.
- » *caucasica*.
- » *cenisia*.
- » *collina*.
- » *Correvoniana*.
- » *crispa*.
- » *cristallocalyx*, 5 gr. 2 fr.
- » *dahurica*.
- » *elatinoides*.
- » *eriocalix*.
- » *eriocarpa*.
- » *excisa*.
- » *Fergusonii*.
- » *flexuosa*.
- » *fragilis*.
- » *garganica*.
- » *glomerata*.
- » » *var. à fl. blanches*.
- » » *var. acaulis*.
- » *grandis*.
- » » à fl. blanches.
- » *Grossekii*.
- » *Hohenackeri*.
- » *Imeritina*, 5 gr. 2 fr.
- » *incurva*.
- » *Kolenatiana*, 5 gr. 2 fr.
- » *lactiflora*, 5 gr. 3 fr.
- » *lamiifolia* 5 gr. 2 fr.
- » *latifolia*, 5 gr. 2 fr.
- » » à fl. blanches.
- » » *alba grandiflora*.
- » *libanotica*.
- » *lingulata*.
- » *longistyla*.
- » *macrantha*, 10 gr. 2 fr.
- » » à fl. blanches.
- » *macrostachia*.
- » *macrorrhiza*.
- » *medium*, type des Hautes-Alp.
- » *michauxioides*.
- » *médium*, des jardins.

Campanula mirabilis.

- » *multiflora*.
 - » *muralis* (*Portenschlagiana*).
 - » *nobili-macrantha*.
 - » *pelviformis*.
 - » *persicifolia*, 5 gr. 2 fr.
 - » » à fl. blanches.
 - » *petiolata*.
 - » *petræa*.
 - » *phytidocalix*.
 - » *primulæfolia*.
 - » *pulla*.
 - » *pulloides*.
 - » *punctata*.
 - » » *var. à fl. blanches*.
 - » *pusilla*, 5 gr. 3 fr.
 - » » *var. à fl. blanches*.
 - » » *var. Willmottiana*.
 - » *pyramidalis*, 10 gr. 4 fr.
 - » » à fl. bl., 5 g. f. 2.50.
 - » *Raddeana*.
 - » *Raineri* (ex *Alpi Bergamensis*) 1 gr. 1 fr.
 - » *rapunculus*.
 - » *rapunculoides*.
 - » *rhomboidalis*.
 - » » à fl. blanches.
 - » *rotundifolia*, 10 gr. 2 fr.
 - » » à fl. blanches.
 - » » *ruthenica*.
 - » *Sarmatica*, 10 gr. 2 fr.
- Très belle espèce voisine de *barbata*, facile à cultiver et très florifère.
- » *Saxifraga*, 1 gr. 1 fr.
 - » *Scheuchzeri*.
 - » » à fl. blanches.
 - » *Scouleri*.
 - » *sibirica*.
 - » *speciosa*, 1 gr. 1 fr.
 - » *spicata*, 5 gr. 3 fr.
 - » *spicato* × *thyrsoidea*.
 - » *stenocodon*.
 - » *Steveni*.
 - » *subpyrenaica*, 5 gr. 2 fr.
 - » *Tenorii*.
 - » *thyrsoidæa*, 5 gr. 3 fr.
- Belle espèce montagnarde
- » *fl. jaunes*.
 - » *tomentosa*.
 - » *Tommasiniana*.
 - » *Trachelium*, 5 gr. 2 fr.
 - » » à fl. bl., 5 gr. 2 fr.
 - » » à fl. doubl., 5 g. 2 fr.
 - » *turbinata*, 5 gr. 2 fr.
 - » » à fl. blanch., 5 g. 2 f.
 - » *tyroliensis*.
 - » *uniflora* (ex *Laponia*)

Campanula urticifolia, 5 gr. 2 fr.

- » *Valdensis*.
- » *Vanneri*, 1 gr. 1 fr.
- » *velutina*.
- » *Venzloi*.
- » *versicolor*.
- » *Vidali*.
- » *Waldsteiniana*.
- » *Wilsoni*.
- » *Zoyzii*.

Les Camp. sont faciles à élever par semis. Les espèces les plus faciles, les plus florifères et les plus jolies sont : *Alliariaefolia*, *carpathica*, *eryocarpa*, *lactiflora*, *persicifolia*, *pusilla*, *sarmatica* et *turbinata*. Les *alliarifolia* et *nobilis* sont à fl. blanches, *thyrsoidæa* à fl. jaunes et les autres à fl. lilas plus ou moins foncé, sauf leurs var. à fl. blanches. Toutes fleurissent dans l'été, à partir de la fin de mai, et sont excellentes pour les rocailles ou la platebande.

Campanula campanula.

Campanula rupestris (Câprier).

Campanula pauciflora (rare).

Campanula Altagana.

Campanula alpina.

- » *asarifolia*.
- » *chenopodifolia*.
- » *glauca*.
- » *Jezoensis*.
- » *macrophylla*.
- » *resedifolia*.
- » *sibirica*.

Campanula acanthoides.

- » *aurisocus*.
- » *deffloratus*.
- » *eriocephalus*.
- » *nutans*.

Campanula atrata.

- » *Baldensis*.
- » *bicolor*.
- » *Buchanani* (à verdure brune).
- » *flava*.
- » *Grayi*.
- » *nigra*.

Campanula acanthifolia, 10 gr. 3 fr. ; 5 gr. 2 fr.

- » *acaulis*, 10 gr. 3 fr. ; 5 gr. 2 fr.
- Ce sont les superbes chardons d'argent qui, l'automne, animent les pentes de nos monts, où ils forment des touffes naines d'une grande beauté.
- » *vulgaris*.

Castilleja angustifolia.

- » *lutea*.

Catananche coerulea.

Cathcartia villosa.

Cedronella triphylla.

Celmisia coriacea (ex Nov. Zeland).

Celsia acaulis.

- » *betonicaefolia*, 10 gr. 1 fr.
- » *Coromandelica*.
- » *orientalis*.

Centaurea alpina.

- » *axillaris*.
- » *Babylonica*.
- » *cyanus variabilis* (bleuet en mélange), 5 gr. 1 fr.
- » *dealbata*.
- » *deusta*.
- » *lutea*.
- » *macrocephala*.
- » *monantha*.
- » *montana*.
- » » (à fl. blanches).
- » *nervosa*.
- » *orientalis* (à fl. jaunes).
- » *præalta*.
- » *Ruthenica* à fl. jaune citron.
- » *uniflora*.

Centranthus angustifolius, 10 gr. 2 fr. ; 5 gr. 1 fr.

Excellente pour garnir les éboulis pierreux.

- » *longiflorus*.
- » *ruber* (Valér. rouge des murs)
10 gr. 2 fr. ; 5 gr. 1 fr.
- » » à fl. blanches, 10 gr.
2 fr. ; 5 gr. 1 fr.
- » » *atrorubens* (rouge sang),
10 gr. 2 fr. ; 5 gr. 1 fr.

Les *Centranthus* ou Valériane des murs sont recommandables comme pl. de haute décoration pour la garniture de platebandes, des grands rochers, des murailles surtout. Elles fleurissent abondamment de juin jusqu'en hiver et font un tableau merveilleux dans un paysage.

Cephalaria alpina, 10 gr. 2 fr.

- » *leucantha*.
- » *uralensis*.

Grandes scabieuses jaunes aux formes architecturales.

Cerastium album.

- » *alpinum*.
- » *argenteum*.
- » *Biebersteini*.
- » *carinthiacum*.

Cerastium chloræfolium.

- » columnæ.
- » fontanum.
- » glaciale.
- » glandulosum.
- » grandiflorum.
- » illyricum.
- » lanatum.
- » Lerchenfeldianum.
- » lineare.
- » tomentosum (ex Græcia).
- » uniflorum.
- » uralensis.
- » villosum.
- » vulgatum.

Cé sont de petites pl. traînantes aux innombrables fl. blanches formant de solides gazons.

Cerinth alpinæ.

- » minor.

*Chamæmelon caucasicum.**Chamæpeuce casabone.*

- » diacantha.

Chamænerium latifolium (ex Groënlandia).*Chænostoma polyantha.*

- » fastigiata.

Cheiranthus Allionii, sorte de giroflée odorante aux fleurs du plus bel orangé, se succédant de Juin à fin Novembre; pl. de grand effet; 10 gr. 2 fr.; 5 gr. 1 fr.

- » Allionii grandiflorus.

» *Cheiri.* (*Giroflée des murs*).

- » var. des jardins, Giroflée jaune ou Violier des murs. Les var. suivantes : Aurora, grandiflora, jaune double, parisienne hâtive, Tom Pouce en mélange, Vulcain et White Gem, à 50 cent. le paquet, 1 fr. le gr.

- » Kewensis.

- » mutabilis.

- » nanus.

Chelidonium Franchetianum.

- » laciniatum.
- » lasiocarpum.

Chelone barbata, 10 gr. 2 fr. 5 gr. 1 fr.

- » hybrida, 5 gr. 2 fr.

- » coloradensis.

- » glabra.

Chenopodium Bonus Henricus (Epineard des Alpes) 10 gr. 2 fr.*Cherleria sedoides.**Chicorium Intybus.*

- » — à fl. blanches.

*Chionodoxa Boissieri.**Chrysanthemum alpinum.*

- » arcticum.
- » cappadocium.
- » carinatum, Chrysanth. annue en mélange.
- » caucasicum.
- » ceratophylloides.
- » cinerariæfolium.
- » coronopifolium.
- » lacustre.
- » macrophyllum.
- » maximum.

*Chrysanthemum uliginosum.**Chrysopsis foliosa.*

- » villosa.

Chrysosplenium flagelliforme.

- » oppositifolium.

Cimicifuga foetida.

- » cordifolia.
- » racemosa.

Cineraria aurantiaca.

- » campestris.
- » maritima.
- » suaveolens.

Cirsium Eriophorum.

- » Erysithales.
- » ferox.
- » heretophyllum.
- » lanceolatum.
- » monspessulanus.
- » oleraceum.
- » spinosissimum.

Cistus albidus.

- » corsicus.
- » creticus.
- » crispus.
- » cyprius.
- » incanus.
- » ladaniferus.
- » ladaniferus × villosus.
- » laurifolius.
- » monspeliensis.
- » purpureus.
- » salviæfolius.
- » villosus.

Clarkia elegans, fl. pl. en mélange (annuelle), 5 gr. 1 fr.*Claytonia asarifolia.*

- » parviflora.
- » perfoliata.
- » sibirica.
- » virginiana.

Clematis Buchananii.

- » Douglasi (ex America).
- » graveolens (fl. jaunes).

Clematis flammula (liane de neige).

- » *Fremonti.*
- » *integrifolia.*
- » *ligusticifolia.*
- » *montana.*
- » » *var. rosea.*
- » *recta.*
- » *recta purpurescens.*
- » *stans.*
- » *Tangutica.*
- » *tubulosa.*
- » *verticillaris.*
- » *virginiana.*
- » *vitalba.*
- » *viticella.*

Clintonia borealis.

- » *uniflora* (ex America).

Cneorum tricoccum.

Cochlearia danica.

Codonopsis lanceolata.

- » *ovata.*

Colletia chilensis.

- » *sylvestris.*
- » *Tanghu.*
- » *viridiflora.*

Collomia grandiflora.

Collusia geoides.

Coluteocarpus reticulatus.

Comarum palustre.

Convallaria majalis (*Muguet*).

Convolvulus altheoides.

- » *aureus superbus.*
- » *cantabricus.*
- » *mauritanicus.*
- » *tricolor* (annuel), (Belle de jour), 10 gr. 1 fr.

Doreopsis grandiflora, 10 gr. 2 fr.

- » *lanceolata.*
- » *palmata.*
- » *tripteris.*

Coris monspeliensis.

Cornus canadensis.

- » *florida.*
- » *suecica* (Norvège).

Coronilla cappadocica, 10 gr. 4 fr.

- » *coronata.*
- » *emeroides.*
- » *Emerus.*

» *montana*, 10 g. 2 fr., 5 g. 1 fr.

» *varia*, 10 gr. 2 fr., 5 gr. 1 fr.

Corrigiola telephiifolia.

Cortusa hirsuta.

- » *Matthioli.*
- » » *grandiflora.*
- » *pubens.*
- » *villosa.*

Corydalis australis.

- » *bulbosa* (cava), 10 gr. 3 fr.

Corydalis cheilanthifolia.

- » *glauca.*
- » *Halleri.*
- » *lutea.*
- » *nobilis.*
- » *ochroleuca.*
- » *ophiocarpa.*
- » *rupestris.*
- » *solida.*
- » *thalictrifolia.*
- » *tomentella.*
- » *tuberosa* (excellente pl. d'ombre), 10 gr. 3 fr.
- » *vaginans.*

Cosmos sulfureus.

Cotoneaster adpressa (espèce naine et de rocaille).

- » *applanata.*
- » *congesta.*
- » *Davidiana* (*horizontalis*), 10 gr. 1 fr.
- » *depressa*, très nain et rampant.
- » *Franchetti.*
- » *frigida.*
- » *laxiflora.*
- » *microphylla* 10 gr. 1 fr.
- » *nummularia.*
- » *pannosa*, 10 gr. 1 fr.
- » *sinensis.*
- » *tomentosa*, 10 gr. 1 fr.
- » *vulgaris*, 10 gr. 1 fr. Excellents arbustes p rocailles.

Cotyledon (*Umbilicus*) *chrysanthus.*

- » *ciliolatus.*
- » *erectus.*
- » *oppositifolius.*
- » *platyphyllus.*
- » *Sempervivum* (*Sedum sempervivum*).
- » *spinosus.*
- » *umbilicus.*

Crambe cordifolia.

- » *grandiflora.*
- » *Kotschyana.*
- » *maritima.*
- » *orientalis.*
- » *tatarica.*

Crepis aurea.

- » *blattarioides.*
- » *micrantha.*
- » *montana.*
- » *pygmæa.*
- » *rubra.*
- » *sibirica.*
- » *Terglouensis.*

Crocus vernus.

Crucianella stylosa (fl. roses très abondantes).

Crucianella stylosa à fl. carmin.

Crythmum maritimum.

Cuphæa lanceolata.

» *miniata*.

Cyananthus lobatus.

Cyclamen coum.

» » à fl. blanches.

» *hederæfolium*.

» » à fl. blanches.

» *ibericum*.

» *latifolium*.

» *libanoticum*.

» *repandum*.

Cynoglossum nervosum.

Cypella Herberti.

Cypripedium calceolus.

» *venticosum*.

Cytisus albus.

» *argenteus*.

» *austriacus*.

» *biflorus*.

» *capitatus*, 10 gr. 1 fr.

Excellent arbrisseau de 1 m.
à 1 m. et demi, qui se recouvre
de fleurs jaunes pendant une
bonne partie de l'année

» *filipes* (ex. Ins. Canar.).

» *Laburnum*, 10 gr. 1 fr.

» *nigricans*, 10 gr. 1 fr.

» *radiatus*, 10 gr. 1 fr.

(Délicieux petit arbuste bas
aux rameaux étalés, propre à
garnir les rocailles).

» *scoparius*.

» *sessilifolius*.

» *Shipkænsis*.

» *stenopetalus* (ex Ins. Canar.)

» *supinus*.

Daphne alpina.

» *altaica*.

» *caucasica*.

» *cneorum*.

» *Gnidium*.

» *Laureola*.

» *mezereum*, 10 gr. 1 fr.

» » à fl. blanches.

» *oleoides*.

» *Philippi*.

» *pontica*.

» *pseudo-mezereum*.

» *striata*.

Datisca cannabina.

Datura stramonium, 10 gr. 1 fr.

Delphinium Ajacis (annuel), var. mé-
lang., 10 gr. 2 fr.

» *azureum*.

» *Belladonna*.

» *Brunonianum*.

Delphinium californicum.

» *cachemirianum*.

» » *atropurpureum*.

» » à fl. blanches.

» » var. mélangées.

» *cardinale*.

» *caucasicum*.

» *chinense*. Esp. superbe à fl.
d'un bleu très pur; 10 gr.
4 fr.

» *conspicuum*.

» *elatum* (type).

» *formosum*, 10 gr. 3 fr.

» » *coelestinum*.

» *Geyeri*.

» *grandiflorum*, 10 gr. 2 fr., 5 gr.
1 fr.

» *grandiflorum* var. *album*.

» » var. *azureum*.

» » var. *compactum*.

» » var. *roseum*.

» » var. *Tom Thumb*.

» *hybridum*, mélange des meil-
leures variétés, 10 gr. 2 fr.,
5 gr. 1 fr.

Delphinium hybridum, fl. pl.

» » *Diana*, fl. pl.

» » *Perfection*, fl. pl.

» » "Prince of Wales".

» *Lugdunum*.

» *nudicaule*.

» *occidentale*.

» *puniceum*.

» *Requienii*.

» *scapularium*.

» *sulfureum* (Zalil), à fl. jaunes.

» *superbissimum*.

» *Tatsuense*.

» *Thunbergi*.

» *tirolense*.

» *triste*.

» *trolliifolium*.

» *vestitum*.

Dentaria bulbifera.

Desmodium penduliflorum.

» *pinnata*.

Dianthus acaulis.

» *alpestris*.

» *alpinus*.

» *arenarius*.

» *aridus*.

» *armeria*.

» *arvernensis*.

» *asper*.

» *atrorubens*.

» *barbatus* (Oillet des poètes)

» » *albus*.

» » *atrococcineus*.

Dianthus barbatus, variétés en mélange.

10 gr. 3 fr.

» *bicolor*.

» *brevicaulis*.

» *cæsius*.

» *caesio* × *Plumarius*.

» *capitatus*, 10 gr. 3 fr., 5 gr. 2 fr.

» *carthusianorum*. Le joli petit œillet rose vif des pentes sèches, 10 gr. 3 fr., 5 gr. 2 fr.

» *caucasicus*.

» *chinensis*, var. en mélange, 10 gr. 2 fr.

» *chinensis laciniatus*, en mél., 10 gr. 2 fr.

» *controversus*.

» *corsicus*.

» *crinitus*.

» *cruentus*.

» *Cyri*.

» *deltoides*, 10 gr. 2 fr.

» *albus*.

» *superbus*, 10 gr. 3 fr.

Le *D. deltoides* est une esp. tapissante et naine. très florifère et solide, de cult. facile.

» *dentosus*.

» *diadematus*.

» *Falconeri*.

» *fimbriatus*.

» *fragrans*, 10 gr. 3 fr.

» *Freynii*.

» *frigidus*.

» *furcatus*.

» *gallicus*, tardif, à parfum suave.

» *giganteiformis*.

» *glacialis*.

» *glutinosus*.

» *graniticus*.

» *Holzeri*.

» *Hungaricus*.

» *integer*.

» *Kamtschaticus*.

» *Liburnicus*.

» *monspessulanus*, 1 gr. 1 fr.

» *montanus*, 10 gr. 3 fr., 5 gr. 2 fr.

» *neglectus*.

» *Orestis*.

» *pallens*.

» *pelviformis*.

» *petræus*.

» *pinifolius*.

» *Plumarius*, 10 gr. 1 fr.

L'une des meilleures pl. à bordure et aussi l'une de celles qui garnissent le mieux les rocs, les sommets des murs,

les pentes arides au soleil; flor. prolongée et abondante; fl. très odorantes.

Dianthus Plumarius variété *candidus*, 10 gr. 2 fr.

» *Plumarius* var. *bicolor*, idem.

» *Plumarius* var. *Cyclope*, 10 gr. 3 fr.

» *Plumarius* var. *floribundus*, 10 gr. 2 fr.

» *Plumarius* var. *grandiflorus*, id.

» » » *hortensis*, idem.

» » » *laciniatus*, id.

» » » *lilacinus*, idem.

» » » *maximus*, idem.

» » » *nanus*, idem.

» » » *robustus*, idem.

» » » *suaveolens*, id.

» » » *zonatus*, idem.

» » variété à fl. pleines, 10 gr. 5 fr.

Ces variétés d'œillets rampants sont excellentes pour former des bordures, garnir des talus secs et le sommet des murs.

» *polycladus*.

» *puberulus*.

» *pungens*.

» *pyridicola*.

» *Requini*.

» *Seguieri*.

» *speciosus*.

» *spinosus*.

» *squarrosus*.

» *Sternbergi*.

» *striatus*.

» *subacaulis*.

» *subfastigiatus*.

» *superbus*.

» » var. *albus*.

» » var. *nanus*.

» *sylvaticus*.

» *sylvestris*, 5 gr. 3 fr.

» *tener*.

» *vaginatus*.

» » *roseus*.

» *Velenowskyi*.

» *versicolor*.

» *virginicus*.

» *viscidus*.

» *wimmeri*.

Les œillets, surtout dans le groupe des *Plumarius*, sont excellents pour garnir les lieux arides et ensoleillés; ils se contentent de peu et donnent avec abondance de délicieuses fl.

odorantes; tous s'élèvent facilement de semis.

Dicentra formosa (ex Canada).

Dichondra repens.

Dictamnus albus.

» *Fraxinella*.

Digitalis ferruginea.

» *grandiflora*, 10 gr. 2 fr., 2 gr. 1 fr.

» *lutea*, 10 gr. 2 fr., 5 gr. 1 fr.

» *mædia*.

» *ochroleuca*.

» *orientalis*.

» *persiflora*.

» *purpurea*, 10 gr. 2 fr., 5 gr. 1 fr.

» » à fl. blanches.

Ce sont des pl. solides, à flor. prolongée; cult. très facile.

Dimorphotheca aurantiaca, 1 gr. 1 fr.

Dioscorea caucasia.

» *pyrenaica*.

Diospyros kaki (type ex Japon).

Diphylleia cymosa.

Dipsacus asper.

Dodecatheon integrifolium.

» *Mædia*.

» *pauciflorum*.

» *radicatum*.

Doronicum austriacum.

» *corsicum*.

» *excelsum*.

» *hirsutum*.

» *hybridum*.

» *Pardalianches*.

Dorycnium herbaceum.

» *ibericum*.

» *suffruticosum*.

Downingia pulchella (ex America).

Draba affinis.

» *aizoides*, 1 gr. 1 fr.

» » *v. grandiflora*.

» *alpina*.

» *altaica*.

» *arabisans*.

» *armata*.

» *athoa*.

» *aurea*.

» » *grandiflora*.

» *australis*.

» *borealis*.

» *bronchialis*.

» *brunifolia*.

» *cadmea*.

» *cappadocica*.

» *carinthiaca*.

» *chamæjasme*.

» *contorta*.

» *corsica*.

Draba cuspidata.

» *dichranoides*.

» *Fladnizensis*.

» *frigida*.

» *glacialis*.

» *Haynaldi*.

» *hispanica*.

» *incana*.

» *Johannis*.

» *Kotschyi*.

» *lactea*.

» *lasiocarpa*, 1 gr. 1 fr.

» *laxa*.

» *Lereschei*.

» *longirostra*.

» *nivalis*.

» *olympica*.

» *pycnosperma*.

» *pyrenaica* (*Petrocalis*), 1 gr. 1 fr. 50.

» *repens*, 1 gr. 1 fr.

» *rigida*.

» *rupestris*.

» *Sauteri*.

» *Scandinavica*.

» *stellata*.

» *streptocarpa*.

» *subamplexicaulis*.

» *Thomasii*.

» *tomentosa*.

» *Traunsteineri*.

» *tridentata*.

» *vesicaria*.

Dracocephalum argunense.

» *austriacum*, 5 gr. 3 fr.

» *botryoides*.

» *canariense*.

» *integrifolium*.

» *nutans*.

» *peregrinum*.

» » à fl. blanches.

» *Ruprechtii*.

» *Ruyschianum*, 5 gr. 2 fr.

» *speciosum*.

» *thymifolium*.

» *turkestanicum*.

Dryas Drummondii.

» *integrifolia* (ex Groënland).

» *lanata*, 5 gr. 5 fr.

» *octopetala* (*Dryade*), 10 gr. 5 fr.

L'une des plus gracieuses pl. tapissantes pour rochers; grandes fl. blanches; semis facile.

Drypis Jacquinianus.

» *spinosus*.

Echinacea intermedia, 10 gr. 4 fr.

» (*Rudbeckia*) *purpurea*, 10 g. 2 fr.

Echinacea purpurea nana.

» » *splendida.*

Les *Echinacea* sont d'excellentes pl. vivaces à gros capitules rouge carmin, excellentes pour la fleur coupée et fleurissant de juillet en décembre.

Echinops niveus.

» Ritro (chardon bleu sphérique du Dauphiné) récolté en Queyras, 10 gr. 2 fr.

» Ritro Floraire, 10 gr. 2 fr.

» *sphaerocephalus*, 10 gr. 2 fr.

Echium petraeum (*Lithospermum petraea*), 5 gr. 5 fr.

» *Bourgeanum.*

» *Moltkia petraea.*

» *simplex.*

Edelweiss (voir *Leontopodium*).

Edrayanthus (*Hedraeanthus*) *bosniacus.*

» *caricinus.*

» *caudatus.*

» *croaticus.*

» *dalmaticus*, 1 gr. 1 f.

» *dinaricus.*

» *graminifolius*, 1 gr. 1 f.

» *Kitaibellii.*

» *pumilio.*

» *pumiliorum.*

» *serpyllifolius.*

» *tenuifolius*, 1 gr. 1 f.

Elaeagnus argentea, 5 gr. 1 f.

Elymus canadensis.

Empetrum nigrum.

Ephedra altissima, 5 gr. 2 f.

» *distachya*, 5 gr. 3 f.

» *fragilis.*

» *Helvetica*, 5 gr. 2 f.

L'une des pl. les plus curieuses de la flore suisse.

Epilobium abyssinicum, 10 gr. 4 f.

Grande pl. à grands fl. carmin très vif.

» *alpinum.*

» *anagallifolium.*

» *angustifolium.*

» » à fl. blanches.

» *Fleischeri*, 5 gr. 3 f.

» *frigidum.*

» *glabellum.*

» *Hectori.*

» *hirsutum*, 10 gr. 4 f.

» » à fl. blanches.

» *latifolium.*

» *luteum.*

» *nummulariaefolium.*

» *obcordatum.*

Epilobium origanifolium.

» *pedunculare.*

» *pubens.*

» *rosmarinifolium*, 10 gr. 3 f.

Excellente espèce propre à garnir les lieux arides, fl. rose et carmin.

Epipactis palustris.

Eranthis cilicica.

» *yemalis.*

Eremurus altaicus.

» *Bungei.*

» *caucasicus.*

» *Elwesianus.*

» *Himalaicus.*

» *Him-robustus.*

» *inderiensis.*

» *Kaufmannicum.*

» *marginatus.*

» *multiflorus.*

» *robustus.*

» *spectabilis.*

» *tauricus.*

» *turkestanicus.*

Erica stricta, 10 gr. 5 f.

Bruyère corse arborescente, formant dans le jardin de superbes buissons qui se couvrent de fleurs roses tout l'été; esp. résistant aux sols calcaires et à nos hivers.

» *tetralix.*

Erigeron alpinus.

» *armeriaefolius.*

» *aurantiacus.*

» *caucasicus.*

» *compositus.*

» *Coulteri.*

» *elation.*

» *elatus grandiflorus.*

» *flagellaris.*

» *glabellus*, 10 gr. 2 f.

Très voisine de l'aster des alpes.

» *glaucus.*

» *leiomerus.*

» *macranthus.*

» *montanensis.*

» *neo-mexicanus.*

» *oreganum.*

» *Philadelphicus.*

» *pulchellus.*

» *roseus.*

» *rupestris.*

» *salsuginosus.*

» *speciosus*, 10 gr. 2 f.

Excell. pl vivace, à grands capitules lilas foncé autour

d'un disque d'or ; juin-automne.

Eremurus trifidus.

» *uniflorus*.

» *Villarsii*.

Erinacea pungens.

Erinus alpinus, 1 gr. 1 f. 50.

» à fl. blanches.

» *hirsutus*, 1 gr. 1 f. 50.

» » à fl. blanches.

» *hispanicus*.

» *roseus*.

Très jolies petites pl. à semer dans les vieux murs ou les rochers au soleil.

Eriogonum arboreum.

» *flavum*.

» *racemosum*.

» *umbellatum*.

Eriophorum angustifolium.

» *latifolium*.

» *Scheuchzeri*.

» *vaginatum*.

Eriophyllum caespitosum.

Eritrichium nanum (Roi de l'Alpe).

Erodium absinthoides.

» *amanum*.

» *cheilanthifolium*.

» *corsicum*.

» *daucoides*.

» *Guicciardi*.

» *hymenodes*, 1 gr. 1 f.

Erodium macradenum, 1 gr. 1 f.

» *Manescavi*, 10 gr. 5 fr., 5 gr. 3 fr.

L'une des meilleures pl. de roc. fleurissant tout l'été et l'automne. Grandes et belles fl. carmin vif.

» *oxyrynchus*.

» *Romanum*.

Erpetion reniforme.

Eryngium alpinum (*Panicaut* ou *Chardon bleu des Alpes*) ; 10 gr. 4 f. ; 5 gr. 2 f.

» *amethystinum*, 10 gr. 3 f. ; 5 gr. 2 f.

» *Bourgati* (**Le superbe Chardon bleu des Pyrénées**), 10 gr. 4 f. ; 5 gr. 2 f.

» *cæruleum* (chardon bleu grec)

esp. de gros effet (août-octobre), à semer ou planter dans les sols arides et les pentes ensoleillées ; 10 gr. 2 f.

» *Davosianum* (C'est la variété très foncée de l'E. *alpinum*).

» *Florariensis*.

» *album*.

Eryngium giganteum (chardon bleu du Caucase) ; 10 gr. 2 f.

» *maritimum*.

» *multifida*.

» *Olivierianum*.

» *planum* (chardon bleu de l'Atlas) ; 10 gr. 2 f.

» *serbicum* (vrai), 5 gr. 3 f.

» *Spinalba* (c'est le superbe et rare chardon bleu des Hautes-Alpes), 10 gr. 5 f.

» *tripatitum*.

» *Zabeli*.

Erysimum Allionii (*Cheiranthus*) ;

10 gr. 2 f. ; 5 gr. 1 f.

Plante excellente à floraison prolongée ; fl. orangé très vif ; parfum suave ; culture extra facile.

» *cheiranthoides*.

» *Helveticum*, 10 gr. 2 f. ; à semer dans les talus arides.

» *leptophyllum*.

» *nanum*, 10 gr. 2 f.

» *ochroleucum*.

» *odoratum*.

» *pachycarpum*.

» *pulchellum*.

Très jolie pl. rampante à fl. jaune vif ; floraison prolongée cult. facile ; 10 gr. 3 f., 5 gr. 2 f.

» *pumilum*.

» *purpureum*.

» *Rhæticum*.

Erythraea centaureum.

» » *alba*.

» *diffusa*.

» *gothica*.

» *latifolia*.

» *linarifolia*.

» *littoralis*.

» *ramosissima*.

» *Rumelica*.

Erythronium Johnsoni.

Eschscholzia aurantiaca.

Plante bisannuelle naine qui se resseme d'elle-même avec abondance et donne toute l'année et jusqu'en hiver de grandes fl. de pavots d'un orangé très vif ; 10 gr. 2 f.

» *californica*, 10 gr. 2 f.

» » *var. alba*.

» » *carmin*.

» » *cinabré*.

» » *glauc*.

Eupatorium ageratoides, 5 gr. 2 f.

» *cannabinum album*, 5 gr. 2 f.

Eupatorium serotinum.
 » *verticillatum.*
Euphorbia altissima.
 » *bimaculata.*
 » *canescens.*
 » *Characias.*
 » *Dendroides.*
 » *Gerardiana.*
 » *Kotschyana.*
 » *Lathyris.*
 » *Myrsinites.* Excellente pl. à semer dans les endroits arides et secs; 10 gr. 2 fr.
 » *pilosa.*
 » *polychroma.*
 » *robusta.*
 » *songarica.*
 » *spinosa.*
 » *Wulfeni.*
Euphrasia lutea.
 » *minor.*
 » *montana.*
Euryangium Sumbul.
Falcaria latifolia.
 » *Rivini.*
Falkia repens.
Farsetia eriocarpa, 10 gr. 4 f., à semer dans les lieux arides.
 » *triquetra* (rare).
Ferula Asa foetida.
 » *communis.*
 » *Jaeskeana.*
 » *oopoda.*
 » *Orientalis.*
 » *Tetenema.*
 Grandes ombellifères au feuillage finement divisé et hautement décoratives.
Festuca alpina.
 » *flavescens.*
 » *glauc.*
 » *valesiaca.*
 » *violacea.*
 Petits gazons des montagnes à feuillage fin.
Fragaria Daltoniana.
 » *indica.*
 Fraisier retombant, à fl. jaunes.
 » *mexicana.*
 » *monophylla.*
 » *roseiflora.*
Francoa appendiculata.
 » *sonchifolia.*
Frasera speciosa.
Fritillaria askabadensis.
 » *delphinensis,* de la station classique du Queyras, 5 gr. 4 f.

Fritillaria imperialis (couronne impériale).
 » *Meleagris.*
 » *pallidiflora.*
Fumana procumbens.
Funkia cœrulea.
 » *cordata.*
Gagea lutea.
Galanthus nivalis.
Galatella incisa.
Galax aphylla.
Galega officinalis.
 » *alta.*
 » *orientalis.*
 » *persica.*
Gaillardia aurantiaca.
 » *grandiflora,* 5 gr. 1 f.
 Belle pl. vivace à très grandes fl. de soleil, rouge et jaune; grand effet; cult. facile.
Galium Mollugo.
 » *purpureum.* Très précieuse pl. d'ornement p. rochers et jardins alpins; gazon fin, fl. d'un brun noir, 5 gr. 2 f.
 » *tenuë.*
Galtonia candicans (Jacynthe du Cap).
Gaura coccinea.
 » *Lindheimeri.* Pl. vivace à longs épis défil. rose chair, excellente p. la fleur coupée; 10 gr. 2 f.
Gaya simplex.
Genista aetnensis.
 » *Andreana.*
 » *anglica.*
 » *cinerea.*
 » *germanica.*
 » *horrida.*
 » *juncea,* 10 gr. 1 f.
 Le brillant Genêt jaune d'Espagne, l'un de nos meilleurs et plus solides arbustes.
 » *pilosa.*
 » *radiata,* 10 gr. 1 fr.
 Petit arbuste nain très propre à décorer les rochers.
 » *sagittalis.*
 » *sericea.*
 » *sibirica.*
 » *tinctoria.*
 Tous ces Genêts sont excellents pour garnir les rocailles au soleil. Floraison prolongée, pl. solides.
Gentiana acaulis, 10 gr. 3 fr., 5 gr. 2 fr.
 L'une des meilleures pl. des

Alpes; germination lente, mais sûre.

Gentiana alba.

- » alpina (vrai), 1 gr. 1 f.
- » altaica.
- » amarella (annuelle).
- » Andrewsii.
- » angulosa.
- » angustifolia.
- » asclepiadea, 1 gr. 1 f.
- » » à fleurs blanches.
- » austriaca (annuelle).
- » barbata.
- » bavarica.
- » Bigelowi.
- » brachyphylla.
- » brevidens.
- » Burseri.
- » campestris (annuelle), 10 gr.
- » 3 f. (à semer dans les gazons des jardins alpins).
- » Clusii.
- » cruciata, 10 gr. 4 f., 5 gr. 2 f.
- » depressa.
- » detonsa.
- » Favratii.
- » Fetisowii.
- » Freyniana.
- » frigida.
- » Frœchlichii.
- » Gentianella (Hort. Angl.), 5 gr.
- » 3 f.
- » germanica (annuel.), 5 gr. 2 fr.
- » glomerata.
- » hybrida (straminea × Kesselringi), 5 gr. 2 f.
- » imbricata.
- » Kesselringii.
- » » à fl. blanches.
- » Kochiana, 10 gr. 4 f.
- » lutea, 10 gr. 2 f., 5 gr. 1 f. 50.
- » macrophylla.
- » » cyanea.
- » mongolica.
- » Moorcroftiana.
- » nivalis (annuelle), 1 gr. 1 f. 50.
- » Olivieri.
- » pannonica.
- » parryi.
- » phlogifolia, 5 gr. 3 f.
- » Pneumonanthe.
- » Przewalskyi.
- » pumila.
- » punctata; 10 gr. 3 f., 5 gr. 2 f.
- » purpurea; 10 gr. 3 f., 5 gr. 2 f.
- » » alba.
- » » nana.
- » Regeli.

Gentiana Rocheliana.

- » Rostani.
 - » Saponaria.
 - » Très belle espèce reçue du Canada.
 - » Sceptrum (ex. Canada).
 - » septemfida, 1 gr. 1 f.
 - » » latifolia, 1 gr. 1 f.
 - » straminea.
 - » straminea × Tibetica.
 - » tenella (annuelle), 1 gr. 1 f. 50.
 - » Tibetica, 2 gr. 1 f.
 - » Tshiantanica.
 - » » glomerata.
 - » triflora.
 - » uliginosa (annuelle).
 - » utriculosa (annuelle).
 - » verna, 1 gr. 1 f. 50.
 - » » var. à fl. blanches.
 - » » » azurea.
 - » » » grandiflora.
 - » » » atrocœrubea.
 - » Walujewii.
- Geranium aconitifolium (rivulare)*, 5 gr. 2 f.
- » albanum.
 - » albiflorum.
 - » argenteum, 1 gr. 1 f.
 - » armœnum.
 - » carolinianum.
 - » cinereum.
 - » Endresii.
 - » Fremonti.
 - » grandiflorum.
 - » Grevilleanum.
 - » Ibericum.
 - » macrorhizum.
 - » nepalense.
 - » nodosum.
 - » palustre.
 - » phaeum.
 - » platyanthum.
 - » platypetalum.
 - » pratense.
- Excellente plante pour rochers et plates-bandes, fleurissant tout l'été; germe de suite et produit la même année ses belles fleurs bleu violet foncé. 10 gr. 2 f., 5 gr. 1 f.
- » Richardsoni.
 - » sanguineum, 10 gr. 4 f.
 - » » à fleurs blanches.
 - » 10 gr. 5 f.
 - » sessiliflorum.
 - » subcaulescens.
 - » sylvaticum.
 - » tuberosum.

Gerardia tenuifolia.
Gerbera Abyssinica.
 » *Jamesoni.*
 » » var. *horticoles.*
 » *Kunzeana.*
Geum atrosanguineum, 10 gr. 4 f.
 » *bulgaricum.*
 » *chiloense* (à fl. rouge très vif).
 » *coccineum (idem)*, 10 gr. 4 f.
 » » *grandiflorum*, 10 gr., 5 f.
 » *Heldreichii*, 5 gr. 3 f.
 » *heterocarpum*, 5 gr. 3 f.
 » *intermedium.*
 » *laciniatum.*
 » *macrophyllum.*
 » *magellanicum.*
 » *montanum*, 5 gr. 3 f.
 » *M^{rs} Bradschaw.*
 » *pyrenaicum*, 5 gr. 3 f.
 » *reptans.*
 » *Rhæticum.*
 » *rivale*, 10 gr. 2 f.
 » » *grandiflorum.*
 » *rubellum.*
 » *triflorum.*
 » *tyrolense.*
 » *Wildenowi.*
Gilia coronopifolia, 10 gr. 4 f.
 Superbe fl. californienne d'un rouge éclatant.
Gillenla trifoliata, 10 gr. 4 f.
 L'une des meilleures et des plus florifères d'entre les pl. vivaces d'ornement, fl. blanc-rosé, gracieusement suspendues sur tiges rouge-brun, mai-sept.
Gnadiolus palustris.
Gnauicum cappadocicum.
 » *corniculatum.*
 » *leiocarpum.*
 » *luteum*, 10 gr. 1 f.
 » *rubrum*, 10 gr. 2 f.
 » *tricolor*, 10 gr. 2 f.
 » » *grandiflorum*, 10 gr. 3 f.
Gnauix maritima.
Gnolularia bellidifolia.
 » *cordifolia*, 5 gr. 4 f.
 » *nana.*
 » *nudicaulis*, 5 gr. 3 f.
 » *trychosantha*, 5 gr. 3 f.
 » *vulgaris*, 5 gr. 3 f.
Gnosocomia Clematidea.
Gnaphalium Leontopodium, 1 g. 1 f. 50.
 » *norvegicum.*
 » *supinum.*
 » *sylvaticum.*
Gnindelia cuneifolia, 10 gr. 2 f.
 » *robusta*, 10 gr. 2 f. Composées

vivaces à grandet capitules jaunes.
Gutierrezia Euthamiae.
Gymnolomia multiflora.
Gypsophila acutifolia, 10 gr. 2 f.
 » *alpicola*, 10 gr. 4 fr.
 » *altissima.*
 » *cerastioides.*
 » *libanotica.*
 » *paniculata*, 10 gr., 2 f.
 L'une des meilleures pl. p^r la fleur coupée et l'ornementation des jardins.
 » *paniculata compacta.*
 » *repens* (pl. tombante de grande valeur ornementale p. les rochers), 10 gr. 3 f. 5 gr. 2 f.
 » *repens* var. *major.*
 » *Rokejeka.*
 » *scorzoneræfolia*, 10 gr. 2 f.
 » *Steveni.*
 » *transylvanica.*
 » *trichotoma.*
Haberba Rhodopensis.
Hablitzia tamnoides.
Hacquetia Epipactis.
Halimodendron argenteum.
Haplocarpha Leichtlini.
Hebenstreitia comosa.
Hedysarum boreale.
 » *esculentum.*
 » *microcalyx.*
 » *multijugum.*
 » *neglectum.*
 » *obscurum.*
 » *polymorphum.*
 » *Semenowi.*
 » *sericeum.*
 » *sibiricum.*
 » *songaricum.*
Heimia salicifolia.
Helenium autumnale.
 » *Bolanderi.*
 » *Hooperi.*
 Bonnes pl. vivaces à capitules jaunes.
Helianthella quinquænervis.
Helianthemum alpestre (jaune).
 » *amabile* (carmin), 10 gr. 4 f.
 » *apenninum* (blanc), 10 gr. 2 f.
 » *atrosanguineum* (rouge grenat).
 » *aurora.*
 » *bicolor* (jaune et rouge), 10 gr. 4 f.
 » *canum* (jaune).
 » *coccineum* (rouge ardent).
 » *cruentum* (rouge vif).
 » *Fumana* (jaune), 10 gr. 2 f.

Helianthemum Garibaldi.

- » grandiflorum (jaune), 10 gr. 2 f.
- » mutabile (de plusieurs teintes), 10 gr. 2 f.
- » obscurum (jaune).
- » celandicum (jaune).
- » polyfolium (blanc), 10 gr. 4 f.
- » rhodanthum.
- » roseum (rose clair), 10 gr. 3 f.
- » rubrum (rouge sombre).
- » salicifolium.
- » sulfureum.
- » tomentosum (à feuilles blanch. fl. jaun.), 10 gr. 2 f.
- » velutinum (jaune).
- » vulgare (jaune), 10 gr. 2 f.

Ce sont des pl. à gracieux feuill. persistant, aux fl. nombreuses, se succédant presque toute l'année quand on a soin de couper les tiges après la fleur; culture très facile. Pl. naines et touffues, excell. pour les rochers et talus arides. Lèvent facilement et rapidement.

Helianthus (Tournesols vivaces).

- » ciliaris (ex America).
- » Maximilianus (ex America).
- » pumilus (ex America).

Helichrysum angustifolium.

- » anaticum.
- » antennarium.
- » arenarium.
- » lanatum.
- » odoratum.
- » Stoeckas.

Heliopsis laevis, 10 gr., 1 fr.

- » Pitcherianus.
- » scabra.
- » "Soleil d'or", 10 gr. 1 fr.

Grandes composées vivaces à fl. jaune orangé.

Helleborus abschasicus.

- » atropurpureus.
- » corsicus.
- » foetidus.
- » niger (Rose de Noël), 10 g. 3 fr.
- » orientalis.
- » purpurascens.
- » viridis.

Heracleum alpinum.

- » giganteum, 10 g. 2 fr.
- » lanatum (Etats-Unis).
- » Lehmannianum.
- » Mantegazzianum, 10 gr. 2 fr.

Les gr. de cet Heracleum nous ont été apportées du Caucase en 1892. C'est une bonne

pl. viv., propre à isoler dans les pelouses, de culture extrêmement facile et à forte odeur anisée; l'une des meilleures plantes mellifères.

Heracleum montanum.

- » orientale.
- » pubescens.
- » pyrenaicum.
- » villosum.

Herniaria glabra.

- » hirsuta.
- » incana.

L'H. glabra est la meilleure pl. tapissante pour garnir les lieux secs et arides, en plein soleil, les sols maigres et stériles qu'elle recouvre rapidement, 10 g. 5 fr.; 5 gr. 3 fr.

Hesperis matronalis (Giroflée vivace).

- » var. candidissima

La Girarde ou Giroflée vivace est une pl. solide, aux nombreuses fl. violettes, odorantes et qu'on peut utiliser pour garnir les coins arides, les grands rochers, les lieux pittoresques, 10 gr. 1 fr.

- » nivea.
- » sibirica.
- » tristis.

Heuchera glabra.

- » purpurascens.
- » rubescens.
- » sanguinea, 5 gr. 3 fr.

Délicieuse saxifragée des montagnes du Mexique, aux fl. rose vif et se succédant de mai en août.

- » sanguinea alba.
- » grandiflora.
- » maxima.
- » splendens.

Hibiscus argentinus.

- » militaris.
- » alba.
- » palustris.
- » roseus.

Hieracium albidum.

- » aurantiacum.
- » Bormülleri.
- » lanatum.
- » stoloniflorum.
- » villosum.

Hippocrepis comosa.**Homogyne alpina.**

- » discolor.
- » sylvestris.

Honkeya peploides.
Horminum pyrenaicum.
 » » splendens.
Houstonia coerulea.
Hugueninia tanacetifolia, 5 gr. 3 fr.
Hutschinsia alpina. (*Lepidium alpinum*).
Hydrophyllum virginicum.
Hypericum Androsæum, 5 gr. 3 fr.
 » aureum, 5 gr. 3 fr.
 » Balearicum.
 » calycinum.
 » Coris, 1 gr. 1 fr. 50.
 » delphicum.
 » empetrifolium.
 » fragile.
 » Gebleri.
 » Henryi.
 » hircinum.
 » Hookerianum.
 » hyssopifolium.
 » Kalmianum, 5 gr. 2 fr.
 » Kotschyanum.
 » linarifolium.
 » maculatum.
 » montanum.
 » nummulariæfolium.
 » Olympicum, 1 gr. 1 fr.
 » Orientale, 5 gr. 2 fr.
 » organifolium.
 » patulum, 5 gr. 3 fr.
 » perforatum. (Millepertuis).
 » poliphyllum.
 » prolificum.
 » Przewalskyi.
 » ptarmicæfolium, 5 gr. 4 fr.
 » pulchrum.
 » quadrangulum.
 » repens. L'une des meilleures pl.
 » tapissantes, 5 gr. 4 fr.
 » reptans.
 » Rhodopeum.
 » Richeri.
 » rumelicum.
 » scabrum.
 » tomentosum, 5 gr. 2 fr.
 » transylvanicum
 » uralum.
Hypochaeris carpathica.
 » Helvetica.
 » maculata.
Hyssopus aristatus, 5 gr. 2 fr.
 » creticus.
 » officinalis, 10 gr. 2 fr.
 L'hyssope, à fl. bleu très foncé, au feuillage fortement aromatique, est une excellente pl. pour les pentes arides et

lieux secs, recherchée des abeilles.
Hyssopus officinalis à fl. blanches.
 10 gr. 3 fr.
 » » à fl. rouges, 10 g. 3 f.
 » recticaulis.
 » sibiricus.
Iberis commutata.
 » gibraltarica, 10 gr. 2 fr.
 Belle et bonne pl. à fl. lilas, se succédant pendant une grande partie de l'année.
 » Gibraltarica × Tenoreana.
 » Jordani.
 » jucunda.
 » saxatilis.
 » sempervirens.
 » sempervirens, 10 gr. 3 fr.; 5 gr. 2 fr.
 L'une des meilleures pl. à rocailles et bordures; fl. blanc pur, de mai en juillet; effet éclatant.
 » sempervirens nana, 5 gr. 3 fr.
 » stylota.
 » Taurica.
Impatiens glanduligera.
 » noli tangere.
Imperatoria angustifolia.
 » Ostruthium.
Incarvillea brevipes.
Incarvillea Delavayi, 5 gr. 2 fr.
 (Gloxinia vivace). L'une des meilleures pl. viv. d'ornement que nous ait fourni l'Asie; s'élève facilement de semis.
 » grandiflora.
 » Olgae.
Inula Aschersoniana.
 » acaulis.
 » ensifolia, 5 gr. 3 fr.
 Belle pl. de rochers à fl. jaunes. (Juin-octobre.)
 » glandulosa, 5 gr. 3 fr.
 Sorte d'Arnica à très grandes fl. originaire du Caucase.
 » grandiflora.
 » Helenium (aunée), 5 g. 2 fr.
 Pl. officinale stomachique de grande valeur, appréciée déjà des Romains; belle pl. d'ornement.
 » hirta.
 » limonifolia.
 » macrocephala.
 » montana.
 » Royleana.
Ipomaea rubro-coerulea.

Iris albida.

- » acutiloba (ex Oriens).
- » arenaria.
- » caucasica.
- » Constantinopolitana.
- » Douglasiana.
- » Fieberi.
- » foetidissima.
- » Fontanesi.
- » gigantea.
- » iberica.
- » Junionana (ex Oriens).
- » Kumaonensis.
- » lævigata (*Kämpferi*).
- » musulmanica.
- » orchioïdes.
- » paradoxa (ex Oriens).
- » Polakii.
- » prismatica.

Iris pseudo-Acorus (Le lis héraldique).

- » pyrenaica.
- » reticulata.
- » sibirica.
- » » alba.
- » sisyrinchium.
- » Suziana superbissima.
- » versicolor.
- » virginica.

Isatis alpina (vraie, récoltée dans le Haut-Queyras, sa station classique). 1 gr. 1 fr.

- » brachycarpa (ex Armenia).
- » tinctoria.

Jacaranda mimoseefolia.**Jasione humilis.**

- » montana.
- » perennis.

Jeffersonia diphylla.**Juniperus Cedrus (du Pic de Ténériffe). 5 g. 4 fr.**

- » communis.
- » nana, 5 gr. 2 fr.
- » Phœnicea.
- » prostrata.
- » Sabina, 5 gr. 2 fr.

Kernera saxatilis.**Kitaibelia vitifolia.****Knautia arvensis alba.****Kniphofia (Tritoma).**

- » caulescens.
- » grandiflora.
- » Saundersi.
- » Tuckyi.
- » Uvaria.

Kochia trichophylla.**Lactuca chondrillaeflora.**

- » perennis.
- » » alba.

Lagerstroemia indica.**Lamium album.****Laserpitium gallicum, 10 gr. 3 fr.**

- » halleri, 10 gr. 3 fr.
- » hispidum.
- » latifolium, 10 gr. 3 fr.
- » peucedanoides.
- » siler, 10 gr. 3 fr.

Grandes Ombellifères au feuillage ornemental, propres à semer dans les talus arides pour retenir le sol.

Lasiagrostis Calamagrostis.**Lathyrus alatus.**

- » heterophyllus.
- » incurvus.
- » latifolius, 10 gr. 1 fr.
- » » à fl. blanc pur, 10 g. 1 fr.
- » maritimus.
- » neurolobus.
- » odoratus (*Pois de senteur*). Collection anglaise en mélange, 10 gr. 2 fr.
- » Collection de floraison, mélange, 10 gr. 2 fr.
- » pratensis.
- » pyrenaicus.
- » rotundifolius.
- » sylvestris.

Laurentia tenella.**Lavandula abrotanifolia.**

- » delphinensis, 10 gr. 4 fr.

La vraie lavande du Dauphiné.

- » nana compacta.
- » officinalis, 10 gr. 4 fr.
- » spica.
- » Stœkas.
- » vera.
- » » à fl. blanches.

Leontopodium alpinum (Edelweiss).

Semer dans un sol léger et tenir plutôt sec; repiquer jeune et cultiver au soleil et dans sol calcaire. Diviser tous les deux ans, 1 gr. 1 fr. 50.

Leontopodium altaicum.

- » depauperatum.
- » Himalayense.
- » japonicum.
- » Lindavicum.
- » sibiricum.
- » sikkimense.
- » tibeticum.
- » transylvanicum.

Lepachrys columnaris (Obeliscaria).**Lepidium alpinum (*Hutschinsia*).**

- Lepidipm Auerswaldii.*
 » *stylatum.*
Lepigonum rubrum.
Leucanthemum maximum (Grand
marguerite).
Leucojum æstivum.
Leuzea conifera.
Liatris graminifolia.
 » *punctata.*
 » *pycnostachya.*
 » *scariosa*, 5 gr. 3 fr.
 » *spicata*, 5 gr. 3 fr.
 Belles fl. d'ornement vivaces, à fl. roses en épis dressés.

- Libertia grandiflora.*
Ligularia afghanistanica.
 » *areneosa.*
 » *calthæflora.*
 » *macrophylla*, 5 gr. 2 fr.
 » *sibirica*, 5 gr. 2 fr.
 » *turkestanica.*
Lilium bulbiferum.
 » *candidum.*
 » *Catanæ.*
 » *cordifolium (ex Japon).*
 » *croceum.*
 » *dalmaticum.*
 » *Glehni.*
 » *Martagon (excellent pour les*
sous-bois), 5 gr. 2 fr.
 » *Martagon à fl. blanches.*
 » *monadelphum.*
 » *pomponium.*
 » *pumilum (ex Sibéria).*
 » *pyrenaicum (Martagon jaune)*,
 5 gr. 3 fr.
 » *superbum.*
 » *tenuifolium.*
 » *tigrinum.*

- Linaria alpina*, 5 gr. 3 fr.
 » *alba.*
 » *concolor.*
 » *rosea.*
 » *anticaria.*
 » *canadensis*
 » *cilicica.*
 » *cymbalaria.*
 » *à fl. blanches.*
 » *var. compacta.*
 » *dalmatica.*
 » *genistifolia (le vrai).*
 » *italica.*
 » *macedonica.*
 » *organifolia.*
 » *pallida*, 1 gr. 1 fr.
 » *rosea.*
 » *Pancicii.*
 » *petræa (voisin d'alpina).*

- Linaria pilosa.*
 » *purpurea.*
 » *spuria.*
 » *striata.*
 » *trionitophora (superbe espèce*
portugaise).
 » *tristis.*

- Lindelofia spectabilis*, 5 gr. 1 fr.
(Myosotis d'Orient).
 Jolie et solide Boraginée à fl. bleu foncé.

- Linnæa borealis.*
 » *canadensis (ex Canada).*

- Linum alpinum.*
 » *campanulatum.*
 » *capitatum.*
 » *catharticum.*
 » *flavum*, à fl. jaune pâle, très beau, excellent pour rochers ensoleillés et bonne fl. vivace pour fl. coupée, 10 gr. 3 fr.; 5 gr. 2 fr.
 » *grandiflorum (à fl. rouge vif).*
 » *maritimum.*
 » *narbonense.*

Le meilleur de tous; grandes fl. bleues, à pétales persistantes.

- » *perenne*, 10 gr. 2 fr.
 » *à fl. blanches*, 10 g. 2 f.
 » *à fl. roses.*

Le L. perene est l'une des meilleures pl. d'ornement pour platebandes et grands rochers, au soleil; fl. bleu d'azur, très abondantes, de mai en novembre. Culture des plus faciles.

- » *salsoloides.*
 » *tenuifolium.*
 » *viscosum à fl. rose tendre.*

- Lithospermum Froebeli.*
 » *fruticosum.*
 » *Gastonis.*
 » *graminifolium*, 1 gr. 1 fr.
 » *intermedium*. 1 gr. 1 fr.
 » *oleoides.*
 » *petræum (Echium ou Moltkia petræa)*, 1 g. 1 fr.; 5 g. 4 fr.
 » *prostratum.*
 » *purpureo-cæruleum.*
 » *Sibthorpium.*

- Lloydia serotina.*
Lobelia cardinalis (vrai).

- » *fulgens.*
 » *Gerardi.*
 » *Kalmii.*
 » *Kamtschatica.*
 » *linnaeoides.*

Lobelia Lugdunensis.

- » *speciosa,*
- » *syphilitica,* 5 gr. 5 fr.

Lonicera alpigena.

- » *cœrulea,* 10 gr. 2 fr.
- » *etrusca.*
- » *nigra,* 10 gr. 2 fr.
- » *pyrenaica* (vrai), 10 gr. 2 fr.

Lotus corniculatus.

Luhea divaricata (ex Chili).

Lunaria rediviva.

Luzula albid.

- » » *rubra.*
- » *nivea.*
- » *parviflora* (ex Groenland).

Lychnis alpina, 2 gr. 1 fr.

- » » à fl. blanches.
- » *chalconica* (Croix de Malte), 10 gr. 2 fr.
- » *chalconica alba,* 5 gr. 2 fr.
- » » *rosea.*
- » *flos Jovis* (*Fl. de Jupiter*), 5 gr. 2 fr.
- » » à fl. blanches.
- » *fulgens.*
- » *Haageana.*
- » *Lagascæ* (*Petrocoptis Lagascæ*).
- » *Laponica.*
- » *viscaria,* 5 gr. 2 fr.

Jolie Carophyllée rose carmin vif, facile à élever de graines.

- » *viscaria alba.*
- » » *rosea.*
- » » *splendens,* 5 gr. 2 fr.

Lynosiris punctata.

- » *vulgaris.*

Lysimachia atropurpurea.

- » *clethroides.*
- » *dahurica.*
- » *dubia,* 5 gr. 2 fr.
- » *epherum.*
- » *japonica.*
- » *kindigeri.*
- » *lobelioides.*
- » *punctata.*
- » *quadrifolia,* 5 gr. 2 fr.
- » *thyrsiflora.*
- » *verticillata,* 5 gr. 2 fr.
- » *vulgaris,* 5 gr. 2 fr.

Plante propre à garnir les lieux humides et dont plusieurs (*dubia*, *punctata*, *verticillata*) sont également de bonnes pl. vivaces, à grand effet, grâce à leurs grands panicules d'innombrables fl. jaune vif ou blanc rosé.

Lythrum Salicaria, 5 gr. 2 fr.

Excellente pl. pour les lieux humides.

Macrotys actaeoides.

Malva Alcea.

- » » *alba.*
- » » *moschata.*
- » » *alba.*

Malvastrum lateritium.

- » *limense.*

Mamillaria vivipara.

Mandragora officinalis.

Margyricarpus setosus.

Marrubium candidissimum.

- » *cyllaneum.*
- » *Kotschy.*
- » *lanatum.*
- » *sericeum.*
- » *spinulosum.*
- » *velutinum.*

Matthiola fenestralis.

- » *fragrantissima.*
- » *incana* type.
- » » var. (*Giroflées en variétés*).
- » » var. *Augusta-Victoria.*
- » *odoratissima* (ex Oriens).
- » *rupestris.*
- » *sinuata.*
- » *tristis.*
- » *valesiaca.*

Mayanthémum canadense.

Meconopsis aculeata.

- » *cambrica* 5 gr. 4 fr.
- (Pavot jaune des bois). Cette pl. est excellente pour les lieux frais et ombragés.
- » *cambrica* à fl. orangées.
- » » à fl. pleines.
- » *heterophylla.*
- » *integrifolia.*
- » *nepalensis.*
- » *paniculata.*
- » *petiolata.*
- » *racemosa.*
- » *simplicifolia.*
- » *sinuata latifolia.*
- » *Wallichiana.*

Medicago Echinus. (Pl. de la Passion), feuilles maculées de sang).

Melandrium rubrum (*Lychnis* des prés alpins), 10 gr. 3 fr.

- » affine (ex Groenland).

Melica altissima.

- » *atropurpurea.*
- » *ciliata.*
- » *nutans.*
- » *uniflora.*

Melissa officinalis (Mélisse), 5 gr.
1 fr.

Mertensia ciliata.

» *echioides*.

» *lanceolata*.

» *oblongifolia*.

» *paniculata* (*sibirica*).

» » à fl. blanches.

» *primuloides*.

Meum athamanticum, 10 gr. 2 fr.

L'une des plus fines verdure
qu'on puisse imaginer.

Meum Mutellinum.

Michauxia campanuloides.

Micromeria rupestris.

Mimulus alsinoides

» *cardinalis*.

Le *M. cardinalis* a les fl.
rouge vermillon.

Mimulus cardinalis de couleurs va-
riées.

» *Lewisii* (ex Canada).

» *luteus*.

Mirabilis multiflora.

Mitchella repens.

Mitella diphylla.

» *pentandra*.

Mœhringia ciliata.

» *Jankæ*.

» *muscosa*.

» *papulosa*.

» *pendula*.

» *Ponæ*.

Monarda dydima.

» » *alba*.

» *fistulosa* (thé d'Oswego).

» *florariensis*.

» *Kalmiana*.

» *purpurea*.

» *stricta*.

» *superba*.

Molospermum cicutarium.

Molucella spinosa.

Moræa iridioides.

Morine longifolia, 10 gr. 2 r.

» *persica*.

Muhlenbeckia nana.

Mulgedium alpinum, 1 gr. 1 fr.

» *Bourgæi*, 1 gr. 1 fr.

» *plumieri*, 1 gr. 1 fr.

Grandes laitues vivaces à fl.
lilas bleu.

Myosotis alpestris (fl. bleu pur). 5 gr.
2 fr.

» *cæspitosa*.

» *lithospermifolia*.

» *palustris*, bleu d'azur, 5 gr.
3 fr.

Myosotis palustris, var. « perfection ».
» » var. *semperflorens*.

» *pygmaea*.

Myosotis rupicola.

» *Welwitschii*.

Myriactis Wallichii

Myricaria (*Tamarix*) *germanica*.

Myrrhis odorata.

La Myrrhe, dont les racines
sont fortement anisées.

Nardus stricta.

Nepeta lanceolata.

» *macrantha*.

» *Nepetella*.

» *nuda*.

» *Tibetica*.

Nuphar luteum (*Nénuphar jaune*).
5 gr. 2 fr.

Nymphæa alba (*nénuphar blanc*), 5 g.
2 fr.

Obeliscaria pulcherrima.

Oenothera acaulis.

» *arguta*.

» *cæspitosa*.

» *densiflora*.

» *Fraseri* (*fruticosa*), 5 gr.
3 fr.

» *macrocarpa* (*O. Missouriensis*).

L'une des meilleures plantes
de rocailles; grandes fl. jaune
clair, de juin en novembre;
culture facile; 10 gr. 2 fr.

» *pumila*.

» *rosea*.

» *rosea mexicana*.

» *serrulata*.

» *speciosa*.

Omphalodes cappadocica.

» *linifolia* (annuel).

» *Luciliæ*.

» » à fl. blanches.

» *nitida*.

Onobrychis laconica.

» *montana*.

Ononis cenisia, 5 gr. 2 fr.

» *fruticosa*.

» *natrix*, 10 gr. 1 fr.

» *rotundifolia*, 10 gr. 2 fr.

Onopordon bracteatum.

Onosma armena.

» *albo-rosea*.

» *Bourgæi*.

» *Cassium*.

» *Helveticum*, 5 gr. 3 fr.

» *pallida*.

» *poliophyllum*.

» *rupestris*.

» *stellulatum*, 5 gr. 3 fr.

*Opuntia albospina*¹.

- » *arborescens*.
- » *arkansana*.
- » *Camanchica*, 5 gr. 2 fr.
- » » *major*, 5 gr. 2 fr.
- » *cantabrigensis*.
- » *cymochila*, 5 gr. 2 fr.
- » *fulgens* (à fl. rouge vif).
- » *gigantea*, 5 gr. 2 fr.
- » *greenii*, 5 gr. 2 fr.
- » *macrorhiza*, 5 gr. 2 fr.
- » *mesacantha*, 5 gr. 2 fr.
- » *missouriensis*, 5 gr. 2 fr.
- » *orbicularis*.
- » *Raffinesquiana*, 5 gr. 2 fr.
- » *rubra*, 1 gr. 1 fr.
- » *Salmonia* (fl. rouge saumon).
- » *spinacantha*, 2 gr. 1 fr.
- » *vulgaris*.
- » *Xanthostemma rosea*.

Origanum pulchrum.*Orobus lathyroides*.

- » *luteus*.

Orobus niger.

- » *tuberosus*.
- » *vernus*.

Ostrowskya magnifica.*Othonna cheirifolia*.*Oxalis acetosella*.

- » » *rosea*.
- » *atrosanguinea*.
- » *enneaphylla*.

Oxybaphus nyctaginus.*Oxyria digyna*.

- » *elator*.

Oxytropis Baikalensis, 5 gr. 3 fr.

- » *campestris*, 5 gr. 3 fr.
- » *Halleri*, 5 gr. 3 fr.
- » *Laponica*.
- » *ochroleuca*.
- » *Pallasi*.
- » *pilosa*.
- » *sordida*.
- » *spicata*.
- » *sulfurea*.
- » *Tyrolense*.

Pachystigma Cambyi (ex Canada).*Paeonia albiflora*.

- » *anomala*.
- » *coralina*.
- » *decora* (Romanica), 10 gr. 2 fr.

fl. couleur vermillon très vif.

Paeonia decora major.

- » *lutea*, 10 gr. 5 fr.
- » *officinalis*, 10 gr., 2 fr.
- » *Pallasi*.
- » *peregrina*.
- » *Russi*.
- » » *alba*.
- » *tenuifolia*.
- » *triternata*, 10 gr. 3 fr.
- » *Witmanniana*.

Palafoxia mexicana.*Pancratium maritimum*.*Papaver alpinum*, 10 gr. 6 fr.

- » *alpinum*, var. à fl. rouge vif, rouge cinabre, rose et jaune.
- Ces pavots alpins sont d'entre les plus florifères, les plus gracieuses et les meilleures des pl. de roc. Leurs fleurs, très abondantes, affectent toutes les teintes. On peut les semer dans les rochers, les graviers, les fentes de murs et les lieux pierreux. Sol maigre et rocailleux.

Papaver alpino-nudicaule.

- » *atlanticum*.
- » *bracteatum* (*involucratum*).
- » *Burseri*.
- » *caucasium*.
- » *croceum*.
- » "Croix helvétique".
- » *Heldreichii*.
- » *Kernerii*.
- » *maximum*.
- » *monanthum*.
- » *nudicaule*, 10 gr. 4 fr.
- » » à fl. blanches.
- » » » jaune vif.
- » » » rouge cramoisi.
- » » Toutes teintes mélang.

Le pap. nudicaule est l'une des plus florifères et des plus précieuses d'entre les plantes alpines ou vivaces. Il aime la fraîcheur et la mi-ombre et constitue l'un des meilleurs ornements des rochers. Fleurit tout l'été et jusqu'en hiver, très facile à cultiver; bon pour la fl. coupée.

- » *oreophyllum*.

¹ Ces *Opuntia* sont des Cactées dont les graines lèvent facilement et qui sont rustiques à nos hivers. Il suffit, dans les pays du Nord, de tenir les plantes au sec (recouvertes de planches inclinées) pendant la mauvaise saison. Elles fleurissent abondamment l'été si l'on a soin de les planter au grand soleil. En Allemagne, on en cultive de grandes collections sans même les recouvrir de planches.

Papaver orientale, 10 gr. 2 fr.

» » variétés en mélange,
10 gr. 3 fr.

Le pavot d'Orient est la plus éclatante de nos fleurs de pl. terre. Sa grosse corolle d'un rouge ardent fait un effet grandiose dans les jardins. Culture facile. On en possède de nombreuses variétés, mais, comme les semis varient beaucoup, nous préférons les offrir en mélange plutôt que de tenir les variétés de graines séparées.

» *persicum*.

» *pilosum*.

» *pyrenaicum*.

» *radicatum*.

» *Rhæticum* (de la Bernina).

» *splendidissimum*.

» *strictum*.

» *strigosum*.

» *tauricum*.

» *triniaeifolium*.

Paracarium azureum.

Paradisla Liliago.

» *Liliastrum*. Lis de Saint-Bruno
facile à élever.

» *Liliastrum majus*.

Pardanthus chinensis.

Paris quadrifolia.

Parnassia alpina.

» *asarifolia*.

» *fimbriata* (ex Canada).

» *mysorensis*.

» *palustris*.

Paronychia argentea.

» *Kapellae*.

» *nivea*.

Parrotia persica.

Parrya Menziesii.

Pastinaca aureo-reticulata (à fl. panachées en échiquier).

Patrinia heterophylla.

» *palmata* (triloba).

» *rupestris*. Très belle valériane à fl. jaune vif, de grand effet et de culture facile, 5 gr. 2 fr.

» *scabiosæfolia*.

Pedicularis atrorubens.

» *cenisia*.

» *foliosa*.

» *palustris*.

» *recutita*.

» *retroflexa*.

» *tuberosa*.

Pedicularis verticillata.

Pl. semi-parasites à semer
avec du gazon

Peganum Harmala.

Pelargonium Endlicherianum.

Peltaria alliacea, 5 gr., 2 fr.

Penthorum sedoides.

Pentstemon acuminatus.

» *albus*.

» *alpinus*.

» *antirrhinoides*.

» *arizonicus*.

» *atropurpureus*.

» *Bradbury*.

» *Bridgesi*.

» *cæruleus*.

» *carinatus*.

» *Cobœa*.

» *confertiflora*.

» *confertus*.

» *cyananthus*.

» *diffusus* (ex Canada).

» » (Floraire), 10 gr. 3 fr.

» *digitalis*. Excellente pour la fl. coupée; fl. blanc opalin, 10 gr. 3 fr.

» *gentianoides*.

» *glaber*, 5 gr. 3 fr.

» *glaucus*, 5 gr. 2 fr.

» *Gordoni splendens*.

» *gracile*.

» *gracilentus*.

» *heterophyllus*.

» *humilis*, jolie pl. alpine aux fl. d'un bleu de Gentiane, 1 g. 1 fr.

» *hybridus hortensis* (les meilleures variétés des jardins; excellentes pl. de décoration).

» *Jamesi*, 1 g. 1 fr.

Pentstemon lævigatus, 10 gr. 3 fr.,
fl. blanc lilacé.

» *latifolius*.

» *linarioides*, 1 gr. 1 fr.

» *Menziesii*.

» » type canadian, bas et rampant (ex Canada).

» *Murrayanus grandiflorus*.

» *ovatus*, 5 gr. 2 fr.

» *procerus*.

» *pubescens*, 5 gr. 2 fr.

Fl. très nombreuses, de teinte opale se succédant tout l'été, excellent pour la fleur coupée.

» *puniceus*.

» *pygmaeus*.

» *rubricaulis*.

» *scouleri* 1 gr. 1 fr.

» *speciosus*.

Pentstemon spectabilis.

- » *venustus*, 5 gr. 2 fr.
- » *virgatus*.
- » *Watsoni*.
- » *Wrightii*.

Les *Pentstemon* sont les *Digitalis* de l'Amérique du Nord; ce sont de bonnes pl. vivaces de plates-bandes ou de rochers qui fleurissent longtemps et sont très ornementales. On ne saurait trop en vanter la rusticité et la longue floraison; leurs fl. sont d'entre les meilleures pour les bouquets. Il en est dont les teintes bleu d'azur rappellent les *gentianes* des Alpes.

*Pericome caudata.**Petalostemon candidus.*

- » *tenuifolius*.

Petasites albus.

- » *niveus*.
- » *palmaris* (Canada).

*Petrocoptis Lagascæ.**Peucedanum angustifolium.*

- » *Austriacum*.

Phaca alpina, 5 gr. 2 fr.

- » *astragalina* (*Astragalus alpinus*), 5 gr. 3 fr.

*Phacelia tanacetifolia.**Phleum alpinum.**Phlomis alpina.*

- » *Samia*.
- » *tuberosa*.

Phlox acuminata.

- » *decussata*, les meilleures variétés des jardins en mélange; 10 gr. 2 fr.
- » *Douglasi*.
- » *fruticosa*.
- » *maculata*.

Phygелиus capensis, 5 gr. 4 fr. Curieuse pl. vivace à fl. rouge cocciné.*Physalis alkekengi* (Akékenge ou Coqueret), 5 g. 1 fr.

- » *Franchetti*.

*Physochlaina orientalis.**Physostegia virginiana*, 10 gr. 2 fr.

Très jolie pl. vivace avec de longs épis de fl. d'un rose tendre; juillet-octobre.

- » à fl. blanches.

Phyteuma austriaca.

- » *betoniæfolium*.
- » *canescens*, 5 gr. 2 fr.
- » *carestia*, 5 gr. 2 fr.

Phyteuma charmeli.

- » *comosum*.
- » *corniculatum*.
- » *globulariæfolium*.
- » *hemisphæricum*, 1 gr. 1 fr.
- » *humile*.
- » *nigrum*.
- » *orbiculare*, 2 gr. 1 fr.
- » *pauciflorum*.
- » *repandum*.
- » *Scheuchzeri*.
- » *Scorzonerifolium*.
- » *serratum*.
- » *Sieberi*.
- » *spicatum*, 5 gr. 3 fr., pl. d'ombre.

Pinguicula alpina.

- » *grandiflora*.
- » *longifolia*.
- » *Reuteri*.
- » *vulgaris*.

Pinus Cembro (Arolle).*Plagius ageratifolius.**Plantago alpina.*

- » *argenta*.
- » *asiatica*.
- » *Cynops*, à semer en terrains arides, 10 gr. 2 fr.
- » *montana*.

Platycodon grandiflorum. (Campanule à grande fleur), 10 gr. 2 fr.

- » à fl. blanches.
- 10 gr. 5 fr.
- » à fl. doubles.
- » *Mariesi*, 10 gr. 2 fr.
- » à fl. blanch., 10 g. 2 f.
- » *grandiflora*.

Ce sont les superbes campanules japonaises, aux grandes fl. fraîchement découpées et vivement colorées en bleu intense, blanc, opale ou azur. Très rustiques, très florifères (juillet-octobre), ce sont des pl. de grand effet et de premier ordre pour la décoration des platebandes et rochers.

Podophyllum Emodi.

- » *peltatum*.

*Poincianna Gillesii.**Polemonium cœruleum*, 10 gr. 2 fr.

Pl. mellifère, éminemment propre à orner un jardin; fl. bleues très odorantes et se succédant sur la pl. de juin à septembre.

- » *cœruleum album*, 10 g. 2 fr.
- » *Berninæ*.

Polemonium filicinum.

- » flavum.
- » flavo-cœruleum.
- » foliosissimum.
- » grandiflorum.
- » humile.
- » Himalayense.
- » molle.
- » pauciflorum.
- » pulchellum.
- » reptans.
- » Richardsoni.
- » scapulorum.
- » Tanguticum.

Les Polémoines sont d'admirables pl. viv., formant de jolies touffes d'une verd. fine et gaie, et portant de beaux panicules de fl. bleues, blanches ou jaunes odorantes.

Polygala anatolica.**Polygala chamæbuxus, 5 gr. 4 fr.**

- » Varedæ.

Polygonatum giganteum.

- » multiflorum.
- » verticillatum.
- » vulgare.

Polygonum alpinum.

- » amplexicaule.
- » Baldschuanicum, 10 gr. 3 fr.
- » Bistorta, 10 gr. 4 fr.
- » » v. angustifolia.

- » Brunonis.
- » capitatum.
- » Emodi.
- » sphaerostachyum.
- » ussuriense.
- » viviparum.
- » Weyriscii.

Potentilla adjarica.

- » alchemilloides.
- » alpestris.
- » ambigua.
- » argentea.
- » argyrophylla.
- » atrosanguinea, 5 gr. 2 fr.

Fl. d'un rouge sanguin foncé; pl. décorative et bonne pour fl. coupées.

- » aurea.
- » Baldensis.
- » bifurca.
- » caucasica.
- » caulescens.
- » chinensis.
- » chrysantha, 10 gr. 4 fr.

Jolie fl. jaune clair.

- » Clusiana.

Potentilla crinita.

- » delphinensis.
- » Engadinensis.
- » Fenzlii.
- » fragiformis.
- » Friedrichseni.
- » frigida.
- » fruticosa (*Potentille en arbre*).
- » fulgens.
- » glandulosa.
- » gracilis.
- » grandiflora.
- » Hippiana.
- » Hookeriana.
- » Hortensis (var. hortic. mélang.).
- » incanescens.
- » Kurdica.
- » Langeana (ex Groënland).
- » Laponica.
- » Leopolina.
- » Levieri.
- » montenegrina.
- » mooniana.
- » multifida.
- » Nepalensis, 5 gr. 2 fr.

Superbe esp. à fl. rose tendre veinées de carmin.

- » nitida.
- » nivalis.
- » nivea.
- » pedemontana.
- » peduncularis.
- » petiolulata.
- » pulcherrima.
- » pyrenaica.
- » Ranunculus (ex Groënland).
- » recta.
- » rupestris (fl. blanch.), 2 gr. 2 fr.
- » Salesowiana.
- » sanguisorbæfolia.
- » Saxifraga.
- » sibbaldi.
- » speciosa.
- » » discolor.
- » tanacetifolia.
- » taurica.
- » Tormentilla.
- » Transcaspiensis.
- » tridentata.
- » tuberosa.
- » Vahli (ex Groënland).
- » valderia.
- » viscosa.
- » Visiani.
- » Willmottiana.

Pratia angulata.**Prenanthes purpurea.**

Primula acaulis.

- » » var. à fl. bleu foncé.
 - » » var. orientalis.
 - » admontensis.
 - » algida.
 - » Allionii.
 - » angustidens.
 - » Arctotis.
 - » Auricula (type alpin). 5 g. 4 f.
 - » » var. horticoles.
 - » » marginata.
 - » » pallida.
 - » auriculata.
 - » Balbisii.
 - » Beesiana.
 - » bella.
 - » Belunensis.
 - » Berninæ.
 - » Bulleyana.
 - » capitata (vrai, bleu foncé).
 - » capitellata.
 - » carniolica.
 - » carpathica.
 - » cashmeriana.
 - » » à fl. blanches.
 - » » grandiflora.
 - » ciliata.
 - » Cockburniana.
 - » commutata.
 - » cortusoides.
 - » Cottia.
 - » crenata.
 - » darialica.
 - » decipiens.
 - » denticulata.
 - » » var. à fl. blanches.
 - » discolor.
 - » elatior.
 - » farinosa.
 - » floribunda (non rust. chez nous).
 - » Forbesi.
 - » Forresti.
 - » Freynii.
 - » frondosa.
 - » glaucescens (calycina).
 - » grandis.
 - » Heucherifolia (Gagnepainii).
 - » hirsuta (très belle esp. à fl. carmin), 5 gr. 4 fr.
 - » integrifolia.
 - » intricata.
 - » Isabellina.
 - » japonica, 2 gr. 2 fr.
- L'une des plus robustes, les hampes florales portent plusieurs étages de fl. du carmin le plus vif. Elle aime l'humidité.
- » japonica à fl. blanches.

Primula japonica à fl. pourpre foncé.

- » » picta.
 - » Juliae.
 - » kewensis.
 - » latifolia (graveolens).
 - » leucophylla.
 - » Lishangiensis.
 - » Littoniana.
 - » longiflora.
 - » luteola.
 - » macrocalyx.
 - » magellanica.
 - » malacoides.
 - » marginata.
 - » megasæfolia.
 - » mollis.
 - » monacensis.
 - » muscarioides.
 - » obovata.
 - » officinalis.
 - » patens.
 - » pedemontana.
 - » Poissoni.
 - » Portæ.
 - » pseudo-Sikkimensis.
 - » pubescens.
 - » pulverulenta, 5 gr. 4 fr., 2 gr. 2 fr.
 - » rosea, 1 gr. 1 fr. 50.
- Du rose le plus vif qui se puisse rêver.
- » rosea grandiflora.
 - » saxatilis.
 - » scottica.
 - » Sieboldi.
 - » Sikkimensis.
 - » spectabilis.
 - » suaveolens.
 - » variabilis (var. anglaises), mélange.
 - » superbe, 5 gr. 2 fr.
 - » Veitchi.
 - » venusta.
 - » veris (les meilleures var. anglaises), 5 gr. 2 fr.
 - » » à fl. bleues.
 - » verticillata.
 - » villosa.
 - » viscosa, 5 gr. 4 fr. (*P. hirsuta*)
- La jolie Primevère carmin des Alpes granitiques.
- » viscosa alba.
 - » hybrida.
 - » vittata.
 - » Warei.
 - » Wulfeniana.
- Prunella alba.*
- » grandiflora ; 5 gr. 3 fr.

- runella grandiflora purpurea.*
 » *incisa rubra*, couleur rouge.
 » *laciniata*, 5 gr. 3 fr.; superbe.
runus prostrata.
soralea bitumimosa.
 » *macrostachya.*
terocephalus (scabiosa) Parnassi.
ulmonaria rubra.
utoria calabrica.
ycnanthemum lanceolatum.
ythrum achillæfolium.
 » *argenteum.*
 » *corymbosum.*
 » *densum.*
 » *macrophyllum.*
 » *roseum.*
 » *sericeum.*
 » *Tschihatscheffi.*
yrus nigra (Petit arbuste de rocaille
 à feuillage rougissant l'au-
 tomne), 10 gr. 2 fr.
amondia pyrenaica.
 » » *rosea.*
 » *serbica.*
anunculus aconitifolius, 10 gr. 2 fr.
 Excellent pour les lieux frais
 et ombragés.
 » *alpestris.*
 » *amplexicaulis.*
 » *anemonoides.*
 » *Baldshuanensis.*
 » *bilobus.*
 » *caucasicus.*
 » *Constantinopolitanus.*
 » *crenatus.*
 » *creticus.*
 » *glacialis*, 1 gr. 1 fr.
 » *graminæus*, 5 gr. 2 fr.
 » *hybridus.*
 » *Illyricus.*
 » *Lyalli* (ex Nov. Zéland.).
 » *millæfoliatus.*
 » *monspessulanus.*
 » *montanus.*
 » *orthorhynchus* (ex Canada).
 » *parnassifolius*, 2 gr. 1 fr.
 » *platanifolius.*
 » *pygmaeus.*
 » *pyrenæus*, 5 gr. 2 fr.
 » *rutæfolius.*
 » *Seguieri.*
 » *serbicus.*
 » *Thora*, 5 gr. 2 fr.
ehmania angulata.
eseda complicata.
 » *fruticulosa.*
 » *virgata.*
hamnus pumila.
- Rhaponticum cinarioides*, 10 gr. 2 fr.
 » *Heleniifolium*, 10 gr. 2 fr.
 » *pulchrum.*
Rhazia orientalis.
Rheum caspicum.
 » *Collinianum.*
 » *corallinum.*
 » *Emodi.*
 » *officinale.*
 » *palmatum.*
 » *tataricum.*
 » *Wilsonianum.*
Rhodiola linifolia.
 » *rubra.*
 » *rosea (Sedum Rhodolia).*
Rhododendron chamæcistus.
 » *ferrugineum (La Rose des Alpes)*
 » *ferrugineum à fl. blanches.*
 » *hirsutum.*
 » *intermedium.*
 » *Kamtschaticum.*
 » *lapponicum* (ex Groënland).
 » *myrtifolium.*
Rodgersia æsculifolia.
 » *tabularis.*
Rodhea japonica.
Romanzoffia Sitchensis.
Romneya Coulteri.
Roripa pyrenaica.
Rosa alpina (Eglantine des Alpes).
 10 gr. 1 fr.
 » *Fortunei.*
 » *dumetorum*, 10 gr. 1 fr.
 » *microcarpa.*
 » *multiflora*, 10 gr. 1 fr.
 » *pimpinellifolia (Eglantine blan-*
che des Alpes), 10 gr. 1 fr.
 » *rugosa*, 10 gr. 1 fr.
 » *rubiginosa* (Sweet bryar), 10 gr.
 1 fr.
Rosmarinus officinalis.
 » *prostratus.*
Rubia peregrina.
Rubus arcticus.
 » *chamæmorus* (Norwège).
 » *laciniatus.*
 » *leucodermis.*
 » *saxatilis.*
Rudbeckia ampla.
 » *bicolor.*
 » *californica*, 10 gr. 2 fr.
 » *conspicua*, 10 gr. 2 fr.
 » *flava*, 10 gr. 2 fr.
 » *fulgida*, 10 gr. 2 fr.
 » » *vass.*, 10 gr. 2 fr.
 » *hirta*, 10 gr. 2 fr.
 » » *var. hungarica*, pl. natu-
 ralisée en Hongrie.

Rudbeckia intermedia, 10 gr. 3 fr.

» laciniata, 10 gr. 2 fr.

» Neumanni.

» nitida.

» » *Autumn glory.*

» occidentalis.

» purpurea, 10 gr. 2 fr.

» » grandiflora, 10 gr.
3 fr. Excellente pour la fl.
coupée.

» purpurea nana.

» » splendens, 10 gr. 3 fr.

» pinnata.

» subtomentosa.

Les Roubeckes sont d'entre
les meilleures et les plus pré-
cieuses des pl. vivaces ; leurs
fleurs, très apparentes, en ca-
pitules jaune et noir chez la
plupart, rouge sombre ou car-
min chez intermedia purpu-
rea, durent longtemps et sont
excellentes pour la fleur cou-
pée. Culture des plus facile.

Ruellia ciliosa.

Rumex alpinus.

» flexuosus (feuillage brun foncé).

» hydrolapathum.

» venosus.

Ruscus aculeatus.

» racemosus.

Ruta angustifolia.

» graveolens, 10 gr. 1 fr.

» patavina.

Sagina Linnæi.

» subulata.

Salix reticulata.

» retusa.

Salvia æthiopis.

» argentea.

» azurea, 2 gr. 1 fr.

» » grandiflora, 2 gr. 1 fr. 50.

» » » alba.

» Bertoloni.

» candelabrum.

» cypria.

» exigua.

» globosa.

» glutinosa (sauge à fl. jaunes).

» Horminum (bractées colorées).

» mellifera.

» officinalis.

» » major.

» » à fl. blanches.

» pratensis.

» » à fl. blanches.

» » à fl. roses.

» » bicolor.

Salvia ringens.

» scabiosæfolia.

» Sclarea.

» verbascifolia.

» verticillata alba.

Samolus Valerandi.

Sanguinaria canadensis.

Sanguisorba canadensis.

» Vallistellinæ.

Sanicula europæa.

» Marylandica.

Santolina chamæcyparissus.

» pectinata.

» rosmarinifolia.

Saponaria bellidifolia (à fl. jaunes)
5 gr. 2 fr.

» cæspitosa.

» glutinosa.

» lutea, 5 gr. 4 fr.

» ocymoides, 5 gr. 2 fr.

» » v. splendens.

Le sap. ocym. est l'une de
meilleures des pl. de rocailles
elle croît au soleil, retombe gra-
cieusement et se recouvre, en
mai-juillet, de nombreuses f.
roses.

» officinalis.

» pulvinaris.

Sarcocapnos speciosa (*Corydale* à
roses).

Sarothamnus scoparius.

Sarracenia purpurea.

Satureya diffusa.

» intermedia.

» montana, l'une des meilleur
pl. pour garnir les lieux se-
et stériles (mellifère), 10 g
2 fr.

» pygmæa.

» repanda.

Saussurea albescens.

» alpina.

» decurrens.

» depressa.

» discolor.

» pymæa.

Saxifraga aizoides, 5 gr. 3 fr.

» » var. atrorubens

» Aizoon, 5 gr. 3 fr.

» » à fl. rose vif.

» ajugæfolia.

» Alberti.

» Allionii, tapissante et très-
basse.

» altissima.

» ambigua.

» anceps.

Saxifraga androsacea.

- » *aphylla.*
- » *apiculata.*
- » *aquatica.*
- » *arachnoidea.*
- » *aretioides.*
- » *aspera.*
- » *atropurpurea.*
- » *augustana.*
- » *australis.*
- » *Bertoloni.*
- » *biflora.*
- » *blepharophylla.*
- » *Boryi.*
- » » *major.*
- » *brevifolia.*
- » *bronchialis.*
- » *Brunoniana.*
- » *bryoides.*
- » *bulbifera.*
- » *Burseriana.*
- » *cæsia.*
- » *cæspitosa*, 5 gr. 4 fr.
- » *californica.*
- » *Camposii.*
- » *canaliculata.*
- » *capitata.*
- » *carinthiaca.*
- » *carniolica.*
- » *carpathica.*
- » *cartilaginea.*
- » *catalaunica.*
- » *ceratophylla.*
- » *cernua.*
- » *cervicornis.*
- » *chrysoplenifolia.*
- » *circuenta.*
- » *cochlearis*, 5 gr. 4 fr.
- » *coniferæe.*
- » *controversa.*
- » *coriophylla.*
- » *Cotyledon.*
- » *Cotyledon* × *aizoon.*
- » *Cotyledon angustifolia.*
- » *crustata.*
- » » *major.*
- » *cuneata.*
- » *cuneifolia.*
- » *Cymbalaria* (annuel à fl. jaunes).
- » *cymosa.*
- » *decipiens*, 1 gr. 1 fr. 50.
- » *demissa.*
- » *diapensioides.*
- » *diversifolia.*
- » *elatior.*
- » *erosa.*
- » *exarata.*
- » *Facchini.*

Saxifraga Ferdinand-Coburgi.

- » *flagellaris.*
- » *flavescens.*
- » *florulenta.*
- » *Forbesi.*
- » *Fortunei.*
- » *Friedrich-Augusti.*
- » *Gaudini.*
- » *gemmaifera.*
- » *geranioides.*
- » *Geum*, 5 gr. 3 fr.
- » *Gibraltarica.*
- » *globulifera.*
- » *gracilis.*
- » *granulata.*
- » » × *decipiens.*
- » *Grisebachii.*
- » *Guilford seedling.*
- » *Hausmanni.*
- » *hederacea.*
- » *Hedræantha.*
- » *heucherifolia.*
- » *Hieracifolia.*
- » *Hirculus*, 1 gr. 1 fr. 50.
- » » *var. grandiflora.*
- » *Hostei.*
- » *Hueti.*
- » *hypnoides.*
- » *intacta.*
- » *intricata.*
- » *Iratiana.*
- » *irrigua.*
- » *Islandica.*
- » *juniperina.*
- » *Kinlayi.*
- » *Kolenatiana.*
- » *Labradorica.*
- » *lævis.*
- » *Lantoskana.*
- » *lasiophylla.*
- » *latepetiolata.*
- » *leucanthemifolia.*
- » *lingulata* (vrai).
- » *longifolia* (vrai), 5 gr. 6 fr.,
1 gr. 1 fr. 50.
- » *longifolia* × *pyramidalis.*
- » » × *cochlearis.*
- » » *multicaulis.*
- » *luteo-purpurea.*
- » *luteo-viridis.*
- » *Mac Nabiana.*
- » *madeirensis.*
- » *mædia* (*calyciflora*).
- » *mandschouriensis.*
- » *marginata.*
- » *Mertensiana.*
- » *micrantha.*
- » *micranthidifolia.*

Saxifraga moschata.

- » muretti.
- » murithii (Mont-Cenis).
- » muscoides.
- » » atrorubens.
- » mutata (fl. orangé), 5 gr. 4 fr.
- » nervosa.
- » nivalis.
- » Nutkana (Canada).
- » oppositifolia, 1 gr. 1 fr. 50.
- » » grandiflora.
- » patens (cæsia \times mutata).
- » pectinata.
- » pedata.
- » pedatifida.
- » pedemontana.
- » peltata.
- » pennsylvanica.
- » pentadactylis.
- » pentaphylla.
- » petræa.
- » planifolia.
- » polyphylla.
- » porophylla.
- » Portæ.
- » primuloides.
- » Probyni.
- » Prostii.
- » pseudo-Kotschy.
- » pseudo-sancta.
- » pubescens.
- » pulchella.
- » punctata.
- » purpurescens.
- » pyramidalis.
- » pyrenaica.
- » ranuncifolia (ex Canada).
- » recta.
- » retusa.
- » rhætica.
- » Rhei superba.
- » rivularis.
- » Rocheliana.
- » rosularis.
- » rotundifolia.
- » Salomoni.
- » sancta.
- » sarmentosa.
- » scardica.
- » Seguiéri.
- » serratifolia.
- » sibirica.
- » Siebthorpi.
- » splendens.
- » sponhemica.
- » squarrosa.
- » Stabiana.
- » stellaris.

Saxifraga stenoglossa.

- » stenopetala.
- » Sternbergi.
- » sturmiana.
- » supraaizoides.
- » Tellimoides.
- » tenella.
- » Thessalica.
- » Tolmæi (ex Canada).
- » Tombeanensis.
- » tricuspidata (ex Groënland).
- » trifida.
- » umbrosa, 5-gr. 3 fr.
- » Valdensis.
- » varians.
- » villosa.
- » virginienensis (ex Canada).
- » Vochinensis.
- » Wettsteini.
- » Willkommiana.
- » Zelebori.
- » Zimeterii.

Germent avec facilité, mais, à cause de l'extrême ténuité de leurs graines, il faut soigner les semis et ne pas arroser trop fort. Il est bon de ne pas recouvrir les gr. et de semer à la surface du sol.

Scabiosa agrestis.

- » » alba.
- » amoena.
- » argentea.
- » caucasica.
- » » perfecta.
- » » à fl. blanches.
- » » alba grandiflora.
- » cretica.
- » graminifolia, 5 gr. 2 fr.
- » japonica (Japon).
- » Lagodechiana.
- » lucida.
- » » à fl. blanches.
- » lyratifolia (fl. grenat vif).
- » ochroleuca.
- » Olgae, 2 gr. 1 fr.
- » petræa.
- » songarica.
- » suaveolens.
- » talishensis.
- » Wulfeni.

Schivereckia Bornmülleri.

- » podolica.

*Scopolia carniolica.**Scorodonia foetida.**Scorzonera austriaca.*

- » rosea.

Scrophularia alata.

Scrophularia Hoppii.

- » juratense.
- » Marylandica.
- » pyrenaica.
- » vernalis.

Scutellaria alpina.

- » à fl. blanches.

La Scut. alp. est une excell.
pl. traînante à fl. bleu lilas et
blanc chez le type, très robuste
et florifère.

- » altissima.
- » Baikalensis. Superbe pl. à gran-
des fl. bleues.
- » macrantha.
- » orientale.
- » tuberosa.

Sedum acre.

- » acutifolium (Orient).
- » aizoon.
- » albescens.
- » albidum.
- » album.
- » alsinæfolium.
- » altissimum.
- » anacampseros.
- » anopetalum.
- » asiaticum.
- » atratum.
- » atropurpureum.
- » Beyrichianum.
- » Brownei.
- » carpathicum.
- » corsicum.
- » cruciatum.
- » dasiphyllum.
- » divergens.
- » Douglasi.
- » elegans.
- » Euphorbioides.
- » Ewersii.
- » fabaria.
- » Forsterianum.
- » gemmi ferum.
- » glaucum.
- » Hispanicum.
- » kamtschaticum.
- » Kirilowi.
- » Lageri.
- » Littoreum.
- » Lydium.
- » maximowiczii.
- » maximum.
- » nicaense.
- » obtusatum.
- » olympicum.
- » oppositifolium.
- » oreganum.

Sedum pallidum.

- » pilosum.
- » populifolium
- » Pottsii.
- » pruinatum.
- » pulchellum.
- » purpurescens.
- » reflexum.
- » Rhodantum.
- » rigidum.
- » rubens.
- » rubicaule (Tessin).
- » serotinum.
- » Sempervivum (Cotyled. Semp).
- » sexifidum.
- » spathulifolium.
- » spectabile.
- » » splendens.
- » spurium.
- » StahlII.
- » stenopetalum
- » stoloniferum.
- » telephium.
- » turgidum.
- » villosum.
- » wallichianum.

Selliera radicans (Goodenia radicans).**Sempervivum acuminatum.**

- » alpinum.
- » anomalum.
- » arachnoideum.
- » arvernense.
- » assimile.
- » atroviolaceum.
- » boutignanum.
- » Braunii.
- » bungeanum.
- » Christii.
- » ciliosum.
- » cinarescens.
- » comoli.
- » debile.
- » dolimiticum.
- » Fauconnetti.
- » fimbriatum.
- » flagelliforme.
- » Fontanae.
- » gaudini.
- » glaucum.
- » globiferum.
- » Haussmanni.
- » heuffeli.
- » hirtum.
- » Juratense.
- » Kapaornikense.
- » Lamottei.
- » leucanthum.
- » mettenianum.

Sempervivum montanum.

- » Morelianum.
- » parvulum.
- » patens.
- » Pittonii.
- » pomelii.
- » pyrenaicum.
- » Reginæ-Amaliæ.
- » Requièni.
- » robustum.
- » rubicundum.
- » rupicolum.
- » spinulifolium.
- » tectorum.
- » tenellum.
- » Theobaldi.
- » Thomayeri.
- » tomentosum.
- » triste.
- » Valesiacum.
- » veninensis.
- » Verloti.
- » Wulfeni.
- » Zelebori.
- » diverses espèces en mélange.

Senecillis carpathica.**Senecio abrotanifolius.**

- » adonidifolius.
- » ætnensis.
- » alpinus.
- » aurantiacus (*Cineraria aurant.*).
- » carniolicus.
- » clivorum.
- » cordatus.
- » coriaceus.
- » Correvonianus.
- » doronicum, 10 gr. 5 fr.

C'est le beau « *Soleil d'or* » des Alpes, à capitules orange : pl. très brillante et aimant le soleil et la rocaille.

- » Fendleri.
- » Fuchsii, 5 g. 2 fr., p^r ombre
- » incanus, 1 gr. 1 fr. 50.
- » jacquinianus.
- » Ligularia.
- » macrophyllus.
- » nebrodensis.
- » palmatifidus.
- » pseudo-Arnica.
- » pulcher.
- » quinquæligulatus.
- » sarracenicus, 10 gr. 5 fr., pour l'ombre.
- » stenocephalus.
- » Tanguticus.
- » thapsoides.
- » tyrolense.

Senecio uniflorus.

- » Veitchianus.
- » Wilsonianus.
- Serratula monticola.
- » nudicaulis.
- » radiata.
- » Vulpii.
- Seseli cæspitosa.
- » gummifer.
- Sibbaldia maxima.
- Sibbaldia parviflora.
- » procumbens.
- Sidalcea candida.
- » malvæflora.
- Sideritis condensata.
- » Eubæa.
- » hyssopifolia.
- Silene acaulis, 5 gr. 4 fr. ; 1 gr. 1 fr.
- » à fl. blanches.
- » grandiflora.
- » alpestris.
- » alpina.
- » asterias (fl. en capitules, d'un rouge ardent), 10 gr. 2 fr.
- » asterias grandiflora.
- » auriculata.
- » biflora.
- » bryoides, 5 gr. 4 fr. ; 1 gr. 1 fr.
- » ciliata.
- » cordifolia.
- » Correvoniana.
- » dinarica.
- » Drummondii.
- » Elisabethæ.
- » elongata.
- » exscapa, 1 gr. 1 fr.
- » fimbriata.
- » flavescens.
- » Fortunei, 5 gr. 2 fr.
- » Ressemble à l'œillet superbe.
- » fruticulosa.
- » galatea.
- » Græfferi.
- » Legionensis.
- » Lerchenfeldiana.
- » maritima.
- » melandriflora.
- » mollissima.
- » monachorum.
- » nutans.
- » odontopetala.
- » oreades.
- » Otita.
- » Parnassi.
- » petræa.
- » pumilio.
- » pusilla.
- » quadrifida.

Silene reichenbachiana.
 » *rupestris.*
 » *rupicola.*
 » *saxifraga*, 5 gr. 2 fr.
 » *Schafta*, 5 gr. 2 fr.
 L'une des rares pl. saxatiles
 d'automne ; fl. d'un carmin vif,
 cult. facile.
 » *Tatarica.*
 » *Tomasiniana.*
 » *tridensata.*
 » *valesia.*
 » *Veselowskyi.*
 » *Zawadsky*, 10 gr. 2 fr.
Silphium lanceolatum.
 » *terebinthinaceum.*
Sissimbrium strictissimum.
Sissyrinchium anceps.
 » *Bermudianum.*
Smilacina amplexicaulis (Canada).
 » *racemosa.*
 » *californicum.*
 » *stellata.*
Smilax aspera.
Sobolewsia clavata.
Solanum calophyllum.
 » *Rantonnetii* (ex. Rep. Argent.).
Soldanella alpina.
 » *montana.*
 » *pusilla.*
Solidago alpestris.
 » *canadensis.*
 » *Drummondii.*
 » *humilis.*
 » *missouriensis.*
 » *nitida.*
 » *pallida.*
 » *puberula*, 10 gr. 4 fr.
 » *pygmæa.*
 » *reflexa.*
 » *Riddeli.*
 » *rigida*, 10 gr. 4 fr.
 » *rigidiscula*, 10 gr. 4 fr.
 » *serotina.*
 » *Shortii.*
 » *spectabilis.*
Spartium junceum, 10 gr. 2 fr. Le
 beau genêt d'or du Midi.
Sphaeralcea munroana.
Spigelia Marylandica.
Spiræa cæspitosa.
 » *filipendula.*
 » *Kamtschatica.*
 » *palmata.*
Specularia speculum (*Miroir de Vé-*
nus).
Tachys coccinea.
 » *corsica.*

» *citrina.*
 » *Strybny.*
 » *lanata.*
 » *scardica.*
Statice auriculata.
 » *coccinea.*
 » *Gmelini.*
 » *latifolia.*
 « *Limonium.*
 » *occidentalis.*
 » *sinensis.*
 » *Suworowi.*
 » *virgata.*
Statice des Canaries, non rustiques
 chez nous, mais qui constituent
 une ressource précieuse pour
 la serre froide et les appartements,
 grâce à leur perpétuelle
 floraison :
 » *arborescens* (*Statice en arbre*).
 » *brassicæformis.*
 » *fruticans* (*Statice en arbre*).
 » *hybrida.*
 » *imbricata.*
 » *macrophylla.*
 » *macroptera.*
 » *Perezii.*
 » *Perezii* × *imbricata.*
 » *puberula.*
 Ces superbes pl. s'élèvent très facilement
 de graines.
Stipa gigantea.
 » *pennata.*
Stobæa membranifolia.
 » *radula.*
Stockesia cyanea.
Streptopus amplexifolius.
 » *brevipes* (ex Canada).
 » *roseus* (ex Canada).
Stylophorum diphyllum.
 » *japonicum.*
 » *lasiocarpum.*
Styrax Japonica.
 » *Obassia.*
Suæda glauca (ex Japon).
Swertia connata.
 » *longifolia.*
 » *perennis.*
Symphandra armena.
 » *Hoffmanni.*
 » *transcaucasica.*
Symphitum Bohemicum.
 » *bulbosum.*
Synedesis aconitifolia.
Synthiris pinatifida.
 » *reniformis.*
Tamus communis.
Tanacetum macrophyllum.

Tanacetum vulgare.

Tanakæ radicans.

Telekia speciosa, 10 gr. 2 fr.

» *speciosissima* (vrai).

Telephium imperati, 10 gr. 2 fr.

Telephium orientale, 10 gr. 2 fr.

Tetragonolobus purpureus.

» *siliquosus.*

Teucrium aureum.

» *canum.*

» *Chamædrys*, 10 gr. 4 fr.

» *divaricatum.*

» *Eugenæum.*

» *flavum.*

» *lucidum.*

» *lusitanicum.*

» *massiliense* (Herbe aux pommes).

» *montanum.*

» *orientale*, à fl. très élégantes. 10 gr. 5 fr.

» *polium.*

» *pseudo-Chamædrys.*

» *pyrenaicum.*

» *Scorodonia.* Excellent pour sous-bois, 10 gr. 4 fr.

Thalictrum aquilegifolium, 10 g. 3 fr.

Le délicat Pigamont aux élégants panicules lilas.

» *adiantifolium.*

» *cornuti.*

» *Delavayi*, espèce chinoise superbe; 5 gr. 4 fr.

» *diphterocarpum* (id.), 1 g. 1 f. 50

» *dioicum.*

» *flavum.*

» *fœtidum.*

» *glaucum.*

» *macrocarpum.*

» *majus*, 10 gr. 2 fr.

» *minus.*

Jolie verdure fine et gracieuse.

» *occidentale* (ex Canada).

» *rubellum.*

» *saxatile.*

Thelesperma gracilis.

Thermopsis Fabacea.

» *lanceolata.*

» *montana.*

» *rhombifolia.*

Thladiantha dubia.

Thlaspi bellidifolia.

» *cepæfolia.*

» *Kowatzi.*

» *limosellaefolia.*

» *microstyla.*

» *montana.*

Thlaspi rotundifolia, 5 gr. 4 fr.

» *violascens.*

Thymus marchallianum.

» *serpyllum.*

Tiarella cordifolia (jolie pl. d'ombre).

» *poliphylla.*

» *purpurascens.*

Tithonia tagetiflora.

Tofieldia calyculata.

» *glacialis.*

Tofieldia glutinosa (ex Canada).

» *rubescens.*

Tolmiæa Menziesii.

Tournefortia heliotropioides.

Towsendia grandiflora.

» *Wilcoxiana.*

Trachelium coeruleum.

Tradescantia undulatifolia.

Tragopogon porrifolius.

Trautvetteria palmata (ex Canada).

Trientalis europea.

» *canadensis* (ex Canada).

Trifolium alpinum.

» *Badium.*

» *ochroleucum.*

» *pannonicum.*

» *spadiceum.*

Trillium atropurpureum.

» *californicum.*

» *cernuum.*

» *grandiflorum.*

» *Kamtschaticum.*

» *pendulum.*

Triosteum pinnatifidum.

Tritoma, voir *Kniphofia*.

Trollius albiflorus.

» *altaicus.*

» *americanus.*

» *asiaticus.*

» *aurantiacus.*

» *caltheoides.*

» *europæus*, 10 gr. 2 fr.

Le beau « Globe d'or » des reg. mont. qu'on élève et cultive facilement. Il fleurit abondamment si on lui donne un sol sain et une situation un peu fraîche. On en fait aussi de merveilleux bords d'étangs ou ruisseaux.

» *hybridus.*

» *japonicus.*

» *ledebourii.*

» *pumilus.*

» *sibiricus.*

Tropæolum poliphyllum.

» *pentaphyllum.*

Tulipa greigii, la plus belle des tulipes

» *Darwini.*

Tulipa marjoletti.
 » *Turkestinaca.*
Tunica saxifraga, 10 gr. 3 fr.
 » à fl. blanches.
Tweedia cœrulea.
Ulex europæus (ajonc), 10 gr. 2 fr.
Umbilicus pendulinus.
 » *semenovi* (v. en outre *Cotyledon*).
Uniola latifolia.
Vaccinium Myrtillus (*Myrtille*).
 » *peensylvanicum.*
 » *uliginosum.*
 » *Vitis-Idæa* (*Airelle*).
Valeriana alliariæfolia.
 » *Dioscoridis.*
 » *exaltata.*
 » *globulariæfolia.*
 » *longiflora* (merveille orientale aux fl. rouge carmin vif).
 » *macrophylla.*
 » *montana.*
 » *officinalis.*
 » *pyrenaica.*
 » *Saliunca.*
 » *sitchensis* (ex Canada).
 » *supina.*
 » *tripteris.*
Vancouveria hexandra.
Vella spinosa.
Veratrum album.
 » *californicum.*
 » *nigrum.*
Verbascum Blattaria.
 » *Hænki.*
 » *mucronatum.*
 » *Olympicum*, 5 gr. 2 fr.
 » *Phœniceum.*
 » *Songaricum.*
 » *Thapsus.*
Verbena venosa (Verveine rustique).
Vernonia altissima.
 » *Arkansana.*
 » *gigantea.*
 » *glauca.*
Veronica Allionii.
 » *alpina.*
 » *amethystina.*
 » *aphylla.*
 » *argentea.*
 » *austriaca.*
 » *Balcana.*
 » *bellidioides.*
 » *Bidwilli.*
 » *buxifolia.*
 » *carnea.*
 » *caucasica.*
 » *Chamœdrys.*

Veronica cinerea.
 » *crassifolia*, 10 gr. 3 fr.
 » Grande pl. vivace à longs épis bleu foncé.
 » *foliosa.*
 » *fruticulosa.*
 » *gentianoides.*
 » *grandis.*
 » *Hulkeana.*
 » *incana.*
 » *longifolia*, 10 gr. 3 fr. } *melli-*
 » *maritima.* » } *fères.*
 » *alba.*
 » *maxima.*
 » *malisseæfolia.*
 » *multifida.*
 » *nummularia.*
 » *officinalis.*
 » *orchidea.*
 » *oxyphilla.*
 » *paniculata*, belle plante vivace recherchée des abeilles; longs épis bleus, 10 gr. 2 fr.
 » *pectinata.*
 » *Ponæ.*
 » *prenja.*
 » *prostrata.*
 » *alba.*
 » *rupestris.*
 » *satureyoides.*
 » *saxatilis.*
 » à fl. blanches.
 » *serpyllifolia.*
 » *spicata.*
 » à fl. blanches.
 » *stenophylla.*
 » *tenuifolia.*
 » *Teucrium*, fl. bleu d'azur, mai-août, 10 gr. 3 fr.
 » *Traversi.*
 La V. *Traversi* est la meilleure et la plus rustique des véroniques en arbustes, à feuilles opposées, persistante, à fl. en grappes d'un bleu pâle; c'est l'une des meilleures décorations des jardins dans nos pays, où il est regrettable qu'elle ne soit pas plus répandue. Excellente aussi pour la fleur coupée, 10 gr. 2 fr.
 » *urticæfolia.*
Vesicaria sinuata.
 » *græta.*
 » *utriculata.* Belle esp. à fl. jaunes à planter dans les fentes de rochers, 10 gr. 3 fr.
Vicia aurantiaca.

Vicia dumetorum.

- » *fulgens.*
- » *Onobrychioides.*
- » *unijuga.*

Viola adunca (ex Canada).

- » *alpina.*
- » *altaica.*
- » *arenaria.*
- » *atlantica.*
- » *Bertolini.*
- » *biflora.*
- » *Bosniaca.*
- » *calcarata.*
- » » *à fl. blanches.*
- » » *flavescens.*
- » » *grandiflora.*
- » » *superflorens.*
- » *campestris.*
- » *canina.*
- » » *alba.*
- » » *rubra.*
- » *cenisia.*
- » *cognata.*
- » *comollia (vrai).*
- » *cornuta, 10 gr. 4 fr.*
- » » *à fl. blanches, 10 g. 4 f.*
- » » *var. perfection.*
- » » *var. à fl. roses.*
- » *declinata.*
- » *delphinantha (ex Mont Athos).*
- » *delphinifolia.*
- » *dissecta.*
- » *distans.*
- » *elatior.*
- » *Eugenia.*
- » *Florariensis (variété hybride,*
 voisine de rothomagensis et
 qui fleurit perpétuellement ;
 l'une des meill. fl. alpines).
 10 gr. 6 fr.
- » *Florar. alba.*
- » » *tricolor.*
- » *glabella (ex Canada).*
- » *gracilis.*

Viola heterophylla.

- » *Jovi.*
- » *Labradorica (ex Canada).*
- » *laisépala.*
- » *lutea.*
- » *macedonica.*
- » *multifida.*
- » *munbyana.*
- » *nuttalli (ex Canada).*
- » *oreocallis (ex Canada).*
- » *orphanides.*
- » *palustris.*
- » *Patrini.*
- » *pedatifida.*
- » *pinnata.*
- » *praemorsa (ex Canada).*
- » *prionantha.*
- » *pubescens (ex Canada).*
- » *rothomagensis.*
- » *sagittata.*
- » *sarmentosa (ex Canada).*
- » *stagnina.*
- » *sudetica.*
- » *Taygetea (ex Graecia).*
- » *Tommasiniana.*
- » *uliginosa.*
- » *Wiedemanni.*
- » *Zoyzii.*

Vittadenia triloba. Délicieuse pâquerette rose en touffe, qui fleurit perpétuellement et décore admirablement rocailles, talus et vieux murs.

*Waldstenia fragarioides.**Wahlenbergia lobelioides.*

- » *nutabunda.*
- » *saxicola.*

*Wiedemannia orientalis.**Wulfenia carinthiaca.**Xanthoceras sorbifolia, 10 gr. 1 fr.**Yucca glauca.**Zauschneria californica.**Zoyzinia absinthifolia.*

Gardening Books

Of the 19 books Mr. Correvois has published on gardening matters, more than half of them are already exhausted. The continual and pressing demand for them has decided the author to reproduce three of them in one volume which forms a complete summary of what has been already published.

This makes a big volume in-12, illustrated, of 491 pages.

Contents of the book :

Préface.

- Chap. I. — Les plantes dans les montagnes. Leur caractère particulier ; leur nature ; leurs conditions d'existence.
- » II. — Acclimatation, semis et culture des plantes de montagnes.
- » III. — Cultures spéciales. Cultures dans le sphagnum, en terrines, en baquets ; la tourbière et la moraine.
- » IV. — Les plantes silicicoles ou calcifuges.
- » V. — Les plantes saxatiles et murales ; les murs fleuris.
- » VI. — Construction des rocailles.
- » VII. — Jardins alpins et jardins botaniques alpins.
- » VIII. — Liste des plantes de montagnes cultivées dans les jardins. Leur indigénat, l'époque de leur floraison, leur description sommaire avec la culture convenant à chacune d'elles.
- » IX. — Flore. L'umbrosum ; toit fleuri ; gazons fleuris ; cultures sur radeaux.
- » X. — La fougère.
- » XI. — Les orchidées de pleine terre.
- » XII. — Cactées rustiques.
- » XIII. — Les lys.
- » XIV. — La « Florarina ».

Index alphabétique des genres du chapitre VIII.

» des chapitres X, XI, XII et XIII.

» des noms français.

Price : 10 francs (postage unpaid). To be had at Flore or by Mr. Clayforth, our English agent.

LISTE DES OUVRAGES DE M. H. CORREVEON :

Les plantes des Alpes. Genève 1885	Epuisé	
Les Fougères rustiques. Genève 1890.	»	
Les Orchidées rustiques. Genève 1893	Presque épuisé	Prix : Fr. 5 —
Le jardin de l'herboriste. Genève 1896	»	4 —
Flore coloriée de poche (1 ^{re} et 2 ^{me} éd.)	Epuisé	
Flora tascabile (1 ^{re} et 2 ^{me} éd.)	»	
Les Plantes alpines et de rocailles.	Presque épuisé	» 2 50
Les Fougères de pleine terre	»	2 50
Les Iris dans les jardins (Correvon et Massé)		
	Presque épuisé	» 4 —
Nos Cimetières (Publié par les soins de la Commission d'art public)		
Culture des plantes alpines dans le Sphagnum	»	1 —
Della cultura delle piante alpine nelle regioni secche e calde	»	1 —
Album des Orchidées de l'Europe	Epuisé	
Atlas de la Flore alpine (édité par les soins du Club alpin)	Epuisé	
Fleurs et Montagnes. Un vol. de poésies.	Presque épuisé	» 3 —
Par monts et par vaux (courses de montagnes).		
	Presque épuisé	» 6 —
Nos arbres. Un vol in-8°, richement illustré	»	7 50
La Flore alpine. Un vol. richement illustré	Epuisé	
The Alpine Flora, translated into english by Mr. E.-W. Clayforth; a superb vol. with 180 pictures of alpine pl. in watercolours. (Methuen).	»	18 —
Fleurs des champs et des bois; 100 plates representing 180 plants of the swiss mountains and fields, splen- didely painted and executed. It is one of the most beautiful books which as ever been made on the subject.	£ 1.	» 25 —
Les plantes des montagnes et des rochers (see 2 ^e page of couverture)		

The books of Mr. H. Correvon have got the « Prix d'honneur » in the National Swiss exhibitions of 1896 and 1914, and a great number of diplomes, of gold and silver medails and of distinctions.

HIVER 1915-1916

LISTE DES GRAINES

OFFERTES PAR LE

JARDIN CORREVON

(Jardin alpin d'acclimatation)

Floraire — Chêne-Bourg, GENÈVE

33^{me} CATALOGUE DE GRAINES

Seeds of alpine
and perennial plants

OFFERED BY

M. H. CORREVON

Floraire, Nursery, GENEVA

Gardening Books

Of the 19 books Mr. Correvon has published on gardening matters, more than half of them are already exhausted. The continual and pressing demand for them has decided the author to reproduce three of them in one volume which forms a complete summary of what has been already published.

This makes a big volume in-12, illustrated, of 491 pages.

LES

PLANTES DES MONTAGNES ET DES ROCHERS

FOUGÈRES et ORCHIDÉES RUSTIQUES

Leur Culture dans les Jardins

Contents of the book :

Préface.

- Chap. I. — Les plantes dans les montagnes. Leur caractère particulier; leur nature; leurs conditions d'existence.
- » II. — Acclimatation, semis et culture des plantes de montagnes.
- » III. — Cultures spéciales. Cultures dans le sphagnum, en terrines, en baquets; la tourbière et la moraine.
- » IV. — Les plantes silicicoles ou calcifuges.
- » V. — Les plantes saxatiles et murales; les murs fleuris.
- » VI. — Construction des rocailles.
- » VII. — Jardins alpins et jardins botaniques alpins.
- » VIII. — Liste des plantes de montagnes cultivées dans les jardins. Leur indigénat, l'époque de leur floraison, leur description sommaire avec la culture convenant à chacune d'elles.
- » IX. — Floraire. L'umbrosum; toit fleuri; gazons fleuris; cultures sur radeaux.
- » X. — La fougeraie.
- » XI. — Les orchidées de pleine terre.
- » XII. — Cactées rustiques.
- » XIII. — Les lys.
- » XIV. — La « Florarina ».
- Index alphabétique des genres du chapitre VIII.
- » des chapitres X, XI, XII et XIII.
- » des noms français.

Price : 10 francs (postage unpaid). To be had at Floraire.

LE JARDIN FLEURI

C'est alors que le ciel est gros de menaces et que le soleil se cache derrière de très lourds nuages que l'homme apprécie le bonheur qui réside dans l'amour de son jardin et dans le contact avec la belle nature. Plantez vos jardins et vous serez soulagés de bien des maux. Il s'agit de tout autre chose pourtant que de « garnir » d'après certaines conventions un espace donné pour qu'il produise de l'effet. Ce que l'on demande dans ce cas aux plantes c'est d'être de simples objets, de la matière à garniture, et c'est contre une telle interprétation du jardinage que les esthètes et les artistes doivent protester de toutes leurs forces.

Ce qu'il faut à l'homme de cœur c'est un jardin qui reporte son esprit et son âme au delà des réalités tristes de l'existence et vers l'idéal. Ce qu'il nous faut à tous c'est le contact avec la Nature.

Plantez vos jardins selon votre goût personnel et ne vous inquiétez pas de savoir s'il est « dans les règles établies ». Tous ceux qui ont été en Angleterre savent combien peu les Anglo-Saxons tiennent compte de ces soi-disant lois de l'architecture paysagère. Car c'est chez eux seulement qu'on voit des jardins qui sont réellement des créations dignes de ce nom.

Renonçant à l'atroce système des corbeilles taillées dans la pelouse verte, plantez des espèces vivaces en groupes artistiquement dessinés et naturellement disposés. Garnissez vos sous-bois de plantes d'ombre et plantez vos murailles d'espèces saxatiles. Mettez des fleurs partout, car il en est pour les lieux humides comme pour les endroits secs, pour les toits, pour les pentes arides, pour les bassins d'eau.

Le monde des plantes vivaces est nombreux et très varié. On peut établir des collections qui offrent des fleurs d'un bout de l'année à l'autre et dont les floraisons se succèdent sans interruption du 1^{er} janvier au 31 décembre.

On établit aussi de superbes plates-bandes de plantes à bouquets et ornementales qui offrent un intérêt considérable si l'on sait faire valoir teintes et formes en les plaçant de telle façon qu'elles établissent des contrastes entre elles.

Le jardin de Floraire a remporté plus de 60 médailles d'or et d'argent dans les expositions suisses, anglaises, belges, françaises et italiennes, et plus spécialement aux expositions nationales suisses de Genève (1896) et Berne (1914). A Berne, il a remporté trois prix d'honneur et un premier prix.

Livres d'horticulture : Des 19 volumes publiés par M. Correvo, 13 sont épuisés et introuvables à l'heure actuelle. L'auteur a donc refondu en un seul volume de près de 500 pages, les principaux sujets concernant la description et la culture des plantes vivaces, alpines et saxatiles, des Fougères, Orchidées de plein air, Lys, Iris, Cactées rustiques, etc., en un nouveau volume qu'il vient de publier en 14 chapitres. Illustrée par M. Fernand Correvo, la 1^{re} édition est déjà en partie écoulée. Les ouvrages de M. Correvo ont remporté le prix d'honneur à l'Exposition Nationale suisse à Berne ; ils avaient eu des médailles d'or et d'argent aux expositions de Genève, Paris, Gand, etc. Le dernier volume que nous présentons ici a été couronné à Paris et a reçu du Comité de la Société nationale d'horticulture de France la plus haute récompense, soit la **médaille d'Or**.

AUX JARDINIER.S

Dans l'horreur et le sang l'an terrible agonise,
Et le ciel, noir d'orage, est partout menaçant ;
L'horizon s'assombrit toujours plus, et la crise
Impose à notre esprit son problème angoissant.

La détresse et la mort sont partout sur la terre,
Où le poing du plus fort assomme les petits ;
Partout il n'est question que de meurtre et de guerre,
D'ogre altéré de sang calmant ses appétits.

Seul un domaine encor est ouvert à la joie,
Où, sous un ciel clément, plane un peu de bonheur ;
Dans le jardin fleuri tout sourit et chatoie,
Tout nous parle de vie et soulage le cœur.

Jardinier, sais-tu bien quel est ton privilège,
Saisis-tu la valeur de ton merveilleux sort ?
Quand de la mort tu vois passer l'affreux cortège,
Sens-tu que ton jardin vaut mieux qu'un monceau d'or ?

Quand tout souffre et tout meurt, la plante, elle, demeure ;
Des champs de la bataille ont surgi les épis ;
La fleur sort de la tombe où tout un peuple pleure,
Aux murs de la tranchée elle donne un tapis.

Des immondes charniers là-bas sortent les germes
De la forêt future où va se restaurer
L'âme de l'avenir ; car déjà se referment
Les gouffres monstrueux que l'obus a creusés.

Les jardins ont partout su calmer la souffrance,
Leur génie a toujours pu calmer la douleur ;
C'est là que de tout temps Dieu plaça la semence
Dont le germe fécond donne la paix du cœur.

En avant, jardinier, ne crains pas la tempête ;
Des germes de Beauté surgiront de la mort ;
Il plane en nos jardins une vertu secrète
Qui calme la tristesse et sait nous rendre forts.

Laboure avec ardeur sous les coups de l'orage.
A l'horizon déjà sonne le renouveau ;
Espère en l'avenir et lutte avec courage,
Car tu dois préparer un avenir nouveau.

Ton jardin, souviens-t'en, c'est un foyer intense
De vie et de bonheur où tout doit rester pur ;
C'est le refuge où tous retrouvent l'espérance,
C'est le seul coin du ciel où reste un peu d'azur.

LISTE DES GRAINES

OFFERTES PAR LE

JARDIN CORREVON

(Jardin alpin d'acclimatation)

Floraire — Chêne-Bourg, GENÈVE



Nous ne donnons pas ici la description des plantes parce que la plupart de nos clients possèdent le volume « Plantes de montagnes et de rochers et leur acclimatation », par H. Correvon et que, d'autre part, notre catalogue de plantes contient plusieurs de ces descriptions. Voir aux annonces.

Toutes nos semences se vendent au prix de 50 cent. le paquet.

Cette année-ci nous sommes en mesure de fournir un certain nombre d'espèces au poids, et nous indiquons leurs prix spéciaux en marge des noms.

Les personnes que le choix d'une collection embarrasse peuvent nous abandonner ce soin. Nous faisons des collections de graines à *notre choix* :

12 espèces pour	5 francs
25 » »	10 »
50 » »	20 »
100 » »	40 »

Nous préparons, sur demande, des collections de graines d'espèces propres aux usages suivants :

Rochers et jardins alpins.
Murailles fleuries.
Pentes arides.
Marécages.
Sous-bois.
Prairie alpine.
Sols calcaires.

Sols non calcaires.
Bordures.
Pl. vivaces pour plates-bandes.
Meilleures plantes pour bosquets.
Pl. mellifères pour abeilles.
Pl. médicinales.

En collections de 5 à 40 francs d'après les conditions ci-dessus.



Notice for English customers.

Orders for seeds received here at Floraire are punctually attended to, and the parcels of seeds are sent direct to England. We generally forward them as « samples » (one to 6 d. postage). In war time we send them registered for the trifling extracharge of 2 1/2 d. more. Goodsized packets of seeds are sold 6 d. each, the only difference being that in the case of rarer seeds fewer are put into the packet.

There are some seeds of which we have larger quantity and that we can offer by weight (per gramme, one gramme being the 30th part of an ounce so that 10 gr. = 1/3 oz.).

Our seeds are our own crop or have been recolted on the Alps by our own people.

We offer self made selections to : 32 sh. 0/0; 16 sh. the 50; 8 sh. the 25 & 4 sh. the dozen.

We do special collections for special exigences ; as following : Alpine Rockeries-Wallgarden — dryslopes and barrenplaces — Wettplaces-Marshes and boggardens-Underwoods — alpine and Swissmeadows-Chalk or clay soils-peat — borders and herbaceous perennials — dwarf and hedgingplants. — Beesplants (Melliferous) — medicinalplants.

Explication des Signes.

Explanation of the marks in the seedlist.

R	=	Plantes de rochers sans exigences spéciales. — Easy grown rockplants.
T	=	Tourbière. — English « moraine ».
H	=	Humidité. — Damp.
O	=	Plante d'ombre. — Shadeplant.
1/2 O	=	Mi-ombre. — Half shade.
S	=	Plante spéciale pour soleil. — Sunny wanting plant.
B	=	» à bordure. — Dwarf & creeping good for the edging of borders.
Pr	=	Propres à émailler la prairie. — Swissmeadow.
Aq	=	Plantes aquatiques. — Waterplants.
Sp	=	Culture dans le Sphagnum — Sphagnum culture or in the english « moraine ».
N	=	Nord. — To place Northside.
V	=	Plantes vivaces. — Perennial border plants.
*	=	Espèce de culture spéciale. — Special treatment ¹ .
X	=	Espèce de terre de Bruyère. — Peatplants.
^	=	Plantes délicates à protéger l'hiver. — Tenderplants.
 	=	» murales propres à semer dans les murs. — Wallplants.
≠	=	» propres à être naturalisées sur les pentes sèches et arides. — To naturalise on dry slopes and barren places.
::	=	» envahissantes. — Undergroundcreeping.
±	=	» traînantes et formant des touffes serrées. — Creeping.
÷	=	Pour sous bois. — For the Underwood.
+	=	Meilleures espèces pour longue floraison et fleur coupée. — Best sorts for cutting and the best lasting flowers.
f	=	Plantes grimpantes. — Climbing.
†	=	Arbuste pour rocailles. — Rockery shrubs.
 	=	Annuelle. — Annual.
 	=	Bisannuelle. — Biannual

N. B. — We generally mark X over the packet for the seeds which are slow germinating. Some genus (Ranunculaceae, Primulaceae, Rutaceae, etc.) are long to germinate. All our seeds are fresh and must all come up if well treated.

¹ Nous rappelons ici que le dernier volume de M. H. Correvon, *Les plantes des montagnes et des rochers*, contient toutes les instructions nécessaires pour la culture des plantes délicates ainsi que pour l'élevage des plantes alpines par semis.

GRAINES DE PLANTES

DE

Montagnes et de Rochers, d'Arbustes de Rocailles

ET DE

PLANTES VIVACES

Nous offrons quelques-unes de nos graines, celles qui sont le plus demandées et dont nous avons plus ample provision, au poids.

10 grammes (10 gr.) = $\frac{1}{3}$ once. 5 gr. = $\frac{1}{6}$ etc.

Toutes se vendent à raison de 50 centimes. 1 sh. = 1 fr. 25.

We offer all these seeds to 6^d the packets for English customers; the packets being larger than those for Continentals, this to simplify the accounts. Some, of which we have large quantities we offer to weight, the price being marked for $\frac{1}{2}$ oz = 10 gr.

Abutilon vitifolium. \wedge
 Acæna brevibracteata. R
 » Buchanani. R O \pm
 » glabra. R
 » glauca. R
 » microphylla. B \pm
 » Novae Zelandiae. \pm B
 » ovalifolia. \wedge \pm
 » sarmentosa. 10 gr. 2 sh. \wedge \pm
 » sericea. \pm

Acantholimon Armenum. ||| \pm
 » Balansae. ||| \pm
 » Fomini. ||| \pm
 » glumaceum. ||| \pm
 » graminifolium. ||| \pm
 » lepturoides. ||| \pm
 » quinquaelobum. ||| \pm
 » tenuiflorum. ||| \pm
 » venustum. ||| \pm

Acanthus mollis. 10 gr. 1 sh. V S
 » spinosus. 10 gr. 1 sh. V S

Achillea abrotanoides. \pm S
 » ageratifolia. \pm S
 » ageratum. 10 gr. 2 sh. \neq
 » atrata. ||| R
 » carpathica. R
 » Clavenæ. R |||
 » Correvoniana. R |||
 » fililoba. R
 » filipendula. V +
 » herba Rota. ||| S
 » impatiens. R
 » impunctata. ||| S

Achillea Kellereri. R

» Kernerii. R
 » ligustica. 10 gr. 4 sh. R
 » lingulata. R
 » macrophylla. 10 gr. 4 sh. O
 » mongolica. R
 » moschata. 10 gr. 10 sh. ||| S
 » nana. S *
 » Ptarmica « The Pearl ». V +
 » pyrenaica. B
 » sarracenica (new). \pm S
 » serbica. R B |||
 » sericea, belle espèce basse à fl. jaune
 vif. 10 gr. 4 sh. \neq :: +
 » sibirica. V
 » Taygetæa. R
 » tomentosa. B R S \pm
 » umbellata. R
 » Vandasii. 10 gr. 10 sh. R S
 » Wilzcecki. R S

Aconitum anthora. 10 gr. 4 sh. S R

» autumnale $\frac{1}{2}$ O V
 » barbatum. $\frac{1}{2}$ O V
 » Cammarum. $\frac{1}{2}$ O V
 » cernuum. $\frac{1}{2}$ O V
 » Columbianum. $\frac{1}{2}$ O V
 » ferox (yellow). 10 gr. 2 sh. $\frac{1}{2}$ O V
 » flavescens. $\frac{1}{2}$ O V
 » japonicum. $\frac{1}{2}$ O V
 » lycoctonum (yellowish). 10 gr. 2 sh.
 $\frac{1}{2}$ O V
 » napellus. 10 gr. 2 sh. $\frac{1}{2}$ O V
 » paniculatum. 10 gr. 4 sh. $\frac{1}{2}$ O V

Aconitum paniculatum. albus. $\frac{1}{2}$ O V
 » » roseus. $\frac{1}{2}$ O V
 » pyrenaicum $\frac{1}{2}$ O V
 » septentrionale. $\frac{1}{2}$ O V
 » variegatum. $\frac{1}{2}$ O V
 » » var. album. $\frac{1}{2}$ O V
 » *Wilsoni*, superbe esp. nouvelle et tardive. 10 gr. 4 sh. $\frac{1}{2}$ O V
Actæa alba. O ÷
 » rubra. 10 gr. 4 sh. O ÷
 » spicata. 10 gr. 2 sh. O ÷
Adenocarpus complicatus. R
Adenophora denticulata. 10 gr. 4 sh. V S
 » liliifolia. 10 gr. 4 sh. V S
 » » à fl. blanches. V S
 » polymorpha. 10 gr. 4 sh. V S
 » Potanini. 10 gr. 5 sh. V S
 » » alba. V S
 » stylosa. V S
 » verticillata (vrai). 10 gr. 6 sh V S
Adenostyles albifrons. 10 gr. 4 sh. R O ::
 » alpina. 10 gr. 4 sh. R O ÷
 » leucophylla. 5 sh. 10 gr. R S
Adlumia cirrhosa. f
Adonis apennina. S
 » pyrenaica. S
Adonis vernalis. Grande Anémone à fl. d'or; Mars-Avril, 10 gr. 2 sh.
Aethionema armenum. ||| S
 » cappadocium. ||| S
 » cardiophyllum. ||| S
 » cordatum (*Eunomia cordata*). ||| S
 » coridifolium. ||| S
 » creticum. ||| S
 » diastrophis. ||| S
 » Florariensis. ||| S
 » gracilis. ||| S
 » grandiflorum. ||| S
 » hybrida. ||| S
 » iberideum. ||| S
 » ovalifolia. ||| S
 » persicum. ||| S
 » pulchellum. ||| S
 » rotundifolium. ||| S
 » saxatile. 10 gr. 4 sh. ||| S
 » schistosum. ||| S
 » sp. Asia Minor. ||| S
 » stylosum. ||| S
 » Thomasianum. ||| S
 » trinervium. ||| S
 » Warleyensis. ||| S
Aethopappus pulcherrimus. V
Agatheia petiolata (nouveau). ||| R
Agrostemma coronaria (*coquelourde*). 10 gr. 1 sh. V
Ajuga pyramidalis. R ÷
 » genevensis. R Pr ::
 » reptans :: ≠ Pr ÷
 » » alba.
 » » rosea.

Akebia quinata.
Alchemilla alpina.
Alkana orientalis. 10 gr. 2 sh.
Allium pedemontanum. R
 » Ursinum. O ÷
 » Victoriale (Herbe à 9 chemises). R
Alsine austriaca. |||
 » Banatica. |||
 » caucasica. |||
 » cerastioides. R
 » gerardi. |||
 » hirsuta. |||
 » imbricata. |||
 » Jacquini. |||
Alsine juniperifolia. |||
 » loricifolia. ||| R
 » liniflora. R
 » pinifolia. |||
 » recurva. |||
 » Rosani. ||| R
 » stricta. T
 » tenuifolia. |||
 » verna. |||
 » villarsii. |||
Althæa rosea (Rose trémière). V
Alyssum alpestre. ||| S
 » arenarium.
 » argenteum. 10 gr. 2 sh. ≠ R S
 » calyocarpum. R
 » condensatum. R S
 » creticum. R S
 » cypriense. |||
 » gemonense. R
 » halimifolium. |||
 » leucadeum. R
 » lucidum. R
 » Moellendorffianum. |||
 » montanum. R
 » orientale. R
 » persicum. R
 » petraeum.
 » pyrenaicum. ||| 10 gr. 12 sh.
 » rostratum. R
 » saxatile. 10 gr. 1 sh. R ≠
 » » var. citrinum.
 » » var. compactum.
 » serpyllifolium. R
 » speciosum. R
 » spinosum. || R S
 » » var. roseum. |||
 » tortuosum. R
 » transylvanicum. R
 » Wiersbickii. 10 gr. 1 sh. R ≠
Alyssum Wulfenianum |||
Amelanchier vulgaris (*arbre aux Edelweiss*).
Amphycome arguta. ^ R S
Amygdalus nana. ≠
Ansonia latifolia. 10 gr. 2 sh.
Anagallis tenella T Sp
Anarrhinum bellidifolium. |||

Anchusa Barrelieri.

- » *Dropmoreana*. 10 gr. 4 sh.
- » *italica*. 10 gr. 2 sh.
- » » *var. Opale*.
- » Bonnes Bourraches vivaces de grandes dimensions, aux innombrables fl. d'un bleu intense (Mai-Octobre).
- » *sempervirens*. V

Andrachne colchica.

- Androsace albana.** * |||
- » *arachnoidea*. ||| R
 - » *Brigantiaca*. R X
 - » *carnea*. 10 gr. 14 sh. X R
 - » *chamaejasme*. 10 gr. 14 sh. R |||
 - » *Charpentieri*. |||
 - » *ciliata*. * |||
 - » *cylindrica*. * |||
 - » *foliosa*. R |||
 - » *glacialis*. 10 gr. 14 sh. * |||
 - » *Hedreantha*. 10 gr. 14 sh. |||
 - » *Helvetica*. 10 gr. 16 sh. * ||| S
 - » *hirtella*. * |||
 - » *imbricata (argentea)*. 10 gr. 16 sh. * ||| X
 - » *lactea*. R
 - » *Laggeri*. R X
 - » *lanuginosa*. 10 gr. 10 sh. R
 - » *Mathildæ*. |||
 - » *obtusifolia*. 10 gr. 10 sh. R
 - » *oculata*. 10 gr. 10 sh. R
 - » *Pacheri*. |||
 - » *primuloides*. R
 - » *sarmentosa*. ± R
 - » *saxifragæfolia*. * |
 - » *sempervivoides*. ± R
 - » *septentrionalis*. R |

Androsace villosa. R S

- » *vitaliana*. 10 gr. 8 sh. ||| R S
- » *Wulfeniana*. ||| *

Anemone albana R

- » *alpina*. 10 gr. 2 sh., 100 gr. 10 sh. R $\frac{1}{2}$ O
- » *Baikalensis*. R
- » *Baldensis*. 10 gr. 4 sh. R
- » *canadensis*. R
- » *cernua*. R
- » *decapetala*. R
- » *dichotoma*. :: R
- » *globosa*. :: R
- » *Halleri*. R X
- » *Hepatica (Hépatique)*. 10 gr. 4 sh. R B
- » » *rosea*.
- » *japonica*. V
- » *magellanica*. R
- » *montana*. 10 gr. 2 sh. R
- » *multifida*. R
- » *narcissiflora*. 10 gr. 2 sh. R
- » *nemorosa*. O ÷

Anemone nigricans. R X

- » *patens*. R
- » » *lutea*. R
- » *pennsylvanica*. 10 gr. 4 sh. ::
- » *polyantha*. R
- » *pratensis*. R X
- » *propera*. R
- » *pulsatilla*. 10 gr. 4 sh. B R S
- » » *var. alba*
- » *rivularis*. R H
- » *rubra*. 10 gr. 4 sh. R X
- » *sulfurea*. 10 gr. 2 sh., 100 gr. 10 sh. R X
- » *sylvestris*. 10 gr. 4 sh. A R
- » *trifoliata*. R
- » *Udensis*. R
- » *vernalis*. 10 gr. 8 sh. R X

Anemonopsis macrophylla. O X

Angelica Archangelica (Angélique). V

» *pyrenaica*. R

Antennaria alpina. R B

- » *carpathica*. R
- » *dioica*. R B ±
- » *magellanica*. R
- » *plantaginea*. B R ±
- » *triplinervis*. B R ±

Anthemis aetnensis. R

- » *carpathica*. R
- » *cinerea*. R
- » *Kelwayi*. R
- » *montana*. R
- » *nobilis (camomille romaine)*. R
- » *petræa*. R
- » *rigescens*. R
- » *tenuifolia*. R
- » *tinctoria*. R +

Anthericum ramosum. 10 gr. 2 sh.

Anthyllis montana. 10 gr. 4 sh. R B ≠

- » *vulneraria*. ±

Antirrhinum asarina. 10 gr. 2 sh. ||| R S

- » *gibraltarium*. ||| S
- » *glutinosum*. ||| S
- » *majus*, type sauvage.
- » » *Lightrose*. 10 gr. 4 sh.
- » *sempervirens*. |||
- » » *var. roseum*.
- » *siculum*. |||
- » *tortuosum*. |||

Aphyllanthes monspeliensis. R S

Aposeris foetida. O ÷

Aquilegia alba. V Pr R

- » » *grandiflora*.
- » *alpina*. 10 gr. 8 sh. $\frac{1}{2}$ O R
- » C'est la plus belle des Ancolies; très grande fleur d'un azur intense. Récoltée dans les Alpes.
- » *alpina superba*. 10 gr. 10 sh.
- » *arctica*. R
- » *atrata*. 10 gr. 1 sh. R Pr
- » *atropurpurea*. R

Aquilegia Benacensis (glutinosa). |||

- » bertoloni. R |||
- » burgeriana. R
- » californica. R V
- » calif. hybrida. V
- » canadensis. R
- » chrysantha. 10 gr. 2 sh.
- » cœrulea (Floraire). 10 gr. 6 sh.
- » cœrulea (récoltée dans les Montagnes Rocheuses). 10 gr. 8 sh.

L'Aq. cœrulea est l'une des plus merveilleuses d'entre les plantes de montagne.

- » cœrulea alba.
- » cœrulea candidissima.
- » Durandi. R
- » Einseleana. R
- » flabellata. Blanc pur. R
- » formosa. R
- » glandulosa. 10 gr. 8 sh. R
- » Haylodgensis. 10 gr. 4 sh.
- » » delicatissima.
- » Helenæ. R
- » hybrida, extra de Barr. + V
- » » superba, de Dod. + V
- » » Floraire. V
- » Jetschani. R
- » jucunda. R
- » lactiflora. R
- » longicalcarata. R
- » Olympica. R
- » Othonis. R
- » oxypetala. 10 gr. 6 sh. One of the best; dwarf and early flowering; an alpina with yellow centre.
- » pyrenaica. 10 gr. 8 sh.
- » Reuteri. R |||
- » rosea. 10 gr. 2 sh. R Pr
- » sibirica. R
- » skinneri. Fl. rouge et jaune. R
- » stenopetala. R
- » thalict trifolia. R
- » truncata. R
- » viridiflora (vraie). R
- » vulgaris. Pr R

Les ancolies sont d'excellentes pl. d'ornement, de culture, très facile, s'accommodant également de l'ombre et du soleil, mais préférant la mi-ombre et la fraîcheur. Leurs graines germent de suite.

Arabis albida. R

- » alpina. R
- » » nana compacta.
- » » superba.
- » arenosa. | |||
- » aubrietoides. ||| R
- » bellidifolia R H
- » bryoides. R S
- » caucasica (a yellowish alpina). R

Arabis cebennensis. R

- » cenisia. R
- » collina. R
- » Drummondii. R
- » Halleri. | R
- » hybrida. R
- » japonica. R
- » lucida. R
- » nordmanniana. R
- » ovirensis. R
- » pendula. R
- » petrogena. |||
- » procurrens. R
- » pumila. R
- » purpurascens R
- » rosea. |||
- » Soyeri. R
- » stelleri. R
- » Sturii. R
- » suecica. R

Arctostaphylos alpina. ||| N X

- » nevadensis. R
- » Uva Ursi (*Raisin d'Ours*). R $\neq \pm$

Arctotis grandis. |

Arenaria Armeriastrum. |||

- » Balearica. |||
- » biflora. |||
- » capitata. |||
- » cephalotes. |||
- » ciliata. |||
- » gracilis. |||
- » graminifolia. 10 gr. 4 sh. R Pr
- » grandiflora. 10 gr. 4 sh. R
- » gypsophiloides. ||| R
- » Kingii. |||
- » Koriniana. |||
- » Kotschyana. |||
- » lanceolata. |||
- » laricifolia. |||
- » lateriflora. |||
- » longifolia. |||
- » montana. ||| R
- » nardiflora. |||
- » norvegica. |||
- » peploides. R
- » purpurascens. |||
- » Sajenensis. R

Arenaria Saxifraga. |||

- » sericea. R
- » tetraquetra. |||
- » tridentina. |||
- » verna. R

Armeria alpina. R

- » caespitosa. ||| R
- » Halleri. R
- » majellensis. 10 gr. 2 sh. R B
- » maritima. 10 gr. 2 sh. R B
- » plantaginea. R
- » sibirica. R
- » vulgaris. B R \pm

Arnebia echinoides. **R S**
Arnica amplexicaulis. **R**
 » *chamissonis*. **R**
 » *longifolia*. **R**
 » *montana*. 10 gr. 4 sh. **T Sp R X**
Aronicum scorpioides. 10 gr. 6 sh. **R T**
Artemisia absinthium. **V**
 » *annua*. |
 » *arborea*. ^
 » *atrata*. |||
 » *austriaca*. **R ::**
 » *canadense*. **R**
 » *cærulescens*. **R**
 » *cretacea*. **R**
 » *discolor*. **R**
 » *frigida*. ||| **R**
 » *glacialis*. ||| **R**
 » *glaucæ*. :: **B**
 » *granatensis*. **R |||**
 » *lanata*. |||
 » *maritima*. |||
 » *mutellina*. 10 gr. 10 sh. **R**
 » *nana*. **R**
 » *rupestris*. **R**
 » *sacrorum*. :: ≠
 » *spicata*. 10 gr. 12 sh. ||| * **X**
 » *turkestanica*. **R**
 » *valesiaca*. ||| ≠ **X**
Asarum canadense. **O B ::**
 » *caudatum*. **O**
 » *europæum*. **O B ::**
 » *grandiflorum*. **O**
Asclepias Cornuti. **V**
 » *curassavica*. **V**
 » *incarnata*. **V**
 » *rubra*. **V**
 » *speciosa*. **V**
 » *tuberosa*. 10 gr. 4 sh. **V +**
Asparagus acutifolius. ^ **R**
 » *teruifolius*. **R S**
 » *verticillatus*. **R S**
Asperula athoa. |||
 » *azurea*. 10 gr. 2 sh. |
 » *cynanchica*. **R**
 » *galioides*. **R**
 » *odorata*. **O ::**
 » *orientalis*. **R**
 » *taurina*. **O ::**
Asphodelus albus (*Asphodèle*). 10 gr. 1 sh. ≠
 » *fistulosus*. ≠
Asphodeline Balansæ.
 » *cretica*. 10 gr. 1 sh.
 » *gigantea*.
 » *lutea*. 10 gr. 1 sh.
Aster alpinus. 10 gr. 2 sh. **R**
 » » à fl. blanches. 10 gr. 2 sh.
 » » *lapponicus*.
 » » *speciosus*.
 » *amelloides*. 10 gr. 2 sh. +
 » *Amellus*. 10 gr. 2 sh. **Pr ≠**

Aster Amellus roseus. +
 » *bessarabicus*. 10 gr. 2 sh. + **V**
 » *cordifolius*. 10 gr. 2 sh. **V**
 » *diplostehioides*. 10 gr. 6 sh. **R Br**
 » *Fremonti*. **R**
 » *himalaicus*. **R**
 » *Ibericus*. + **V**
 » » *grandiflorus*.
 » *lævis*.
 » *Porteri*. 10 gr. 2 sh. **R ≠ |||**
 » *Pseudo-Amellus*. **R +**
 » *Ptarmicoides*. **V**
 » *pumilus*. **R**
 » *pyreneus* (vrai). **R**
 » *rubellus*. +
 » *sericeus*. **R**
 » *sibiricus*. **R**
 » *sikkimensis*. **R**
 » *simplex*. **R**
 » *suffruticosus*. **R**
 » *Townsendi*. **R**
 » *trinervius*. **R**
 » *turbinellus*. **V**
Astilbe Davidi. 10 gr. 4 sh. **H**
 » Délicate panicule de fleurs roses,
 » dressée en gros épis.
 » *Japonica*. **H**
 » *rivularis*. **H**
Astragalus alopecuroides. 10 gr. 4 sh. **R**
 » *alpinus*. **R**
 » *angustifolius*. **R**
 » *aristatus*. |||
 » *cicer*. ≠ ::
 » *confirmans*. |||
 » *depressus*. **R**
 » *himalaicus*. **R**
 » *maximus*. **R**
 » *monspessulanus*. ||| **R**
 » *Onobrychis*. **R ±**
 » *reflexistipulus*. **R**
 » *sanguinolentus*. **R**
 » *vulpinus*. **R**
Astrantia bavarica. **R**
 » *Biebersteinii*. **R**
 » *carinthiaca*. **R**
 » *carniolica*. **R**
 » *gracilis*. **R**
 » *helleborifolia*. **R**
 » *major*. 10 gr. 1 sh. **H R O :: Pr**
 » Plante très montagnarde et des
 » plus facile à cultiver ; l'une des
 » meilleures pl. mellifères.
 » *major* à fl. roses.
 » *minor*. ||| **N X**
 » *neglecta*. **R**
 » *pauciflora*. ||| **N**
Astrocarpus sesamoides. **R**
Athamante cretensis. **R |||**
 » *Matthioli*. **R**
Atragene alpina. 10 gr. 2 sh. **S O**

- Atragene sibirica*. **S O**
Atraphaxis lanceolata. **R ±**
Atropa Belladonna (*Belladone*). **O**
 » » à fruits jaunes.
Aubrietia antilibani. ||| **B**
 » cilicica. ||| **B**
 » Columnæ. ||| **B**
 » deltoidea. 10 gr. 5 fr.; 5 gr. 3 fr. ||| **B**
 » D. Mules. ||| **B**
 » Eyrii. ||| **B**
 » erubescens (ex mont Athos). ||| **B**
 » græca. ||| **B**
 » Hendersonni. ||| **B**
 » Leichtlini. ||| **B**
 » libanotica. ||| **B**
 » Lilac Queen. ||| **B**
 » "Lloyd Edward". ||| **B**
 » Mauve Queen. ||| **B**
 » Moehreimi. ||| **B**
 » Olympica. ||| **B**
 » Pinardi. ||| **B**
 » purpurea. ||| **B**
 » Richardsoni. ||| **B**
 » violacea. ||| **B**

Petites Crucifères vivaces formant des tapis couverts de fl. d'un lilas plus ou moins vif suivant les espèces. Excellentes pour les murailles.

- Azalea procumbens*. 10 gr. 8 sh. **R** ||| **X**
Banfia petræa. |||
Baptisia australis. **V**
Bartsia alpina. *
Bellidiastrum Michelli. **H**
Bellis cœrulescens. 10 gr. 8 sh. ||| **R**
 » integrifolia. **R R**
 » mexicana. **R**
 » sylvestris. **R**
Bellium belliioides. |||
 » crassifolia. |||
Berardia subacaulis. **R ***
Berberis stenophylla.
 » *Wilsoni*; le plus beau du genre, nouvellement introduit de l'Asie centrale. 10 gr. 2 sh.
 » *Yunnanenense*.
Berkheya purpurea. **R**
Berteroa incana. **R ≠**
 » mutabilis. **R ≠**
Betonica alopecuroides.
 » grandiflora. 10 gr. 4 sh. **Pr R**
 » grandiflora superba. 10 gr. 4 sh. **Pr R**
 » hirsuta. 10 gr. 2 sh. **Pr R**
 » macrostachya. **Pr R**
 » officinalis. 10 gr. 2 sh. **Pr R**
 » » alba. **Pr R**
 » orientalis. **Pr R**
 » scardica. **Pr R**
 » stricta. **Pr R**
Betula nana. **T R H**

- Biscutella lævigata*. **Pr R**
 » lucida. **R**
Blitum capitatum. |||
 » virgatum (*Epinard-fraise*). 10 gr. 2 sh. |||
 Plantes très curieuses, portant comme des fraises d'un vermillon très vif, à l'aisselle des feuilles.
Borago laxiflora. **R H**
 » officinalis alba. !
 » orientalis. **O ÷**
Boykinia occidentalis. ||| **N**
 » rotundifolia. ||| **N**
Brassica repanda. ||| **R**
 » Richeri. **R**
Braya alpina. *
 » pinnatifida. *
Brickelia grandiflora. **R** (*Ageratum* à fl. jaunes).
Briza media. **Pr**
 » lutescens. **Pr**
Budleya variabilis. 10 gr. 2 sh.
 Arbuste à croissance rapide, à floraison abondante (fleurs en grappes violet et or) et qu'on élève facilement de graines.
Bulbocodium vernum. **Pr R**
Buphtalmum grandiflorum. 10 gr. 4 sh. **R**
 » salicifolium. 10 gr. 4 sh. **Pr ::**
 » speciosissimum (très rare). ||| **N**
Bupleurum falcatum. **R Pr**
 » fruticosum.
 » longifolium. **R †**
 » petræum. **R**
 » ranunculoides. **R C**
 » stellatum. **R** |||
Caesalpinia japonica. †
Caccinia glauca. 10 gr. 1 sh. **R ≠**
Calamintha acynos. **R**
 » grandiflora. **R ::**
 » Vuachensis. **R**
Calandrina compressa.
 » discolor. **^ R**
 » elegans. **^ R**
 » grandiflora. **^ R**
 » sericea. **^ R**
 » speciosa. **^ R**
 » umbellata. **^ R**
Calceolaria polyrhiza. **T H R**
Calla palustris. **Aq**
Callirhoe pedata. **R**
 » versicolor. **R**
 » verticillata. **R**
Caltha alpina. **H**
 » leptosepala. **H**
 » palustris. **H**
 » polysepala. **H**
 » radicaus. **H**
Calystegia dahurica. **f**
Camomille (v. *Anthemis nobilis*).

Campanula abietina. R O

- » acutangula. |||
- » aggregata. R
- » alaskana. R
- » alliariæfolia. V. fl. blanches décoratives. 10 gr. 2 sh. ÷÷
- » Allionii. R |||
- » alpina. R *
- » Aucheri. |||
- » barbata. 10 gr. 4 sh. R Pr
- » à fl. blanches.
- » Baumgartenii. Pr R
- » betonicæfolia. R
- » bononiensis. R
- » Burgalti. R
- » cæspitosa. 10 gr. 6 sh.
- » cantburyana. R
- » capitata. R
- » carnica. |||
- » carpathica. 10 gr. sh. B V R
- » » alba.
- » » » grandiflora.
- » » à fl. lilas clair. 10 gr. 2 sh.
- » » var. compacta. 10 gr. 2 sh.
- » » var. Ditton's blue.
- » » var. grandiflora. 10 gr. 4 sh.
- » » var. pelviformis.
- » Riverslea.

Le *C. carpathica* et ses variétés (faciles à élever de semis) sont d'excellentes pl. de rochers, de plates-bandes et de bordures; fleurissent de mai jusqu'en automne; grandes fl., violettes ou blanches; pl. basses et formant tapis.

- » caucasica. R
- » cenisia. 10 gr. 20 sh. ||| *
- » cervicaria. R X
- » collina. R ::
- » Correvoniana. |||
- » crispa. R |||
- » cristallocalyx. 10 gr. 2 sh. R
- » dahurica. Pr R
- » Elatines. ||| O
- » elatinoides. ||| O
- » eriocalix. V
- » eriocarpa. V
- » excisa. ||| *
- » Fergusoni. V
- » flexuosa. ||| S
- » fragilis. ^ |||
- » garganica. 10 gr. 10 sh. ||| R
- » glomerata. Pr R
- » » var. à fl. blanches.
- » » var. acaulis.
- » grandis. V
- » » à fl. blanches.
- » Grosseckii. R
- » Hohenackeri. R
- » Imeritina. 10 gr. 2 sh. R

Campanula incurva. R

- » Kolenatiana. 10 gr. 2 sh. R
- » lactiflora. 10 gr. 5 sh. R $\frac{1}{2}$ O ÷÷
- » lamiifolia. 10 gr. 4 sh. R
- » lanata. |||
- » latifolia. 10 gr. 4 sh. R V ÷÷
- » » à fl. blanches.
- » » alba grandiflora.
- » libanotica. R V
- » lingulata. R
- » longistyla. R
- » macrantha. 10 gr. 4 sh.
- » » à fl. blanches.
- » macrostachia. R
- » Marchesetti. R
- » macrorrhiza. |||
- » medium, type des Hautes-Alp. R |||
- » mirabilis. |||
- » multiflora. R
- » muralis (Portenschlagiana). ||| R
- » nobili-macrantha. R
- » Palasiana. R
- » papilloso-pubescens. R
- » patula. Pr |
- » pelviformis. R
- » persicifolia. 10 gr. 2 sh. V R ÷÷
- » » alba.
- » » azurea.
- » petiolata. R
- » petræa. ||| S
- » phytidocalix. R
- » pulla. ||| R
- » pulloides. R
- » punctata. R ::
- » » var. alba.
- » pusilla. 10 gr. 6 sh. ||| R
- » » var. alba.
- » » var. Willmottiana.
- » pyramidalis. 10 gr. 4 sh. ||| R
- » » alba. 10 gr. 6 sh.
- » Raddeana. R
- » Raineri (ex Alpi Bergamensis). 10 gr. 10 sh. ||| R S
- » rapunculus. Pr
- » rapunculoides. Pr
- » rhomboidalis. Pr R
- » » alba.
- » » bicolor.
- » » lilacina.
- » rotundifolia. 10 gr. 2 sh.
- » » alba.
- » rupestris. |||
- » ruthenica. R
- » Sarmatica. 10 gr. 6 sh. R
- » Saxifraga. 10 gr. 10 sh. R |||
- » Scheuchzeri. R
- » » à fl. blanches.
- » Scouleri. R
- » sibirica. R
- » speciosa. 10 gr. 8 sh. R

Campanula spicata. 10 gr. 6 sh. || R
 » stenocodon. |||
 » subpyrenaica. 10 gr. 4 sh.
 » alba.
 » thrysoidæa. 10 gr. 5 sh.
 » tomentosa. |||
 » Tommasiniana. |||
 » Trachelium. 10 gr. 2 sh. R ≠
 » à fl. bl. 10 gr. 2 sh.
 » à fl. pl. 10 gr. 4 sh.
 » turbinata. B R
 » alba.
 » tyroliensis.
 » urticifolia. 10 gr. 2 sh. ÷ R
 » Valdensis. ||| R
 » Vanneri. |||
 » velutina. |||
 » Venzloi. ||| R
 » versicolor. ||| R
 » Vidali. V
 » Waldsteiniana. ||| R
 » Wilsoni. R
 » Zoyzii. ||| *

Canarina campanula. ^
 Capparis rupestris (Caprier). |||
 Cardamine alpina. ||| *

» asarifolia. H
 » chenopodifolia. R
 » glauca. R
 » Jezoensis. R
 » macrophylla. H
 » resedifolia. |||
 » sibirica. H

Carduus acanthoides. Pr
 » aurisocus. Pr
 » defloratus. Pr
 » eriocephalus. Pr
 » nutans. Pr

Carex atrata. H
 » Baldensis. H
 » bicolor. H
 » Buchanani. H
 » flava. H
 » Grayi. H
 » nigra. H

Carlina acanthifolia. 10 gr. 4 sh. R ≠
 » acaulis. 10 gr. 4 sh. R Pr ≠

Catananche coerulea. R
 Cathcartia villosa. O X
 Cedronella triphylla. ^
 Celsia acaulis. |||
 » cilicica. |||

Centaurea alpina. R
 » axillaris. R
 » Babylonica. V
 » cyanus. 10 gr. 2 sh. |
 » dealbata. R
 » Lugdunensis. R
 » lutea. R
 » macrocephala. V

Centaurea montana. R :: O ÷
 » alba.
 » nervosa. Pr
 » orientalis. R
 » præalta. R
 » Ruthenica. R
 » uniflora. R

Centranthus angustifolius. 10 gr. ≠ R |||
 » longiflorus. V |||
 » ruber (Valér. rouge des murs). |||
 » 10 gr. 2 sh. ≠ R V
 » alba. 10 gr. 2 sh.
 » atrorubens. 10 gr. 2 sh.

Les Centranthus ou Valériane des murs sont recommandables comme pl. de haute décoration pour la garniture de plates-bandes, des grands rochers, des murailles surtout. Elles fleurissent abondamment de juin jusqu'en hiver et font un tableau merveilleux dans un paysage.

Cephalaria alpina. 10 gr. 2 sh. V
 » leucantha. V
 » uralensis. V

Grandes scabieuses jaunes aux formes architecturales.

Cerastium album. ||| R
 » argenteum. ||| R
 » Biebersteini. ||| R
 » carinthiacum. ||| R
 » chloræolium. ||| R S
 » columnæ. ||| R S
 » dahuricum. ||| R S
 » fontanum. ||| R S
 » glaciale. ||| R S
 » grandiflorum. ||| R S
 » illyricum. ||| R S
 » lanatum. ||| R S
 » Lerchenfeldianum. ||| R S
 » lineare. ||| R S
 » tomentosum. ||| R S
 » uniflorum. ||| R S
 » uralensis. ||| R S
 » villosum. ||| R S
 » vulgatum. ||| R S

Cerinth alpina. R
 » minor. R

Chænostoma polyantha. ^
 » fastigiata. ^
 » viscosa. ^

Chamæmelon caucasicum. R
 Chamæpence casabone. |||
 » diacantha. |||

Chamænerium latifolium. |||
 Cheiranthus Allionii, sorte de giroflée odorante aux fleurs du plus bel orangé, se succédant de juin à fin Novembre; pl. de grand effet.
 10 gr. 2 sh. || + R
 » Allionii grandiflorus.

Cheiranthus Cheiri. (*Giroflée des murs*). || V

» Kewensis. R

» nanus. R

Chelidonium Franchetianum. O

» laciniatum. O

» lasiocarpum. O

Chelone barbata. 10 gr. 2 sh. V +

» » hybrida.

» coloradensis.

» glabra.

» » alba.

» Lyoni. V

Chicorium Intybus. ≠ ||

» » à fl. blanches.

Chlora perfoliata. | Pr

Chrysanthemum alpinum. R *

» arcticum. R

» coronopifolium. R

» lacustre. V +

» macrophyllum. V +

» maximum. V +

» uliginosum. V

Chrysopsis foliosa. R

» villosa. R

Chrysosplenium alternifolium. ||| H N

» flagelliforme. ||| H N

» oppositifolium.

Cicuta virosa. Aq

Cimicifuga foetida. O

» racemosa. O

Cineraria aurantiaca. R

» campestris. R

» maritima. ^ R

» suaveolens. V

Circea Lutetiana O ÷ ::

Cirsium acaule ± Pr

» Eriophorum. Pr R

» Erysithales. O ÷

» ferox. ≠ R

» heretophyllum. H

» lanceolatum. Pr

» monspessulanus. H

» oleraceum. H

» spinosissimum. R H

Cistus albidus. ^ †

» corsicus. ^ †

» creticus. ^ †

» incanus. ^ †

» ladaniferus. †

» ladaniferus X villosus. †

» laurifolius. †

» monspeliensis. ^ ±

» purpureus. ^ †

» salviaefolius. †

» vaginatus (Bertolettianus). ^

Ce sont les délicieux Cistes des
garigues de la Méditerranée.

Claytonia asarifolia. H T R

» parviflora. H T R

» perfoliata. H T R

Claytonia sibirica. H T R

» virginiana. H T R

Clematis Buchanani. f

» flammula (liane de neige). f

» Fremonti. V

» graveolens (fl. jaunes). f

» integrifolia. V

» montana. f

» » var. rosea.

» recta. V R =

» recta purpurescens.

» stans. V

» Tangutica (fl. jaunes). f

» tubulosa. R

» virginiana. f

» vitalba. f

» viticella. f

Clintonia borealis. R X

» uniflora. R X

Cneorum tricoccum. ^ †

Codonopsis lanceolata. S R

» ovata. S R

» sylvestris. R

» Tanghu. R

» viridiflora. R

Collomia grandiflora. |

Colluria geoides. R

Coluteocarpus reticulatus. |

Comarum palustre. H T

Convallaria majalis (*Muguet*). ÷ ÷

Convolvulus altheoides. 10 gr. 6 sh. S R

» aureus superbus. R

» cantabricus. ± ^

» Cneorum. ^ †

» mauritanicus. ± ^

» Soidanella. 10 gr. 6 sh. R =

Coprosma tenuicaulis. † ^

Coptis trifoliata. X

Coreopsis grandiflora. 10 gr. 2 sh. V +

» lanceolata. V +

» oculata. V +

» palmata. V

» tripteris. V

Coris monspeliensis. || R ^

Cornus canadensis. ± T ::

» florida. †

» suecica. ± T ::

Coronilla cappadocica. 10 gr. 2 sh.

» coronata. †

» emeroides. †

» Emerus. †

» glauca. † ^

» montana. 10 gr. 2 sh. Pr R ≠

» varia. 10 gr. 2 sh. Pr ≠ ÷ ÷

Corrigiola telephiifolia. |||

Cortusa hirsuta. O H

» Matthioli. O H

» » grandiflora. O H

» pubens. O H

» transylvanica. O H

Cortusa villosa. **O H**

Corydalis australis. **R**

» *bulbosa* (cava). 10 gr. 2 sh. **O ÷÷**

» *cheilanthifolia*. 10 gr. 8 sh. **||| N**

» *glauca*. |

» *Halleri*. **R**

» *lutea*. 10 gr. 4 sh. **||| R**

» *nobilis*. **R O**

» *ochroleuca*. 10 gr. 4 sh. **||| R**

» *ophiocarpa*. **O ÷÷**

» *rupestris*. **|||**

» *solida*. **O ÷÷**

» *thalictrifolia*. **|||**

» *tomentella*. **|||**

» *tuberosa*. **÷÷**

» *vaginans*. **R**

Cosmos sulfureus. |

Cotoneaster adpressa.

» *angustifolia* (new).

» *applatana*.

» *congesta*.

» *Davidiana* (horizontalis). 10 gr. 2 sh.

» *depressa*, très nain et rampant.

» *Franchetti*.

» *frigida*.

» *microphylla*. 10 gr. 1 sh.

» *nummularia*.

» *pannosa*. 10 gr. 1 sh.

» *sinensis*.

» *tomentosa*. 10 gr. 1 sh.

» *vulgaris*. 10 gr. 1 sh. Excellents
arbustes pour rocailles.

Cotyledon (Umbilicus) chrysanthus. **R |||**

» *ciliolatus*. **|||**

» *erectus*. **|||**

» *oppositifolius*. **R |||**

» *Pestalozzae*. **|||**

» *platyphyllus*. **|||**

» *Sempervivum* (Sedum Semp.). **|||**

» *spinosus*. **||| R**

» *umbilicus*. **||| X**

Crambe cordifolia. **V**

» *grandiflora*. **V**

» *Kotschyana*. **V**

» *maritima*. **V**

» *orientalis*. **V**

Crepis aurea. **R H**

» *blattarioides*. **÷÷**

» *montana*. **Pr**

» *pygmæa*. **||| ***

» *rubra*. **Pr**

» *sibirica*. **Pr**

» *Terglouensis*. **|||**

Crocus vernus. 10 gr. 1 sh. **Pr**

Crucianella stylosa. **± B R**

Crucianella stylosa carmina.

Crythmum maritimum. **R**

Cuphæa lanceolata. |

» *miniata*. |

Cyananthus lobatus. **||| R**

Cyclamen Balearicum (vrai). 10 gr. 8 sh. **R**

» *cilicium*. **R**

» *corsicum*. **R**

» *Coum*. 10 gr. 8 sh. **+**

Var. à fl. blanches et roses.

» *europæum*. **R ÷÷**

» " *album*.

» *hederæfolium*. 10 gr. 8 sh. **R ÷÷**

» " *album*.

» *ibericum*. **R**

» *latifolium*. **R**

» *libanoticum*. **R**

» *repandum*. 10 gr. 8 sh. **R ÷÷**

Cynoglossum nervosum. **R**

Cypella Herberti. **R**

Cypripedium calceolus. *

» *pubescens*. *

» *spectabile*. *

» *venticosum*. *

Cytisus albus.

» *argenteus*.

» *austriacus*.

» *capitatus*. 10 gr. 1 sh.

Excellent arbrisseau de 1 m. à 1 m. et demi qui se recouvre de fleurs jaunes pendant une bonne partie de l'année.

» *caramenicus*.

» *hirsutus*. 10 gr. 1 sh.

» *Laburnum*. 10 gr. 1 sh.

» *nigricans*. 10 gr. 1 sh.

» *purpureus*.

» *radiatus*. 10 gr. 1 sh.

Délicieux petit arbuste bas, aux rameaux étalés, propre à garnir les rocailles.

» *scoparius*.

» *sessilifolius*.

» *Shipkænsis*.

» *supinus*.

Daphne alpina.

» *altaica*.

» *buxifolium*.

» *caucasica*.

» *cneorum*.

» " *major*.

» *Gnidium*.

» *Kamtschatica*.

» *Laureola*.

» *mezereum*. 10 gr. 1 sh.

» " à fl. blanches.

» *oleoides*. 10 gr. 4 sh.

» *Philippi*.

» *pontica*.

» *pseudo-mezereum* (luteum).

» *striata*.

Datisca cannabina. **R**

Datura stramonium. 10 gr. 1 sh. |

Delphinium azureum.

» *Belladonna*. **+ V**

Delphinium grandiflorum.

- » *Brunonianum.*
- » *cachemirianum.* R V
- » " *album.*
- » " *purpureum.*
- » *californicum.* V
- » *cardinale.* R
- » *caucasicum.* R
- » *chinense.* Superbe, à fl. d'un bleu très pur. 10 gr. 2 sh. R + V
- » *conspicuum.* R
- » *elatum (type).* R
- » *formosum.* 10 gr. 2 sh. R V.
- » " *cœlestinum.*
- » *Geyeri.* R
- » *grandiflorum.* 10 gr. 2 sh. R V
- » " *var. album.*
- » " *var. azureum.*
- » " *var. compactum.*
- » " *var. roseum.*
- » " *var. Tom Thumb.*
- » *hybridum,* mélange des meilleures variétés. 10 gr. 2 sh.
- » " *fl. pl.*
- » " *Diana, fl. pl.*
- » " *Lugdunum.*
- » " *Perfection, fl. pl.*
- » " *"Prince of Wales"*
- » *nudicaule.*
- » *Requienii.* R |
- » *sulfureum (Zall).* R V
- » *superbissimum.* V
- » *Tatsuense.* + V
- » *Thunbergi.* R
- » *tirolense.* R
- » *triste.* R
- » *trolliifolium.* R
- » *vestitum.* R

Dentaria bulbifera. ÷ R

- » *digitata.* ÷ R
- » *pinnata.* ÷ R
- » *Savensis.* R

Desmodium penduliflorum. †

Dianthus acaulis. R |||

- » *alpestris.* R
- » *alpinus.* R |||
- » " *albus.*
- » *arboreus.* R
- » *arenarius.* R
- » *aridus.* |||
- » *armeria.* R ÷
- » *arvenensis.* R B
- » *asper.* R
- » *atrorubens.* R
- » *Balbisii.* R
- » *barbatus* (Oeillet des poètes).
- » *bicolor.* R
- » *brevicaulis.* R
- » *cæsius.* R
- » " *var. Bickhami.*

Dianthus cæsius var. *grandiflorus.*

- » *capitatus.* 10 gr. 2 sh.
- » *carpathicus.* R
- » *carthusianorum.* 10 gr. 2 sh. Pr R
- » *caucasicus.* R
- » *chinensis.* 10 gr. 2 sh. ||
- » *chinensis laciniatus.* 10 gr. 2 sh.
- » *collinus.* R
- » *crinitus.* R
- » *cruentus.* R
- » *Cyri.* |||
- » *deltoides.* 10 gr. 2 sh.
- » " *albus.*
- » " *superbus.* 10 gr. 2 sh.

Le *D. deltoides* est une esp. tapissante et naine, très florifère et solide, de culture facile.

- » *dentosus.* R |||
- » *diffusus.* R
- » *Falconeri.* |||
- » *fimbriatus.* R
- » *fragrans.* 10 gr. 2 sh. B R
- » *Freyunii.* |||
- » *frigidus.* |||
- » *furcatus.* R
- » *gallicus* (vrai), délicieusement parfumé. 10 gr. 6 sh. R |||
- » *giganteiformis.* R
- » *giganteus.* R
- » *glacialis.* *
- » *glutinosus.* R
- » *graniticus.* R
- » *Holzeri.* R
- » *Hungaricus.* R
- » *integer.* R
- » *Kamtschaticus.* R |||
- » *Liboschitzianus.* R
- » *Liburnicus.* R
- » *mariensis.* R
- » *monspessulanus.* Pr R
- » *montanus.* 10 gr. 2 sh. Pr R
- » *neglectus.* ||| R
- » *nitidus.* R
- » *Orestis.* R
- » *pallens.* R
- » *Pancicii.* R
- » *pelviformis.* R
- » *petræus.* R
- » *pinifolius.* R
- » *Plumarius.* 10 gr. 1 sh. R B +
- » L'une des meilleures pl. à bordure et aussi l'une de celles qui garnissent le mieux les rocs, les sommets des murs, les pentes arides au soleil; flor. prolongée et abondante; fl. très odorantes.
- » *Plumarius* var. *bicolor.*
- » " " *candidus.*
- » " " *Cyclope.*
- » " " *floribundus.*

Dianthus Plumarius var. *grandiflorus*.

- » » » *hortensis*.
- » » » *laciniatus*.
- » » » *lilacinus*.
- » » » *maximus*.
- » » » *nanus*.
- » » » *robustus*.
- » » » *suaveolens*.
- » » » *zonatus*.

Chacune à 2 sh. les 10 gr.

Ces variétés d'œillets rampants sont excellentes pour former des bordures, garnir des talus secs et le sommet des murs.

- » *Plumarius* × *caesius*.
- » *polycladus*. R
- » *prolifer*. R
- » *puberulus*. R
- » *pungens*. R
- » *pyridicola*. ||| R
- » *Requieni*. R
- » *rupicola*. R
- » *Seguieri*. R
- » » var. *grandiflorus*.
- » *speciosus*. R
- » *spinosus*. R |||
- » *Sternbergi*. R
- » *striatus*. R
- » *subacaulis*. ||| R
- » *subfastigiatus*. R
- » *superbus*. ÷ R ¹/₂ O
- » » var. *albus*.
- » » var. *nanus*.
- » *sylvestris*. 10 gr. 4 sh. R Pr ≠
- » *vaginatus*. R
- » *Velenowskyi*. R
- » *versicolor*. R
- » *virgineus*. R
- » *viscidus*. R
- » *Warley* var.
- » *wimmeri*. R

Dichondra repens. H ::

Dictamnus albus. V R S

- » *Fraxinella*. V R S

Digitalis ferruginea. R

- » *grandiflora*. 10 gr. 1 sh. R ÷
- » *mædia*. R
- » *nervosa*. R
- » *ochroleuca*. R
- » *orientalis*. R
- » *parviflora*. R
- » *purpurea*. 10 gr. 2 sh. V ÷
- » » à fl. blanches.

Ce sont des pl. solides, à flor. prolongée; cult. très facile.

Dimorphotheca aurantiaca. |

Dioscoræa caucasica. f

- » *pyrenaica*. O R

Dipsacus asper ≠

Dodecatheon integrifolium. R H

Dodecatheon Mædia. R H

- » *pauciflorum*. R
- » *radicatum*. R

Doronicum austriacum. R

- » *caucasicum*. R
- » *corsicum*. R
- » *hirsutum*. R
- » *hybridum*. R
- » *Pardalianches*. R

Dorycnium herbaceum. ≠

- » *suffruticosum*. ≠

Downingia pulchella. ×

Draba affinis. ||| R

- » *aizoides*. 10 gr. 6 sh. ||| R
- » » v. *grandiflora*. ||| R
- » *aizoon* (*lasiocarpa*). ||| R
- » *alpina*. ||| R
- » *altaica*. ||| R
- » *arabisans*. ||| R
- » *armata*. ||| R
- » *athoa*. ||| R
- » *aurea*. ||| R
- » » *grandiflora*. ||| R
- » *australis*. ||| R
- » *borealis*. ||| R
- » *bronchialis*. ||| R
- » *brunifolia*. ||| R
- » *cadmea*. ||| R
- » *cappadocica*. ||| R
- » *carinthiaca*. ||| R
- » *chamæjasme*. ||| R
- » *contorta*. ||| R
- » *corsica*. ||| R
- » *cuspidata*. ||| R
- » *Fladnizensis*. ||| R
- » *frigida*. ||| R
- » *glacialis*. ||| R
- » *Haynaldi*. ||| R
- » *hispanica*. ||| R
- » *incana*. ||| R
- » *Johannis*. ||| R
- » *Kotschyi*. ||| R
- » *lactea*. ||| R
- » *laponica*. ||| R
- » *lasiocarpa*. 10 gr. 6 sh. ||| R
- » *laxa*. ||| R
- » *Lereschei*. ||| R
- » *longirostra*. ||| R
- » *megasperma*. ||| R
- » *nivalis*. ||| R
- » *oxycarpa*. ||| R
- » *pycnosperma*. ||| R
- » *pyrenaica* (*Petrocalis*). ||| R
- » *repens*. 10 gr. 10 sh. ||| R
- » *rigida*. ||| R
- » *rupestris*. ||| R
- » *scabra*. ||| R
- » *Scandinavica*. ||| R
- » *stellata*. ||| R
- » *streptocarpa*. ||| R

Draba subamplexicaulis. ||| R

- » *Thomasii* ||| R
- » *tomentosa.* ||| R
- » *Traunsteineri.* ||| R
- » *tridentata.* ||| R
- » *vesicaria.* ||| R

Dracocephalum argunense. R

- » *austriacum.* 10 gr. 6 sh. R
- » *botryoides.* R
- » *canariense.* R
- » *integrifolium.* R
- » *nutans.* R
- » *peregrinum.* R
- » à fl. blanches. R
- » *Ruprechtii.* R
- » *Ruyschianum.* 10 gr. 4 sh. R
- » *speciosum.* R
- » *thymifolium.* R
- » *turkestanicum.* R

Drosera rotundifolia. Sp

Dryas Drummondii. ±

- » *integrifolia.* |||
- » *lanata.* 10 gr. 4 sh. ±
- » *octopetala.* 10 gr. 4 sh. ± ||| R

L'une des plus gracieuses pl. tapissantes pour rochers; grandes fl. blanches; semis facile.

- » *octopetala minor.*
- » *tenella.*

Drypis Jacquinianus.

Echinacea intermedia. 10 gr. 4 sh. V +

- » (*Rudbeckia*) *purpurea.* 10 gr. 2 sh. +

Echinops niveus. V ≠

- » Ritro (charbon bleu sphérique du Dauphiné). 10 gr. 2 sh. + V ≠
- » Ritro Floraire. 10 gr. 2 sh. + V
- » *sphærocephalus.* 10 gr. 1 sh. ≠

Echium Bourgeanum. ^

- » *petraeum* (*Lithorp. petr.*). |||
- » *rubrum.* ^
- » *simplex.* ^
- » *Wildpretii.* ^

Edelweiss (voir *Leontopodium*).

Edrayanthus bosniacus. ||| R

- » *caricinus.* ||| R
- » *caudatus.* ||| R
- » *croaticus.* ||| R
- » *dalmaticus.* ||| R
- » *dinaricus.* ||| R
- » *graminifolius.* ||| R
- » *Kitaibellii.* ||| R
- » *pumilio.* ||| R
- » *pumiliorum.* ||| R
- » *serpyllifolius.* ||| R
- » *tenuifolius.* ||| R

Empetrum nigrum. ± T R

Ephedra altissima. ||| S ≠

- » *distachya.* ||| S ≠
- » *fragilis.* ||| S ≠

Ephedra Helvetica. 10 gr. 2 sh. ||| S ≠

L'une des pl. les plus curieuses de la flore suisse.

Epilobium abyssinicum. 10 gr. 2 sh. H

- » *alpinum.* ||| N
- » *anagallifolium.* R
- » *angustifolium.* O ÷ ÷
- » à fl. blanches.
- » *caucasicum.* ||| R
- » *Fleischeri.* 10 gr. 4 sh. |||
- » *frigidum.* R
- » *glabellum.* ||| N
- » *Hectori.* R
- » *hirsutum.* 10 gr. 2 sh. H
- » à fl. blanches.
- » *latifolium.* ||| N *
- » *Linnæoides.* R O
- » *luteum.* T
- » *macropus.* T R H
- » *nummulariæfolium.* R H
- » *pedunculare.* R N
- » *pubens.* R N
- » *rosmarinifolium.* 10 gr. 2 sh. ≠ R

Epimedium pinnatum. O ÷ ÷

Eranthis cilicica. R

- » *pinnatifida.* R ÷ ÷
- » *hiemalis.* Pr ÷ ÷

Eremurus altaicus.

- » *Bungei.*
- » *perfectus.*
- » *Elwesianus.*
- » *Himalaicus.*
- » *Him-robustus.*
- » *inderiensis.*
- » *marginatus.*
- » *multiflorus.*
- » *Olgae.*
- » *robustus.*
- » *Shelfordii.*
- » *spectabilis.*
- » *tauricus.*
- » *Tubergeni.*
- » *turkestanicus.*

Erica stricta. 10 gr. 6 sh.

Bruyère corse arborescente, formant dans le jardin de superbes buissons qui se couvrent de fleurs roses tout l'été; espèce résistant aux sols calcaires.

Erigeron alpinus. R

- » *armeriæfolius.* R
- » *aurantiacus.* R
- » *caucasicus.* R
- » *compositus.* R
- » *Coulteri.* R
- » *elatior.* V
- » *elatius grandiflorus.* V
- » *flagellaris.* R ≠
- » *glabellus.* 10 gr. 2 sh. B R

Très voisin de l'Aster des Alpes.

- Erigeron glaucus*. R
 » *leiomerus*. R
 » *macranthus*. R
 » *montanensis*. R
 » *neo-mexicanus*. R
 » *oreganum*. R
 » *Philadelphicus*. H R
 » *pulchellus*. R
 » *roseus*. R
 » *rupestris*. R
 » *salsuginosus*. R
 » *speciosus*. 10 gr. 2 sh.

Excellente plante vivace, à grands capitules lilas foncé autour d'un disque d'or; juin-automne.

- » *trifidus*. R
 » *uniflorus*. R
 » *Villarsii*. R
Erinacea pungens. ||| R S
Erinus alpinus. 10 gr. 8 sh. ||| R
 » *albus*. ||| R
 » *hirsutus*. 10 gr. 6 sh. ||| R
 » *albus*. ||| R
 » *hispanicus*.
 » *roseus*.

- Eriogonum arboreum*. R
 » *flavum*. R
 » *racemosum*. R
 » *umbellatum*. R
Eriophorum angustifolium. H T
 » *vaginatum*. H T
Eriophyllum caespitosum. R |||
Eritrichium nanum (Roi de l'Alpe). 10 gr.

20 sh. ||| *

- Erodium amanum*. R |||
 » *cheilanthifolium*. R |||
 » *daucoides*. R
 » *Guicciardi*. R
 » *hymenoides*. 10 gr. 5 sh. R |||
 » *macradenum*. 10 gr. 8 sh.
 » *Manescavi*. 10 gr. 4 sh. $\frac{1}{2}$ O.

Bonne pl. de roc. fleurissant tout l'été et l'automne.

- » *Romanum*. R
Erpeton reniforme. H T
Eryngium alpinum (*Panicaut* ou *Chardon bleu des Alpes*). 10 gr. 2 sh. R V

Pr +

- » *amethystinum*. 10 gr. 2 sh. R
 » *Bourgati* (*Le superbe chardon bleu des Pyrénées*). 10 gr. 2 sh.
 R Pr +
 » *cæruleum* (*chardon bleu grec*).
 2 sh. \neq +
 » *Davosianum*. (C'est la variété très foncée de l'E. alpinum).
 » *Floriensis*. R

- Eryngium giganteum* (*chardon bleu du Caucase*). 10 gr. 2 sh. R \neq
 » *maritimum*. 10 gr. 2 sh. R V \neq

- Eryngium multifidum*. R
 » *Olivierianum*. R
 » *planum* (*chardon bleu de l'Atlas*).
 10 gr. 2 sh. \neq
 » *serbicum* (vrai). 10 gr. 4 sh. R
 » *Spinalba* (c'est le superbe et rare
chardon bleu des Hautes-Alpes).
 10 gr. 4 sh. R \neq

- Erysimum Allionii* (*Cheiranthus*). 10 gr.
 1 sh. V R + \neq
 Plante excellente à floraison prolongée; fl. orangé très vif; parfum suave; culture extra facile.

- » *cheiranthoides*. \neq
 » *Helveticum*. 10 gr. 2 sh. \neq
 » *leptophyllum*. R
 » *ochroleucum*. R |||
 » *odoratum*. R
 » *pachycarpum*. R
 » *pulchellum*. R \neq
 » *purpureum*. |||
 » *Rhaeticum* (vrai). R

- Erythraea centaurea*. Pr |
 » *alba*.
 » *grandiflora*.

- » *diffusa*. T
 » *gothica*. T
 » *latifolia*. T
 » *linarifolia*. T
 » *littoralis*. T
 » *ramosissima*. T
 » *Rumelica*. T

- Erythronium Johnsoni*.

- Eschscholzia aurantiaca*. || B \neq +

Plante semi-vivace naine qui se ressème d'elle-même avec abondance et donne toute l'année et jusqu'en hiver de grandes fl. de pavots d'un orangé très vif. 10 gr. 2 sh.

- Eupatorium ageratoides*. 10 gr. 2 sh. V
 » *cannabinum album*. 10 gr. 2 sh. H
 » *verticillatum*. V

- Euphorbia altissima*. R \neq
 » *bimaculata*. R
 » *Characias*. \wedge R
 » *Dendroides*. \wedge R
 » *Girardiana*. R \neq
 » *Lathyris*. R ||
 » *Myrsinites*. 10 gr. 2 sh. ||| R
 » *pilosa* (*E. polychroma*).
 » *robusta*. R
 » *spinosa*. R ||| \neq

- Euphrasia lutea*. |
 » *minor*. |
 » *montana*. |

- Falcaria Rivini*. R \neq
Falkia repens. \pm \wedge
Farsetia eriocarpa. 10 gr. 1 sh. \neq R
 » *clypeata*. \neq R
 » *triquetra*. |||

Ferula Asa foetida.

- » communis.
- » glauca.
- » Jæskeana.
- » oopoda.
- » Orientalis.
- » Tetenema.

Grandes ombellifères au feuillage finement divisé et décoratives.

Festuca alpina. R ≠

- » crinum-ursi. **B R ≠**
- » glauca. **R ≠**
- » valesiaca. **R ≠**
- » violacea. **R ≠**

Fragaria Daltoniana. ± ::

- » indica. **± ::**
- » mexicana. **± ::**

Francoa appendiculata. R

- » sonchifolia. **R**

Fritillaria askabadensis. R

- » delphinensis. **R Pr**
- » imperialis.

Fumana procumbens. ±

Funkia cœrulea. O

- » cordata. **O**

Gagea Liotardi. R

- » lutea. **R**

Galega officinalis. ≠

- » orientalis. ≠
- » persica. ≠

Gaillardia aurantiaca. V +

- » grandiflora. 10 gr. 2 sh. +

Belle plante vivace à très grandes fl. de soleil, rouge et jaune; grand effet; culture facile.

Galium purpureum. 10 gr. 5 sh. Très précieuse plante d'ornement pour rochers et jardins alpins; gazon fin, fl. d'un brun noir. R ± ≠

- » tenue.

Galtonia candicans (Jacynthe du Cap). V

Gaura coccinea. R ::

- » Lindheimeri. 10 gr. 2 sh. **V +**.
Plante vivace à longs épis rose chair, excellente pour la fleur coupée; Juin-Novembre.

Gaya simplex. R

Genista anxantina.

- » cinerea.
- » germanica.
- » horrida.
- » juncea. 10 gr. 1 sh.

Le brillant Genêt jaune d'Espagne, l'un de nos meilleurs et plus solides arbustes.

- » pilosa.
- » radiata. 10 gr. 1 sh.
- » sagittalis. ≠ **Pr**
- » sericea.
- » sibirica.

Genista tinctoria.

- » triquetra. **R ≠**

Tous ces Genêts sont excellents pour garnir les rocailles au soleil. Floraison prolongée, plantes solides.

Gentiana acaulis. 10 gr. 2 sh.

L'une des meilleures plantes des Alpes; germination lente, mais sûre.

B R Pr

- » alpina (vrai). **R ***
- » altaica. |
- » amarella. |
- » Andrewsii. **H T**
- » angulosa. **T R Sp**
- » angustifolia. **± B R**
- » asclepiadea. 10 gr. 12 sh. **H ÷÷**
- » " à fleurs blanches.

- » axillaris. |
- » barbata. ||
- » bavarica. 10 gr. 20 sh. **T sp ***
- » Bigelowi. **T sp**
- » brachyphylla. 10 gr. 20 sh. **T S R**
- » bracteosa. **Sp**

- » brevidens. 10 gr. 2 sh. | **R**
- » Burseri. **T**

- » campestris. 10 gr. 2 sh. **Pr**
- » Clusii. **R ±**

- » cruciata. 10 gr. 3 sh. **Pr R**
- » dahurica. **R**

- » decumbens. 10 gr. 4 sh. **R**
- » depressa. 10 gr. 2 sh. **R**

- » detonsa. **T**

- » Favratii. *

- » Feticsowii. **R**

- » Freyniana. **R * T**

- » frigida. **R * T**

- » Frœchlichii. **T R ***

- » Gentianella (Hort. Angl.). 5 gr. 4 sh. **R B**

- » germanica. |

- » Grombezesevskyi. **R**

- » glomerata. **R**

- » hybrida (straminea × Kesselringi). 10 gr. 6 sh. **R**

- » imbricata. **T Sp**

- » Kesselringii. **R**

- » " à fl. blanches.

- » Kochiana. 10 gr. 4 sh. × **R**

- » Lagodechiana. **T R**

- » lutea. 10 gr. 1 sh. **Br R**

- » macrophylla. 10 gr. 2 sh. **R**

- » " cyanea.

- » mongolica. **R**

- » Moorcroftiana. 10 gr. 4 sh. **R**

- » nivalis. 10 gr. 14 sh. | **T**

- » Olivieri. 10 gr. 4 sh. **R**

- » pannonica **T**

- » parryi. **R**

- » phlogifolia. 10 gr. 4 sh. **R**

- » Pneumonanthe. **T H**

Gentiana Przewalskyi. R

- » *pumila*. * **T**
- » *punctata*. 10 gr. 2 sh. **T R**
- » *purpurea*. 10 gr. 2 sh. **T R**
- » *alba*.
- » *nana*.
- » *Regeli*. **R**
- » *robusta* * **R**

Gentiana Rocheliana. R

- » *Rostani*. **T**
- » *Saponaria*. **T Sp**
- » *Sceptrum*. **T**
- » *septemfida*. 10 gr. 9 sh. **H T R**
- » *cordifolia*. 10 gr. 8 sh.
- » *latifolia*. 10 gr. 8 sh.
- » *schistocaly*. **X R**
- » *straminea*. 10 gr. 4 sh. **R**
- » *tenella*. 10 gr. 12 sh. | **Pr T**
- » *Tibetica*. 10 gr. 2 sh. **R**
- » *Tshiantanica*. **R**
- » *glomerata*.
- » *triflora*.
- » *uliginosa*. |
- » *utriculosa*. |
- » *verna*. 10 gr. 10 sh. **R P T**
- » *alba* (*chionodoxa*)
- » *azurea*.
- » *grandiflora*. 10 gr. 14 sh.
- » *atrocerulea*.
- » *Walujevii*. **R**

Geranium aconitifolium (rivulare). 10 gr. 3 sh.

- » *albanum*. **R**
- » *albiflorum*. **R**
- » *argenteum*. 10 gr. 10 sh. **R**
- » *armænum*. **V**
- » *atlanticum*. **R** \wedge
- » *cinereum*. 10 gr. 10 sh. **R**
- » *Endresii*. **R** \div
- » *Fremonti*. **R** \wedge
- » *grandiflorum*. **R** \div
- » *Grevilleanum*. **R**
- » *Ibericum*. **R**
- » *macrorrhizum*. **R O** \div
- » *nepalense*. **R**
- » *nodosum*. **H**
- » *palustre*. **H**
- » *phæum*. **Pr R**
- » *platyanthum*. **R**
- » *platypetalum*. **R V**
- » *pratense*. 10 gr. 1 sh. **R Pr**

Excellente plante pour rochers et plates-bandes, fleurissant tout l'été; germe de suite et produit la même année ses belles fleurs bleu violet foncé. **::**

- » *Richardsoni*. **R**
- » *sanguineum*. 10 gr. 2 sh. **R** \neq
- » *à fleurs blanches*, 10 gr. 4 sh. **R**

Geranium sessiliflorum. R

- » *subcaulescens*. **R**
- » *sylvaticum*. **R ::**
- » *tuberosum*. **R**

Gerardia tenuifolia. V +

Gerbera Abyssinica. R

- » *Anandria*. **R**
- » *Jamesoni*. \wedge +
- » *Kunzeana*. **R**

Geum atrosanguineum. 10 gr. 2 sh. R H +

- » *Borissii*. **R**
- » *bulgaricum*. **H**
- » *chilense* (à fl. rouge très vif). 10 gr. 2 sh.
- » *coccineum* (*idem*). 10 gr. 2 sh.
- » *grandiflorum*. 10 gr. 2 sh.

H R +

- » *Heldreichii*. 10 gr. 4 sh. +
- » *heterocarpum*. **R**
- » *intermedium*. **H**
- » *magellanicum*. **R**
- » *montanum*. 10 gr. 4 sh. **R Pr**
- » *Mrs Bradschaw*. **R**
- » *pyrenaicum*. 10 gr. 4 sh. **R Pr**
- » *reptans*. 10 gr. 6 sh. ||| **R**
- » *Rhæticum*. 10 gr. 8 sh. ||| **R**
- » *rivale*. 10 gr. 2 sh. **H**
- » *grandiflorum*.
- » *sibiricum*. **R**
- » *splendens*. **R**
- » *triflorum*. **H**
- » *tyrolense*. |||

Gilia coronopifolia. 10 gr. 4 sh. ||

Gillenia trifoliata. 10 gr. 4 sh. V H

L'une des meilleures et des plus florifères d'entre les plantes vivaces d'ornement, fl. blanc rosé, gracieusement suspendues sur tiges rouge brun, Mai-Septembre.

Gladiolus palustris. H

Glaucium cappadocicum. R

- » *corniculatum*. **V** \neq
- » *leiocarpum*. **R**
- » *luteum*. 10 gr. 1 sh. **V R** \neq
- » *rubrum*. 10 gr. 2 sh. **V** \neq
- » *tricolor*. 10 gr. 2 sh. **V R** \neq
- » *grandiflorum*. 10 gr. 2 sh.

Glaux maritima. H T

Globularia bellidifolia. R

- » *cordifolia*. 5 gr. 6 sh. **R** ||| \neq \pm
- » *alba*.
- » *incanescens*. |||
- » *nana*. \pm ||| **R**
- » *nudicaulis*. **R B**
- » *salicina*. **R**
- » *trychosantha*. 10 gr. 6 sh. \pm **R** \neq
- » *vulgaris*. 10 gr. 4 sh. **R** \neq
- » *alba*.

Glossocomia Clematidea. R

Gnaphalium Leontopodium. 10 gr. 8 sh.

Gnaphalium decurrens. R
 » *supinum*. T
Grindelia robusta. 10 gr. 3 sh. +
Gutierrezia Euthamiae. R
Gymnolomia multiflora. R
Gypsophila acutifolia. 10 gr. 2 sh. V
 » *apicola*. 10 gr. 4 sh. R |||
 » *altissima*. 10 gr. 2 sh. V
 » *cerastioides*. R |||
 » *libanotica*. R
 » *paniculata*. 10 gr. 1 sh. + V ≠
 » *paniculata compacta*.
 » *repens*. 10 gr. 4 sh. ± ||| R ≠
 » *var. major*.
 » *Rokejeka*. R
 » *scorzoneræfolia*. 10 gr. 1 sp. V ≠
 » *Steveni*. R
 » *transylvanica*. R
Haberba Rhodopensis. ||| N
 » *Ferdinandi*. ||| N
Hablitzia tamnoides. f
Hacquetia Epipactis. O ÷
Halimodendron argenteum. +
Haplocarpha Leichtlini. R
Hedysarum lasiocarpum. R
 » *microcalyx*. R
 » *multijugum*. +
 » *neglectum*. R
 » *obscurum*. R
 » *Semenowi*. R
 » *sibiricum*. R
Helenium autumnale. V
 » *Hooperi*. V +
Helianthella quinqueærnervis. V +
 » *uniflora*. V +
Helianthemum alpestre (jaune).
 » *amabile* (carmin). 10 gr. 4 sh.
 » *apenninum* (blanc). 10 gr. 2 sh.
 » *atrosanguineum*.
 » *aurora*.
 » *bicolor* (jaune et rouge).
 » *canum* (jaune).
 » *coccineum* (rouge ardent).
 » *cruentum* (rouge vif).
 » *Fumana* (jaune). 10 gr 3 sh.
 » *Garibaldi*.
 » *grandiflorum* (jaune). 10 gr. 2 sh. Pr
 » *mutabile*. 10 gr. 2 sh.
 » *obscurum* (jaune).
 » *celandicum* (jaune).
 » *polyfolium* (blanc). 10 gr. 4 sh.
 » *rhodanthum* (rougeâtre).
 » *roseum* (rose clair). 10 gr. 3 sh.
 » *rubrum* (rouge sombre).
 » *salicifolium*.
 » *sulfureum*.
 » *tomentosum* (à feuilles blanch., fl. jaun.), 10 gr. 2 sh.
 » *velutinum* (jaune).
 » *vulgare* (jaune). 10 gr. 2 sh. Pr

Ce sont des pl. à gracieux feuill. persistant, aux fl. nombreuses, se succédant presque toute l'année quand on a soin de couper les tiges après la fleur; culture très facile. Pl. naines et touffues, excell. pour les rochers et talus arides. Lèvent facilement et rapidement.

Helichrysum angustifolium. R S
 » *anatolicum*. R S
 » *diosmæfolium*. R S
 » *lanatum*. R S
 » *odoratum*. R S
 » *Stœkas*. R S
Heliopsis lævis. 10 gr. 1 sh. V +
 » *scabra*. V +
 » "Soleil d'or". 10 gr. 1 sh. V +
Helleborus altifolius. O R
 » *atropurpureus*. O R
 » *colchicum*. R O
 » *corsicus*. O R
 » *fœtidus*. R ≠
 » *niger* (Rose de Noël). 10 gr. 2 sh. O
 » *orientalis*. R O
 » *purpurescens*. R O
 » *viridis*. R O
Heracleum album. V
 » *giganteum*. 10 gr. 1 sh. V
 » *lanatum*. V
 » *Mantegazzianum*. 10 gr. 1 sh.
 L'une des meilleures plantes mellifères; formes gigantesques. V ÷ O H
 » *pubescens*. V
 » *pyrenaicum*. V
 » *villosum*. V
Herniaria glabra. ≠
 » *hirsuta*. ≠
 L'H. glabra est la meilleure pl. tapissante pour garnir les lieux secs et arides, en plein soleil, les sols maigres et stériles qu'elle recouvre rapidement. 10 gr. 4 sh.
Hesperis matronalis (*Giroflée vivace*).
 » *var. candidissima*. V ≠
 » *tristis*. R
Huechera glabra. O
 » *purpurescens*. O
 » *rubescens*. O
 » *sanguinea*. 10 gr. 6 sh. R +
 » *alba*.
 » *grandiflora*.
 » *maxima*.
 » *splendens*.
Hibiscus militaris. V
 » *alba*.
 » *palustris*. V
 » *roseus*. V
Hieracium albidum. R |||
 » *aurantiacum*. R :: ≠ Pr
 » *lanatum*. R ||| S

Hieracium rubrum. R
 » *stoloniflorum*. R :: ≠ Pr
 » *villosum*. R
Hippocrepis comosa. R
Hirschfeldia adpressa. R
Homogyne alpina. O R
Horminum pyrenaicum. R O
 » » *splendens*.
Houstonia cœrulea. T Sp
 » » *alba*.
 » *serpyllifolia*. T Sp
Hugueninia tanacetifolia. 10 gr. 4 sh. O R
Hutschinsia alpina. ||| N
Hydrastis canadensis. O X
Hydrophyllum virginicum. R H
Hyoscyamus niger (*Jusquiame*).
Hypericum Androsæmum. 10 gr. 4 sh. R
 » *aureum*. 10 gr. 4 sh. †
 » *Balearicum*. † ^
 » *Coris*. 10 gr. 8 sh. ||| S R
 » *delphicum*. R
 » *elongatum*. R
 » *empetrifolium*. R
 » *fragile*. ||| R
 » *Gebleri*. R
 » *Henryi*. †
 » *hircinum*. R
 » *hyssopifolium*. R
 » *Kalmianum*. 10 gr. 4 sh. †
 » *Kamtschaticum*. R
 » *Kotschyannum*. 10 gr. 10 sh. ||| R
 » *linarifolium*. X
 » *montanum*. R
 » *Mooserianum*. R
 » *nummulariæfolium*. ||| R
 » *Olympicum*. 10 gr. 8 sh. R
 » *Orientale*. 10 gr. 2 sh. R
 » *organifolium*. ||| R
 » *patulum*. 10 gr. 2 sh. †
 » *perforatum* (*Millepertuis*). Pr ≠
 » *poliphyllum*. R
 » *prolificum*. †
 » *Przewalskyi*. R
 » *ptarmicæfolium*. 10 gr. 4 sh. R
 » *pulchrum*. O
 » *quadrangulum*. O
 » *repens*. 10 gr. 6 sh. ± B ||| ≠
 » *reptans*. R ±
 » *Rhodopeum*. R
 » *Richeri*. R
 » *tomentosum*. 10 gr. 6 sh. R
 » *transylvanicum*. R
Hypochaeris Helvetica. R Pr
 » *maculata*. Pr
Hyssopus aristatus. R S ≠
 » *cretaceus*. R
 » *officinalis*. 10 gr. 1 sh. R ≠
Hyssopus officinalis alba. 10 gr. 2 sh.
 » » à fl. rouges. 10 gr. 2 sh.
 » *recticaulis*. R ≠

Hyssopus sibiricus. R ≠
Iberis gibraltarica. 10 gr. 3 sh.
 » *jucunda*. ||| R
 » *saxatilis*. ||| R
 » *sempervirens*. 10 gr. 2 sh. R ||| ≠
 » *sempervirens nana*. 10 gr. 4 sh.
 » *stylosa*. |||
Impatiens glanduligera. O ÷ H
 » *noli tangere*. O ÷ H
Imperatoria angustifolia. R O
 » *Ostruthium*. R H O
Incarvillea brevipes. V R
 » *Delavayi*. 10 gr. 4 sh.
 (Gloxinia vivace). L'une des meilleures plantes vivaces d'ornement que nous ait fourni l'Asie; s'élève facilement de semis.
 » *grandiflora*. V R
 » *Olgæ*. V R
Inula acaulis. |||
 » *ensifolia*. 10 gr. 3 sh. B R ≠
 » *glandulosa*. 10 gr. 4 sh. V + R
 » » *grandiflora*.
 » *Helenium* (aulnée). 10 gr. 2 sh.
 Plante officinale stomachique de grande valeur, appréciée déjà des Romains; belle plante d'ornement.
 » *hirta*.
 » *limonifolia*. R S
 » *macrocephala*. V
 » *montana*. R
 » *Royleana*. R V +
Ipomæa rubro-cœrulea. S
Iris acutiloba. R
 » *albida*. V
 » *carthalinæ*. R
 » *caucasica*. R
 » *Douglasiana*. R
 » *Fieberi*. R
 » *fœtidissima*. O ÷ R
 » *iberica*. R *
 » *imbricata*. R *
 » *Junonana*. R
 » *Kumaonensis*. R
 » *lævigata* (*Kæmpferi*). H V
 » *Medwedewii*. R
 » *musulmanica*. R
 » *orchioides*. R
 » *paradoxa*. R
 » *prismatica*. R
 » *pseudo-Acorus* (Le lis héraldique).
 H Aq
 » *pyrenaica*. R
 » *reticulata*. R
 » *sibirica*. H V R
 » » *alba*.
 » *sisyrinchium*. R
 » *versicolor*. R
 » *virginica*. R
Isatis alpina. R

- Jasione humilis*. **R** ×
 » *montana*. **R**
 » *perennis*. **R**
Jeffersonia diphylla. **O** ×
Juniperus Cedrus. † ∧
 » *communis*. †
 » *nana*. †
 » *Phoenicea*. †
 » *Sabina*. † ± ≠
Jurinea latifolia. **R**
Kalopanax ricinifolia. †
Kerneria auriculata. **R**
 » *saxatilis*. ||| **R**
Kitaibelia vitifolia. **V** **R** ≠
Kniphofia (*Tritoma*).
 » *caulescens* (*Trit. en arbre*).
 » *grandiflora*.
 » *Natalensis*.
 » *Saundersi*.
 » *Tuckyi*.
 » *Uvaria*.
Kochia trichophylla. |
Lactuca perennis. **R** ≠
 » *alba*.
Laserpitium gallicum. ≠ **R**
 » *halleri*. 10 gr. 2 sh. ≠ **R**
 » *latifolium*. 10 gr. 2 sh. ≠ **R**
 » *peucedanoides*. ≠ **R**
 » *siler*. 10 gr. 2 sh. ≠ **R**
Lasiospermum lanatum. ∧
Lathyrus alatus. **R**
 » *heterophyllus*. *f*
 » *incurvus*. **R** ::
 » *latifolius*. 10 gr. 1 sh.
 » *alba*, 10 gr. 1 sh.
 » "The Pearl".
 » *maritimus*.
 » *neurolobus*. **R** ::
 » *pratensis*. **R** ::
 » *pyrenaicus*. **R** ::
 » *rotundifolius*. *f* ::
 » *sylvestris*. *f* ::
 » *tuberosus*. **R** ::
Laurentia tenella. **H** **R** **T** **Sp**
Lavandula abrotanifolia. ∧
 » *delphinensis*. 10 gr. 4 sh.
 » *multifida*. ∧
 » *nana compacta*. **R**
 » *officinalis*. 10 gr. 4 sh. **R** ≠ **B**
 » *spica*. **R**
 » *Stœkas*. ∧ **R**
 » *vera*. **R** ≠ **B**
Leontopodium alpinum (*Etoile du glacier*,
glacier star).
 Semer dans un sol léger et tenir
 plutôt sec; repiquer jeune et cul-
 tiver au soleil et dans sol calcaire.
 Diviser tous les deux ans. 10 gr.
 12 sh.
 » *alticum*.

- Leontopodium depauperatum*.
 » *Himalayense*.
 » *japonicum*.
 » *Lindavicum*.
 » *sibiricum*.
 » *sikkimense*.
 » *transylvanicum*.
 » *tibeticum*.
Lepidium alpinum (*Hutschinsia*).
 » *Auerswaldii*. ||| **N**
 » *stylatum*. **R** ≠
Lepigonum rubrum. **R**
Leptospermum Nicholii. × ∧
Leucanthemum maximum. **V** +
 » *Irkutianum*. **R**
Leuzea carthamoides. **R**
 » *conifera*. **R**
Levistichum officinale. **V**
Liatris graminifolia. **V**
 » *pycnostachya*. **V**
 » *scariosa*. 10 gr. 2 sh. **V**
 » *spicata*. 10 gr. 2 sh. **V**
Ligularia macrophylla. 10 gr. 2 sh. **V** **R**
 » *sibirica*. 10 gr. 2 sh. **V** **R**
 » *turkestanica*. 10 gr. 2 sh. **V** **R**
Lilium candidum. **V**
 » *Catanie*. **V**
 » *cordifolium*. **O** ×
 » *croceum*. **V** **R**
 » *dalmaticum*. **O**
 » *Glehni*. **O** ×
 » *Henryi*. **O** ×
 » *Martagon* 10 gr. 4 sh. **O** ::
 » *album*.
 » *pumilum*.
 » *pyrenaicum*. 10 gr. 6 sh. **O** ::
 » *spectabile*. **O** ×
 » *superbum*. **O** ×
 » *tenuifolium*. **R** **O**
 » *tigrinum*. **V**
Linaria alpina. 10 gr. 10 sh. **R** ||| **T**
 » *alba*.
 » *concolor*.
 » *rosea*.
 » *anticaria*. **R**
 » *canadensis*. **R**
 » *cymbalaria*. ||| **O**
 » *alba*.
 » *var. compacta*.
 » *dalmatica*. **R**
 » *genistifolia*. **R**
 » *italica*. **R** **S**
 » *macedonica*. **R**
 » *origanifolia*. ||| **R**
 » *pallida*. 10 gr. 10 sh. ||| **R**
 » *rosea*.
 » *pilosa*. |||
 » *purpurea*. **R**
 » *spuria*. |||
 » *triornitophora*. ||| **T** **R**

Linaria tristis. |||
Lindelia spectabilis. 10 gr. 2 sh.
Linnæa borealis. T O ÷
Linum alpinum. R
 » *altaicum.* R
 » *angustifolium.* R
 » *arborescens.* R ^
 » *campanulatum.* R |||
 » *catharticum.* |
 » *collinum.* R
 » *flavum.* 10 gr. 2 sh. R ||| ≠ +
 » *grandiflorum* (à fl. rouges). |
 » *maritimum.* R
 » *monogynum.* R
 » *Mülleri.* R
 » *narbonense.* R +
 » *nervosum.* R
 » *perenne.* 10 gr. 2 sh. V R ≠
 » » à fl. blanches. 10 gr. 2 sh.
 » » à fl. roses.
 » *salsoloides.* ||| R
 » *sibiricum.* R
 » *suffruticosum.* R
 » *tenuifolium.* |||
Lithospermum Frœbeli. R
 » *fruticosum.* R ^
 » *Gastonis.* R O
 » *graminifolium.* 10 gr. 10 sh. ||| R
 » *intermedium.* ||| R
 » *oleoides.* |||
 » *petraeum* (*Echium*). 10 gr. 6 sh.
 » » *roseum.*
 » *purpureo-cœruleum.* O ÷ ÷ ::
 » *Sibthorpiæ.* R
Lloydia serotina. T R
Lobelia cardinalis (vrai). 10 gr. 10 sh. H
 » *fulgens.* V
 » *Gerardi.* V
 » *inflata.* R
 » *Kalmii.* R
 » *Kamtschatica.* R
 » *linnæoides.* T ±
 » *speciosa.* R
 » *syphilitica.* 10 gr. 4 sh. H R
 » » *alta.*
 » » *rosea.*
Lonicera alpigena. 10 gr. 1 sh. † ÷ O
 » *cœrulea.* † O
 » *etrusca.* f
 » *nigra.* 10 gr. 1 sh. O
 » *pyrenaica.* R
Lotus corniculatus. Pr R
Lunaria rediviva. O ÷
Lupinus Nutkaensis.
 » *poliphyllus.*
 » » *altus.*
 » » *excelsior.*
 » » *Moerheimii.*
 » » *roseus.*
 Les *Lupinus* vivaces sont excel-

lents pour la décoration de plates-bandes et jardins. Très parfumées, très abondantes, leurs fl. sont l'un des ornements les plus recommandables pour l'amateur qui aime la Beauté. Culture très facile, surtout dans les sols pauvres en chaux.
Luzula albida. O ÷
 » » *rubra.*
 » *nivea.* O ÷
 » *sylvatica.* O ÷
Lychnis alpina. 10 gr. 6 sh.
 » » *alba.*
 » *chalcedonica.* 10 gr. 2 sh. V +
 » » *alba.*
 » » *rosea.*
 » *flos Jovis.* 10 gr. 4 sh. R
 » » *alba.*
 » *fulgens.* R +
 » *Haageana.* R
 » *laciniata.* R +
 » *Lagascae* (*Petrocoptis* Lag.). |||
 » *Laponica.* R X
 » *viscaria.* 10 gr. 4 sh. R Pr
 » » *alba.*
 » » *splendens.* 5 gr. 2 sh.
Lynosiris punctata. R
 » *vulgaris.* R +
Lysimachia atropurpurea. 10 gr. 2 sh. ||
 » *clethroides.* H
 » *dahurica.* H
 » *dubia.* 10 gr. 2 sh. H
 » *epheumerum.* H Aq
 » *japonica.* O ÷
 » *kindigeri.* H
 » *lobelioides.* H
 » *quadrifolia.* 10 gr. 2 sh. H V O ::
 » *thyrsiflora.* H Aq
 » *verticillata.* 10 gr. 2 sh. H V ::
 » *vulgaris.* Aq ::
Lythrum Salicaria. 10 gr. 2 sh. H Aq
 » *virgatum.* H
Malva Alcea. 10 gr. 2 sh. || R Pr ≠
 » *moschata.* 10 gr. 4 sh. || R Pr ≠
 » » *alba.*
Malvastrum capense. ^
 » *lateritium.* ^
Mamillaria vivipara. *
Mandragora officinalis. 10 gr. 2 sh. R S
Margyricarpus setosus. R ± †
Marrubium candidissimum. ± B R
 » *Kotschy.* ± R
 » *lanatum.* R
 » *sericeum.* ± R
 » *spinulosum.* ± R
Matthiola fenestralis. ^ R
 » *pedemontana.* :: ||| ≠
 » *sinuata.* R
 » *tristis.* :: ||| R ≠
 » *valesiaca.* :: ||| R ≠

Mayanthemum bifolium.

» canadense.

Mazus rugosus. H T ::

Meconopsis aculeata. O \wedge

» cambrica 10 gr. 4 sh.

» » aurantiaca.

» » fl. pl.

» heterophylla. || O

» integrifolia. O X

» nepalensis. O X

» paniculata. || O X

» petiolata. O \div

» racemosa. O X

» rudis. O X

» sinuata latifolia. O X

» Wallichiana. O X

Medicago Echinus. |

Melandrium rubrum. 10 gr. 2 sh. Pr

Melica altissima. O \div

Melissa officinalis (Mélisse). 10 gr. 1 sh.

Mertensia ciliata. R $\frac{1}{2}$ O

» echioides. \pm R $\frac{1}{2}$ O

» lanceolata. R $\frac{1}{2}$ O

» oblongifolia. R $\frac{1}{2}$ O

» paniculata (sibirica). R $\frac{1}{2}$ O

» » alba.

» primuloides. \pm $\frac{1}{2}$ O

» virginica. R

Meum athamanticum. 10 gr. 2 sh. X :: Pr

Meum Mutellinum. R |||

Michauxia campanuloides. ||

Micromeria rupestris. R |||

Mimulus alsinoides. H

» cardinalis. H

» » vars.

» Lewisii. T

» luteus. H ::

» pilosuscula. H ::

» ringens. H

Mirabilis multiflora. R

Mitchella repens. O X

Mitella diphylla. O

» pentandra. O

Mœhringia Janke. ||| N

» muscosa. |||

» papulosa. |||

» pendula. ||| N

» Ponæ. |||

» sedoides. |||

Monarda dydima. V +

» » alba.

» fistulosa (thé d'Oswego). 10 gr. 2 sh. V

» floransensis. 10 gr. 4 sh. V +

» Kalmiana. 10 gr. 2 sh.

» purpurea. 10 gr. 2 sh. V. +

» superba. 10 gr. 4 sh. V

Molospermum cicutarium. R

Molucella spinosa. R

Morine longifolia. 10 gr. 2 sh. R

Muhlenbeckia nana. \pm

Mulgedium alpinum. 10 gr. 8 sh. O

» Bourgæi. 10 gr. 8 sh. O

» plumieri. 10 gr. 6 sh. O

Myosotis alpestris. R

» australis. R

» caespitosa.

» lithospermifolia. R

» palustris. H

» » var. semperflorens. 10 gr.

6 sh. H ::

» pygmaea. R

» rupicola. R

Myrrhis odorata. 10 gr. 2 sh. O

Nardus stricta. R \neq

Nepeta dirphyia. R

» lanceolata. R

» macrantha. N

» Nepetella. R

» nuda. 10 gr. 4 sh. R B \neq

Nigritella angustifolia. T *

Notosperthium Carmichaeliae. \wedge

Nuphar luteum. Aq

Nymphæa alba. Aq

Oenothera acaulis. 10 gr. 2 sh. R

» caespitosa. R H

» Fraseri. 10 gr. 2 sh. V R

» macrocarpa (O. Missouriensis). 10 gr. 1 sh. R V B \neq

L'une des meilleures plantes de rocailles ; grandes fl. jaune clair, de juin en novembre ; culture facile.

» pumila. R

» rosea. R

» rosea mexicana. R

» serrulata. R

» speciosa. R V ::

Omphalodes cappadocica. $\frac{1}{2}$ O

» linifolia. |

» Luciliæ. ||| N

» » alba.

» nitida. $\frac{1}{2}$ O

Onobrychis arenaria. Pr \neq

» montana. Pr \neq

» petraea. R \neq

» pulchella. R \neq

» saxatilis. R \neq

Ononis cenisia. \pm R |||

» fruticosa. \dagger R

» natrix. 10 gr. 2 sh. R \neq

» rotundifolia. 10 gr. 2 sh. R \pm

Onosma armena. ||| R \neq

» albo-rosea. ||| R \neq

» Bourgæi. ||| R \neq

» Cassium. ||| R \neq

» Helveticum. 10 gr. 3 sh.. ||| R \neq

» pallida. ||| R \neq

» poliphylla. ||| R \neq

» Rhodopaeum. ||| R \neq

» rupestris. ||| R \neq

» sericea. ||| R \neq

Onosma stellulatum. 10 gr. 4 sh. ||| R ≠

» *taurica*. ||| R ≠

*Opuntia albospina*¹.

» *arkansana*. 10 gr. 2 sh.

» *Camanchica*. 10 gr. 2 sh.

» » *major*. 10 gr. 2 sh.

» *cantabrigensis*.

» *cymochila*. 10 gr. 2 sh.

» *fulgens* (à fl. rouge vif).

» *gigantea*. 10 gr. 2 sh.

» *greenii*. 10 gr. 2 sh.

» *macrorrhiza*. 10 gr. 2 sh.

» *mesacantha*. 10 gr. 2 sh.

» *missouriensis*. 10 gr. 2 sh.

» *orbicularis*.

» *Raffinesquiana*. 10 gr. 2 sh.

» *rubra*.

» *Salmonia* (fl. rouge saumon).

» *sphaeracantha*.

» *spinacantha*.

» *vulgaris*.

» *Xanthostemma rosea*.

Origanum pulchrum. ||| R

Orobis lathyroides. R O

» *luteus*. R O

» *niger*. R O ::

» *tuberosus*. R

» *vernus*. O ::

Ostrowskya magnifica. R V

Ourisia macrophylla. T ^

Oxalis acetosella. O :: ::

» » *rosea*.

» *atrosanguinea*. R ≠

» *floribunda alba*. 10 gr. 8 sh. R

» » *rosea*. 10 gr. 8 sh.

Oxyria digyna. ||| N

» *elatior*. ||| N

Oxytropis Baikalensis. 10 gr. 4 sh. R S

» *campestris*. 10 gr. 4 sh. R S

» *Halleri*. R S

» *Laponica*. R S

» *ochroleuca*. R S

» *pilosa*. R S

» *sordida*. R S

» *spicata*. R S

» *sulfurea*. R S

» *Tyrolense*. R S

Paeonia albiflora.

» *anomala*.

» *coralina*.

» *decora* (*Romanica*). 10 gr. 1 sh.
fl. couleur vermillon très vif.

» *decora major*.

» *lutea*. 10 gr. 1 sh. Pivoine arborescente, à fleur jaune vif; facile à cultiver.

Paeonia Mlokosievitchii.

» *officinalis*. 10 gr. 1 sh.

» *Pallasi*.

» *peregrina*.

» *Russi*.

» » *alba*.

» *tenuifolia*.

» *triternata*. 10 gr. 2 sh.

» *Veitchi*.

» *Witmanniana*.

Papaver alpinum. 10 gr. 6 sh. ||| R ≠

» *alpinum*, variété à fleur rouge vif, rouge cinabre, rouge et jaune. Ces pavots alpins sont d'entre les plus florifères, les plus gracieuses et les meilleures des pl. de roc. Leurs fleurs, très abondantes, affectent toutes les teintes. On peut les semer dans les rochers, les graviers, les fentes de murs et les lieux pierreux. Sol maigre et rocailleux.

» *alpino-nudicaule*. R

» *atlanticum*. O ≠

» *bracteatum* (*involutatum*). V

» » *nanum*.

» *Burseri*. ||| N

» *croceum*. R 1/2 O

» "Croix helvétique". |

» *Kernerii*. |||

» *maximum*. V

» *nudicaule*. 10 gr. 2 sh. ||| R ≠

» » à fl. blanches.

» » » jaune vif.

» » » rouge cramoisi.

» » Toutes teintes mélangées.

Le papaver nudicaule est l'une des plus florifères et des plus précieuses d'entre les plantes alpines ou vivaces. Il aime la fraîcheur et la mi-ombre et constitue l'un des meilleurs ornements des rochers. Fleurit tout l'été et jusqu'en hiver, très facile à cultiver; bon pour la fleur coupée.

» *orientale*. 10 gr. 1 sh. V R ≠

Le pavot d'Orient est la plus éclatante de nos fleurs de pl. terre. Sa grosse corolle d'un rouge ardent fait un effet grandiose dans les jardins. Culture facile.

» *pilosum*. R

» *pyrenaicum*. ||| S

» *radicatum*. R

» *Rhaeticum* (de la Bernina). C'est la

¹ Ces *Opuntia* sont des Cactées dont les graines lèvent facilement et qui sont rustiques à nos hivers. Il suffit, dans les pays du Nord, de tenir les plantes au sec (recouvertes de planches inclinées) pendant la mauvaise saison. Elles fleurissent abondamment l'été si l'on a soin de les planter au grand soleil. En Allemagne, on en cultive de grandes collections sans même les recouvrir de planches.

merveille des Alpes grisonnes. |||

R ≠

Papaver Schinzianum. R

» splendidissimum. V

» strigosum. R

» tauricolum. R

» triniaefolium. R

Paracarium azureum. V

Paradisia Liliago. Pr R

» Liliastrum. Lis de Saint-Bruno. Pr R

» Liliastrum major.

Pardanthus chinensis. V

Paris quadrifolia. O ÷

Parnassia alpina. T

» asarifolia. T

» fimbriata.

» mysorensis. T R

» palustris. T H

Parochetus communis. ± ^

Paronychia argentea. ||| ≠

» Kapellæ. R ≠

» nivea. R ||| ≠

Parrya Menziesii. R

» microcarpa. R

Patrinia heterophylla. R

» palmata (triloba). R

» rupestris. 10 gr. 4 sh. R V

» scabiosæfolia. R

Pedicularis âtrorubens. T

» cenisia. T

» foliosa. T

» palustris. T

» recutita. T

» retroflexa. T

» tuberosa. T

» verticillata. T

Peganum Harmala. R ≠

Peltaria alliacea. 10 gr. 2 sh. :: ≠

» turkestanica. :: ≠

Pentstemon acuminatus. R

» albus. R

» antirrhinoides. ^

» arizonicus. R

» atropurpureus. R

» Bradbury. R

» cæruleus. V R +

» carinatus. R

» Cobcæ. R.

» centranthifolius. R ^

» cyananthus. R

» diffusus. R

» digitalis. V R +

» gentianoides. V

» glaucus. 10 gr. 2 sh. R

» Gordoni splendens. R

» gracile. R

» gracilentus. R

» heterophyllus. R +

» humilis. 10 gr. 8 sh. ||| R B

» hybridus hortensis (les meilleures

variétés des jardins; excellentes plantes de décoration). V

Pentstemon Jamesi. R

» lævigatus. 10 gr. 2 sh.

» latifolius. R

» linarioides. 10 gr. 8 sh. ||| R B f

» Menziesii. R |||

» Murrayanus grandiflorus. R

» ovatus. 10 gr. 4 sh. V

» pubescens. 10 gr. 1 sh. V + R

» pygmæus. R

» Richardsonis. R

» rubricaulis. R

» scouleri. R

» spectabilis. R

» venustus. 10 gr. 4 sh. R

» virgatus. R

» Watsoni. R

» Wrightii. R

Les Pentstemon sont les Digitales de l'Amérique du Nord; ce sont de bonnes plantes vivaces de plates-bandes ou de rochers qui fleurissent longtemps et sont très ornementales. On ne saurait trop en vanter la rusticité et la longue floraison; leurs fleurs sont d'entre les meilleures pour les bouquets. Il en est dont les teintes bleu d'azur rappellent les gentianes des Alpes.

Pericome caudata. V R

Petalostemon candidus. R

» tenuifolius. R

Petasites albus. ÷

» niveus. ÷

Petrocoptis Lagascæ. |||

Phaca alpina. 10 gr. 2 sh. † R

Phlomis alpina. V R

» Lychnitis. R

» Samia. V R +

Phlox acuminata. R

» canadensis. ± B

» decussata, les meilleures variétés des jardins en mélange. 10 gr. 2 sh.

V +

» fruticosa. R

» maculata. R

Phygeliuss capensis. 10 gr. 4 sh.

Physalis alkekengi (Alkekenge ou Coqueret).

10 gr. 2 sh. :: ≠

» Franchetti. R ::

Physochlaina orientalis. R O

Physostegia virginiana. 10 gr. 2 sh. V +

» » alba.

Phyteuma austriaca. R

» betoniaefolium. R |||

» canescens. 10 gr. 6 sh. R

» carestiae. 10 gr. 6 sh. R

» charmeli. R

» comosum. ||| *

- Phyteuma corniculatum*. R |||
 » *globulariæfolium*. ||| *
 » *hemisphæricum*. 10 gr. 12 sh. |||
 » *humile*. ||| *
 » *nigrum*. R
 » *orbiculare*. 10 gr. 8 sh. Pr R
 » *pauciflorum*. |||
 » *repandum*. ||| R
 » *Scheuchzeri*. |||
 » *serratum*. R |||
 » *Sieberi*. R
 » *spicatum*. 10 gr. 4 sh. O ÷÷
 » *Wagneri*. R
Phytolacca decandra. V
 » *hexandra*. V
Pingicula alpina. T
 » *grandiflora*. T
 » *longifolia*. T
 » *Reuteri*. T
 » *vulgaris*. T
Pinus Cembro (Arolle).
Piptanthus nepalensis. †
Pittorporum crassifolium. † ^
Plagiis ageratifolius. ^ R
Plantago argenta. R ≠
Platycodon autumnale. 10 gr. 1 sh. V + R
 » *grandiflorum*. 10 gr. 1 sh. V + R Pr
 » " album.
 » " à fl. doubles.
 » *Mariesi*. 10 gr. 1 sh. R V
 » " à fl. blanches. 10 gr. 1 sh.
 » " *grandiflora*.
 Ce sont les superbes campanules japonaises aux grandes fleurs fraîchement découpées et vivement colorées en bleu intense, blanc, opale ou azur. Très rustiques, très florifères (juillet-octobre), ce sont des plantes de grand effet et de premier ordre pour la décoration des plates-bandes et rochers.
Podophyllum Emodi. O
 » *peltatum*. O
Polemonium cœruleum. 10 gr. 1 sh. R V Pr H
 » " album. 10 gr. 1 sh.
 » " carneum.
 » " *Rhæticum*.
Polemonium filicinum. R
 » *flavum*. R
 » *foliosissimum*. R
 » *grandiflorum*. R
 » *humile*. R
 » *Himalayense*. R
 » *molle*. R
 » *pauciflorum*. R
 » *pulchellum*. R
 » *reptans*. R ±
 » *Richardsoni*. R

Les *Polémoines* sont d'admirables plantes vivaces, formant de jolies

- touffes d'une verdure fine et gaie, et portant de beaux panicules de fl. bleues, blanches ou jaunes odorantes.
Polygala chamæbuxus. 10 gr. 6 sh. O ± ÷÷
 » *Varedæ*. ± ½ O
Polygonatum giganteum. ÷ O
 » *multiflorum*. ÷÷
 » *verticillatum*. 10 gr. 2 sh. O R ÷÷
 » *vulgare*. R O ÷÷
Polygonum alatum. R
 » *amplexicaule*. V R
 » *Auberti*. f
 » *Baldschuanicum*. 10 gr. 4 sh. f
 » *Bistorta*. 10 gr. 2 sh. H Pr
 » " *v. angustifolia*.
 » *Brunonis*. R :: ≠
 » *Emodi*. ± R ≠
 » *Sieboldi*. V
 » *sphærostachyum*. T
 » *ussuriense*. R
 » *viviparum*. T
 » *Weyrischii*. R
Potentilla adjarica. R
 » *alchemilloides*. R ±
 » *alpestris*. R ±
 » *ambigua*. R ±
 » *argentea*. R
 » *argyrophylla*. R ±
 » *atrosanguinea*. 10 gr. 2 sh. V R +
 » *aurea*. ||| R ±
 » *Baldensis*. |||
 » *bifurca*. ±
 » *caucasica*. R
 » *caulescens*. |||
 » *chinensis*. R
 » *chrysantha*. 10 gr. 2 sh.
 » *Clusiana*. |||
 » *crinita*. R
 » *delphinensis*. R ±
 » *Engadinensis*. R ±
 » *Fenzlii*. ± |||
 » *fragiformis*. R
 » *Friedrichseni*. R †
 » *frigida*. ||| *
 » *fruticosa*. † R
 » *fulgens*. X R
 » *glandulosa*. R
 » *gracilis*. R
 » *grandiflora*. R
 » *Hippiana*. R ±
 » *Hookeriana*. R
 » *Hortensis* (var. hort. mélange.)
 » *incanescens*. ± |||
 » *Kurdica*. ± R
 » *laciniosa*. R
 » *Laponica*. R
 » *Leopolina*. R
 » *Levieri*. R
 » *micrantha*. R
 » *montenegrina*. R

Potentilla mooniana. X T
 » *multifida*. R
 » *Nepalensis*. 10 gr. 2 sh. +
 Superbe espèce à fleur rose tendre
 veinées de carmin.
 » *nitida*. || ±
 » *navalis*. ±
 » *nivea*. *
 » *norvegica*. R
 » *pedemontana*. R
 » *peduncularis*. ± R
 » *petiolulata*. |||
 » *pulcherrima*. R
 » *pyrenaica*. R
 » *recta*. 10 gr. 3 sh. R ≠
 » *rupestris*. 10 gr. 4 sh. R ≠
 » *Salesowiana*. 10 gr. 8 sh. R H
 » *sanguisorbæfolia*. 10 gr. 3 sh. R
 » *Saxifraga*. ||| *
 » *sibbaldi*. ±
 » *speciosa*. ± R
 » *discolor*.
 » *tanacetifolia*. R
 » *taurica*. R
 » *Tormentilla*. R H
 » *Transcaapiensis*. 10 gr. 2 sh. R
 » *tridentata*. |||
 » *valderia*. R
 » *virgata*. R
 » *viscosa*. R
 » *Visiani*. R
 » *Willmottiana*. 10 gr. 4 sh. V R +
 » *Wrangeliana*. R
Pratia angulata. T R
Prenanthes purpurea. O ÷
Primula acaulis. O ÷ Pr
 » *var. à fl. bleues*. R
 » *var. orientalis*. R
 » *admontensis*. |||
 » *algida*. T X
 » *Allionii*. |||
 » *angustidens*. R
 » *Arctotis*. |||
 » *Auricula* (type alpin). 10 gr. 6 sh.
 R |||
 » *Auricula* var. horticoles.
 » *marginata*.
 » *pallida*.
 » *auriculata*. T 1/2 O
 » *Balbisii*. |||
 » *Beesiana*. R T
 » *bella*. |||
 » *Bellunensis*. |||
 » *Berninæ*. |||
 » *Bulleyana*. R T
 » *cadinensis*. |||
 » *calycina*. ||| N
 » *capitata* (vrai, bleu foncé). T X
 » *capitellata*. T
 » *carniolica*. |||

Primula carpathica. R
 » *cashemiana*. 10 gr. 8 sh. R 1/2 O
 » *alba*.
 » *grandiflora*.
 » *ciliata*. |||
 » *Clusiana*. R |||
 » *Cockburniana*. R
 » *commutata*. |||
 » *cortusoides*. O
 » *Cottia*. ||| N
 » *crenata*. ||| N
 » *crispa*. R X T
 » *darialica*. R T
 » *decipiens*. |||
 » *deflexa*. R T
 » *denticulata*. R
 » *var. alba*.
 » *discolor*. |||
 » *elatior*. Pr 1/2 O
 » *grandiflora*. 1/2 O
 » *Facchini*. ||| N
 » *farinosa*. H R T
 » *grandiflora*.
 » *Flœrkeana*. ||| N
 » *Florariensis*.
 Espèce géante, hybride probable
 entre les Pr. *Beesiana* et « *Unique* ».
 Elle atteint 90 cent. de haut, a des
 tiges portant jusqu'à 10 étages de
 fleurs rose carné vif avec un oeil
 jaune d'or au centre. Une seule pl.
 a fourni 14 tiges fl. l'été passé, dans
 un sol frais. T R
 » *floribunda*. ^ X
 » *Forbesi*. ^ X
 » *Forresti*. ^ R
 » *frondosa*. 10 gr. 10 sh. H
 » *glaucescens*. 10 gr. 8 sh. ||| N
 » *grandis*. 10 gr. 6 sh. H
 » *hirsuta* (très belle espèce à fl. car-
 min). 10 gr. 8 sh. ||| N R
 » *integrifolia*. 10 gr. 10 sh. R N
 » *intermedia*. |||
 » *intricata*. R
 » *involucrata*. R H
 » *japonica*. 10 gr. 3 sh. R 1/2 O
 » *alba*.
 » *marmorata*.
 » *purpurea*.
 » *picta*.
 » *Juliae*. R N X
 » *kewensis*. ^
 » *latifolia* (graveolens). || N
 » *leucophylla*. R
 » *Lishangiensis*. X R
 » *Littoniana*. T
 » *longiflora*. T R
 » *longiscapa*. R T
 » *luteola*. O X
 » *Lyssadell* hybrid. H R

Primula macrocalyx. R

- » *magellanica.* T
- » *malacoides.* \wedge
- » » *alba.*
- » *marginata.* ||| N R
- » *megasæfolia.* X
- » *mollis.* X T
- » *Murettiana.* ||| N
- » *muscardioides.* T
- » *œnensis.* ||| N
- » *officinalis.* Pr
- » *Pallasii.* R
- » *Parryi.* T ||| N R
- » *patens.* O
- » *pedemontana.* ||| N R
- » *Poissoni.* H
- » *Portæ.* ||| N
- » *pubescens.* |||
- » *pulverulenta.* 10 gr. 8 sh. H
- » *reticulata.* X $\frac{1}{2}$ O
- » *rosea.* 10 gr. 10 sh. H
- » » *grandiflora.*
- » *saxatilis.* $\frac{1}{2}$ O
- » *scottica.* T
- » *Sieboldi.* X
- » *Siebthorpi.* $\frac{1}{2}$ O \div
- » *Sikkimensis.* 10 gr. 8 sh. H $\frac{1}{2}$ O
- » *spectabilis.* ||| N R
- » *suaveolens.* R
- » « Unique ». H
- » *variabilis, var. anglaises en mélange.*
10 gr. 6 sh.
- » *Veitchi.* X \wedge
- » *venusta.* |||
- » *veris* (mélangedes meilleures variétés
anglaises). 10 gr. 6 sh. Pr R B \div
- » *veris à fl. bleues.*
- » *verticillata.* \wedge
- » *villosa.* ||| N
- » *viscosa.* 10 gr. 8 sh.
- » » *alba.*
- » *vittata.* H
- » *Warei.* T
- » *Wulfeniana.* ||| R

Prunella alba. \pm R

- » *grandiflora.* 10 gr. 6 sh. \pm B Pr
- » » *purpurea.* \pm B Pr
- » *incisa rubra.* 10 gr. 6 sh. Carmin
très intense; floraison prolongée;
pl. excell. pour tapisser.
- » *laciniata.* R
- » *lesol.* \pm B R Pr \neq

Psoralea bitumimosa. \wedge

- » *macrostachya.* R

Pterocephalus (scabiosa) Parnassi. \pm

Pulmonaria officinalis. \div

- » *rubra.* R O

Putoria calabrica. R S

Pycnanthemum lanceolatum. R

Pyrethrum argenteum. R

Pyrethrum corymbosum. \div

- » *densum.* R
- » *macrophyllum.* R \div \neq
- » *roseum.* V +
- » *sericeum.* \pm

Pyrola umbellata. T

Pyrus nigra. +

Ramondia Nathaliæ. ||| I

- » *pyrenaica.* ||| N
- » » *alba.*
- » » *rosea.*
- » *serbica.* ||| N

Ranunculus aconitifolius. 10 gr. 2 sh H $\frac{1}{2}$ O

- » *alpestris.* 10 gr. 8 sh. ||| N
- » *amplexicaulis.* 10 gr. 8 sh. R
- » *anemonæfolius.* R
- » *anemonoides.* R
- » *Baldshuanensis.* R
- » *bilobus.* ||| N
- » *Boissieri.* R
- » *caucasicus.* R
- » *Constantinopolitanus.* R
- » *crenatus.* ||| N
- » *creticus.* R
- » *glacialis.* 10 gr. 10 sh. T R
- » *graminæus.* 10 gr. 4 sh. R S
- » *hybridus.* T
- » *Illyricus.* R
- » *millæfoliatus.* R
- » *monspessulanus.* R
- » *montanus.* Pr R
- » *parnassifolius.* 10 gr. 8 sh. R S
- » *platanifolius.* H
- » *pygmæus.* T
- » *pyrenæus.* 10 gr. 4 sh. Pr R
- » *rutæfolius.* R
- » *Seguieri.* R |||
- » *serbicus.* R
- » *Thora.* 10 gr. 2 sh. Pr R
- » *Traunfellneri.* ||| N

Rehmania angulata. \wedge

Reseda complicata. R

- » *glauca.* R

Rhamnus pumila. ||| S

Rhaponticum cinarioides. 10 gr. 2 sh. R

- » *Heleniifolium.* 10 gr. 2 sh. R

Rheum caspicum. V

- » *Collinianum.* V
- » *corallinum.* V
- » *Emodi.* V
- » *officinale.* V
- » *palmatum.* V
- » *tataricum.* V
- » *Wilsonianum.* V

Rhodiola linifolia. |||

- » *rosea (Sedum Rhodolia).* |||
- » *rubra.* |||

Rhododendron chamæcistus. 10 gr. 20 sh. |||

- » *ferrugineum (La Rose des Alpes).*
10 gr. 4 sh. X $\frac{1}{2}$ O

- Rhododendron ferrugineum* album.
 » *hirsutum*. 10 gr. 4 sh. $\frac{1}{2}$ O
 » *intermedium*.
 » *Kamtschaticum*. *
Rodgersia æsculifolia. H
 » *podophylla*. H
 » *tabularis*. H
Rodhea japonica. O
Romanzoffia Sitchensis. T H
Romneya Coulteri. V S
Rosa alpina. 10 gr. 1 sh.
 » *pimpinellifolia*. 10 gr. 1 sh.
 » *rugosa*. 10 gr. 1 sh.
 » *rubiginosa* (Sweet bryar). 10 gr. 1 sh.
Rosmarinus officinalis. R S
 » *prostratus*. \wedge
Rubia peregrina. $\neq ::$
Rubus arcticus. R
 » *chamæmorus*. T
 » *laciniatus*. f
 » *saxatilis*. ::
Rudbeckia bicolor. V +
 » *californica*. 10 gr. 2 sh. V +
 » *conspicua*. 10 gr. 2 sh. V +
 » *flava*. 10 gr. 2 sh. V +
 » *fulgida*. 10 gr. 2 sh. V +
 » *hirta*. 10 gr. 2 sh. V +
 » *intermedia*. 10 gr. 4 sh. V +
 » *laciniata*. 10 gr. 2 sh. V +
 » *nitida*. V +
 » *occidentalis*. V +
 » *purpurea*. 10 gr. 2 sh. V +
 » » *grandiflora*. 10 gr. 4 sh.
 V +
 » *purpurea nana*. V +
 » » *splendens*. 10 gr. 4 sh. V +
 » *pinnata*. V +
 » *subtomentosa*. V +
 » *variabilis*. V +
 Les Roubecques sont d'entre les meilleures et les plus précieuses des pl. vivaces; leurs fleurs, très apparentes, en capitules jaune et noir chez la plupart, rouge sombre ou carmin chez *intermedia purpurea*, durent longtemps et sont excellentes pour la fleur coupée. Culture des plus facile.
Ruellia ciliosa. R
Rumex flexuosus (feuillage brun foncé). R
 » *pulches*. R
 » *venosus*. R \neq
Ruscus aculeatus. O \div
 » *hypophyllum*. O \div
 » *racemosus*. O \div
Ruta angustifolia. R \neq
 » *graveolens*. 10 gr. 1 sh. R \neq
 » *patavina*. :: R \neq
Sagina Linnæi. R
 » *subulata*. R

- Salix reticulata*. R \pm
 » *retusa*. R \pm
Salvia æthiopis. R
 » *argentea*. R
 » *azurea*. 2 gr. 1 sh. V +
 » » *grandiflora*.
 » *bicolor*. \wedge
 » *bracteata*. R
 » *candelabrum*. R
 » *cypria*. R \pm
 » *exigua*. R
 » *globosa*. R
 » *glutinosa*. R \div
 » *Horminum*. | \neq
 » *officinalis*. \pm R \neq
 » » *alba*.
 » » *major*.
 » *pratensis*. 10 gr. 2 sh. Pr R
 » » *alba*.
 » *ringens*. R
 » *roseifolia*. R
 » *scabiosæfolia*. \pm R
 » *Sclarea*. \neq
 » *verticillata alba*. \neq
Samolus Valerandi. H T
Sanguinaria canadensis. O
Sanguisorba canadensis. H
 » *Vallistellinæ*. H
Sanicula europæa. O \div
 » *Marylandica*. O \div
Saponaria bellidifolia. 10 gr. 2 sh. R
 » *Boissieri*. |||
 » *cæspitosa*. ||| R
 » *glutinosa*. 10 gr. 2 sh. | \neq
 » *lutea*. 10 gr. 6 sh. ||| R
 » *ocymoides*. 10 gr. 2 sh. \pm ||| R Pr \neq
 » » *splendens*.
 » *officinalis*. :: \neq
 » *pulvinaris*. |||
Sarcocapnos speciosa. |||
Sarothamnus scoparius. X \dagger
Sarracenia purpurea. T
Satureya intermedia. R
 » *montana*. 10 gr. 2 sh. ||| R \neq
Saussurea albescens. R
 » *alpina*. R |||
 » *decurrens*. R |||
 » *depressa*. R |||
 » *discolor*. R |||
Saxifraga adscendens. H
 » *aizoides*. 10 gr. 6 sh. H ||| R
 » » *var. atrorubens*.
 » *Aizoon*. 10 gr. 6 sh. ||| R
 » *ajugæfolia*. \pm $\frac{1}{2}$ O
 » *Alberti*.
 » *Allionii*. \pm B
 » *altissima*. ||| R
 » *ambigua*. ||| R
 » *amœna*. |||
 » *anceps*. R

Saxifraga androsacea. **H**

- » *aphylla*. ||| **N** *
- » *apiculata*. |||
- » *aquatica*. **H**
- » *aretioides*. |||
- » *aspera*. |||
- » *atropurpurea*. **R** ±
- » *augustana*. ||| **N**
- » *australis*. ||| **R**
- » *biflora*. ||| **N**
- » *Blavii*. |||
- » *blepharophylla*. ||| **N**
- » *Boryi*. |||
- » *major*.
- » *Boydei*. |||
- » *brevifolia*. ||| **R**
- » *bronchialis*. **R**
- » *Brunoniana*. × ±
- » *bryoides*. |||
- » *Burseriana*. |||
- » *gloria*.
- » *major*.
- » *cæsia*. |||
- » *cæspitosa*. 10 gr. 8 sh. ± **R B**
- » *californica*. **R**
- » *Camposii*. |||
- » *canaliculata*. ± **R** |||
- » *capitata*. **R**
- » *carinthiaca*. ||| **R**
- » *carniolica*. ||| **R**
- » *carpathica*. **R T**
- » *cartilaginea*. ||| **R**
- » *catalaunica*. ||| **R**
- » *ceratophylla*. **R**
- » *cernua*. **T**
- » *cervicornis*. ± **R B**
- » *chrysopenifolia*. **T**
- » *circuenta*. **R**
- » *cochlearis*. 10 gr. 10 sh. ||| **S R**
- » *coniferæ*. ± |||
- » *controversa*. |
- » *coriophylla*. |||
- » *Corsica*. **R**
- » *Cotyledon*. |||
- » *Cotyledon* × *aizoon*. |||
- » *Cotyledon angustifolia*. |||
- » *crustata*. ||| **R**
- » *major*.
- » *cuneifolia*. **O** ×
- » *Cymbalaria*. |
- » *cymosa*. **R**
- » *dalmatica*. ||| **R**
- » *decipiens*. 10 gr. 10 sh. **B**
- » *demissa*. *
- » *diapensioides*. ||| *
- » *diversifolia*. **T H**
- » *elator*. ||| **R**
- » *Elisabethæ*. |||
- » *erosa*. **R**
- » *exarata*. ± **B R**

Saxifraga Facchini. ||| **N**

- » *Ferdinand-Coburgi*. |||
- » *flagellaris*. ± **T R**
- » *flavescens*. ||| **R**
- » *florulenta*. ||| **N**
- » *Forbesi*. **R**
- » *Fortunei*. **R** ^
- » *Friedrich-Augusti*. |||
- » *Gaudini*. ||| **R**
- » *gemmifera*. ± **R**
- » *geranioides*. ± **R B**
- » *Geum*. 10 gr. 8 sh. **B R** 1/2 **O**
- » *Gibraltarica*. ± |||
- » *globulifera*. ± |||
- » *gracilis*. |||
- » *granulata*. **T R**
- » *granulata* × *decipiens*. **R**
- » *Grisebachii*. |||
- » *Guilford seedling*. ± **R**
- » *Haagii*. |||
- » *Hausmanni*. ||| *
- » *hederacea*. ||| *
- » *Hedraeantha*. |||
- » *heucherifolia*. **R N**
- » *Hieracifolia*. **H**
- » *Hirculus*. 10 gr. 8 sh. **H T**
- » *var grandiflora*.
- » *Hostei*. |||
- » *Hueti*. 10 gr. 8 sh. |
- » *hypnoides*. ± **B**
- » *intacta*. ||| **R**
- » *intricata*. ± **B R**
- » *Iratiana*. **R**
- » *irrigua*. **R** ||
- » *Islandica*. ± **B**
- » *juniperina*. |||
- » *Kolenatiana*. ||| **R**
- » *Kotschyi*. |||
- » *Kyrillii*. |||
- » *Labradorica*. **R T**
- » *lævis*. ||| **N**
- » *Lantoscana*. ||| **R**
- » *lasiophylla*. **R**
- » *latepetiolata*. |
- » *lingulata (vrai)*. ||| **R**
- » *lingulata Alberti*. |||
- » *longifolia*. ||| **R**
- » *longifolia* × *cochlearis*.
- » *multicaulis*.
- » *luteo-purpurea*. |||
- » *luteo-viridis*. |||
- » *Mac Nabiana*. ||| **R**
- » *madeirensis*. ^
- » *mædia (calyciflora)*. |||
- » *mandschouriensis*. **R**
- » *marginata*. ||| **R**
- » *Mertensiana*. **R**
- » *micrantha*. **R**
- » *micranthidifolia*. **R H**
- » *moschata*. ± **R**

Saxifraga muretti. R
 „ *murithii*. ||| N
 „ *muscoides*. \pm R
 „ „ *atrorubens*.
 „ *mutata*. 10 gr. 6 sh. R ||| H
 „ *nervosa*. R
 „ *nivalis*. R N
 „ *Nutkana*. R
 „ *oppositifolia*. 10 gr. 12 sh. ||| N R
 „ „ *grandiflora*.
 „ *Paulinæ*. |||
 „ *pectinata*. ||| R
 „ *pedata*. R
 „ *pedatifida*. \pm R
 „ *pedemontana*. ||| N
 „ *peltata*. H
 „ *pennsylvanica*. H
 „ *pentadactylis*. \pm R
 „ *pentaphylla*. R
 „ *petræa*. |||
 „ *planifolia*. |||
 „ *polyphylla*. R
 „ *porophylla*. |||
 „ *Portæ*. ||| R
 „ *primuloides*. O R
 „ *Probyni*. |||
 „ *Prostii*. \pm R
 „ *pseudo-Kotschyi*. |||
 „ *pseudo-sancta*. |||
 „ *pubescens*. \pm R
 „ *pulchella*. \pm R
 „ *punctata*. R
 „ *purpurescens*. R
 „ *pyramidalis*. ||| R
 „ *recta*. R
 „ *retusa*. ||| N
 „ *rætica*. ||| R
 „ *Rhei superba*. R
 „ *rivularis*. H
 „ *robusta*. ||| R
 „ *Rocheliana*. |||
 „ *rosularis*. ||| R
 „ *rotundifolia*. O
 „ *Salomoni*. |||
 „ *sancta*. |||
 „ *sarmentosa*. $\frac{1}{2}$ O
 „ *scardica*. |||
 „ *Seguieri*. ||| N
 „ *serra*. R
 „ *serratifolia*. R O
 „ *sibirica*. T R
 „ *splendens*. |||
 „ *sponhemica*. \pm R
 „ *squarrosa*. |||
 „ *Stabiana*. ||| R
 „ *stellaris*. H T
 „ *stenoglossa*. ||| R
 „ *stenopetala*. |||
 „ *Sternbergi*. \pm R
 „ *sturmiiana*. ||| R

Saxifraga suprapiaizoides. H
 „ *Taygetaya*. ||| R
 „ *Tellimoides*. H $\frac{1}{2}$ O
 „ *tenella*. \pm R
 „ *Thessalica*. |||
 „ *Tolmiaei*. O
 „ *Tombeanensis*. |||
 „ *tricuspidata*. \pm R
 „ *trifida*. \pm R
 „ *trifurcata*. \pm B
 „ *umbrosa*. O \pm B
 „ *Valdensis*. ||| *
 „ *varians*. R
 „ *villosa*. R
 „ *virginienensis*. T
 „ *Vochinensis*. |||
 „ *Wettsteini*. R
 „ *Willkommiana*. ||| R
 „ *Zelevori*. ||| R
 „ *Zimeterii*. |||
Scabiosa argentea. R
 „ *caucasica*. 10 gr. 6 sh. R V +
 „ „ *alba grandiflora*.
 „ „ *perfecta*.
 „ *cretica*. R
 „ *fumarioides*. R
 „ *graminifolia*. 10 gr. 8 sh.
 „ *japonica*. R
 „ *Lagodechiana*. R
 „ *lyratifolia*. (fl. grenat vif). R
 „ *ochroleuca*. R
 „ *Olgæ*. 10 gr. 8 sh. R
 „ *petræa*. R
 „ *talishensis*. R
Schivereckia Bornmülleri. R
 „ *podolica*. R
Scopolia carniolica. O
Scrophularia Hoppii. R \neq
 „ *juratense*. R \neq
 „ *Marylandica*. R
 „ *pyrenaica*. R
 „ *trifoliata*. 10 gr. 6 sh. Nouveau, très
 belles fleurs rouge brique vif.
 „ *vernalis*. 10 gr. 1 sh. H
Scutellaria alpina. \pm R
 „ „ *à fl. blanches*.
 „ *altissima*. R \neq
 „ *Baikalensis*. 10 gr. 4 sh. R
 „ *lupulina*. R
 „ *macrantha*. R
 „ *orientale*. R
 „ *Siebthorpii*. R
 „ *tuberosa*. R ::
Sedum acre. ||| \neq
 „ *aizoon*. R \neq
 „ *alberti*. R
 „ *albescens*. R
 „ *albidum*. R
 „ *album*. \neq
 „ *alpestre (repens)*. R

Sedun alsinæfolium. |
 » altissimum. R ≠
 » anacampseros. R
 » annuum. |
 » anopetalum. R
 » asiaticum. 10 gr. 8 sh.
 » atratum. |
 » atropurpureum. R
 » Beyrichianum. R
 » carpathicum. R
 » Cepæa. |
 » corsicum. ||| R
 » crenatum. R
 » cruciatum. R
 » dasiphyllum. ||| R
 » divergens. R
 » Douglasi. R
 » Euphorbioides. R ≠
 » Ewersii. R ≠
 » fabaria. R ≠
 » Forsterianum. R ≠
 » gemmi ferum. R
 » glanduliferum. ||| R
 » glaucum. ||| R
 » Hispanicum. 10 gr. 8 sh. |
 » kamtschaticum. 10 gr. 8 sh. R ≠
 » Laggeri. R ≠
 » Littoreum. ||
 » Lydium. R
 » maximowiczii. R ≠
 » maximum. 10 gr. 6 sh. R ≠
 » Middendorffianum. R
 » nicæense. R ≠
 » obtusatum. R
 » olympicum. R
 » oppositifolium. 10 gr. 6 sh. R B R ≠
 » oreganum. R
 » pallidum. R
 » pilosum. ||
 » populifolium. R
 » postalaccoides. R ≠
 » pruinatum. R ≠
 » pulchellum. R ∧
 » purpurescens. R ≠
 » reflexum. R ≠
 » Rhodantum. R
 » rubens (Crassula). |
 » rubricaulæ. R ≠
 » rupestre. R ≠
 » Selskianum. R ≠
 » serotinum. R
 » Sempervivum (Cotyled. Semp.). R |||
 » sexifidum. R ≠
 » spathulifolium. R
 » spectabile. R V B
 » » splendens.
 » spurium. R B ≠
 » Stahlian. ∧
 » stenopetalum. R |||
 » stellatum. R

Sedun stoloniferum. R
 » telephium. R ≠
 » turgidum. R
 » turkestanicum. R
 » Verloti. R ≠
 » villosum. | H
 » wallichianum. R
 Sempervivum acuminatum.
 » alpinum.
 » anomalum.
 » arachnoideum.
 » arvernense.
 » assimile.
 » atroviolaceum.
 » austriacum.
 » boutignanum.
 » Braunii.
 » bungeanum.
 » Christii.
 » ciliosum.
 » cinarescens.
 » comoli.
 » debile.
 » dolimiticum.
 » Fauconnetti.
 » fimbriatum.
 » flagelliforme.
 » Fontanæ.
 » gaudini.
 » glaucum.
 » globiferum.
 » Haussmanni.
 » heterotlichum.
 » heuffeli.
 » hirtum.
 » holochrysum.
 » Juratense.
 » Kapaornikense.
 » Lamottei.
 » leucanthum.
 » mettenianum.
 » Moggridgei.
 » montanum.
 » Morelianum.
 » ornatum.
 » parvulum.
 » patens.
 » Pittonii.
 » pomelii.
 » pyrenaicum.
 » Reginæ-Amaliæ.
 » Requiinii.
 » robustum.
 » rubicundum.
 » rupicolum.
 » speciosum.
 » spinulifolium.
 » tectorum.
 » tenellum.
 » Theobaldi.

Sempervivum Thomayeri.

- » tomentosum.
- » triste.
- » Valesiacum.
- » veninensis.
- » Webbianum.
- » Wulfeni.
- » Zelebori.

Senecio carpathica. R

Senecio abrotanifolius. R

- » adonidifolius. R
- » ætnensis. R
- » alpinus. $\frac{1}{2}$ O
- » aurantiacus (*Cineraria aurant.*). R
- » Buchanani. R \wedge
- » carnolicus. 10 gr. 10 sh. R |||
- » clivorum. R V
- » cordatus. R O
- » coriaceus. R
- » doricum. R
- » Fendleri. R |||
- » Fuchsii. 10 gr. 8 sh. O \div
- » incanus. 10 gr. 10 sh. ||| R T
- » Jacobæus. R H
- » jacquinianus. O \div
- » Ligularia. V
- » macrophyllus. V
- » nebrodensis. R
- » othonæ. R
- » palmatifidus. R
- » pulcher. \wedge R
- » quinqueligulatus. R
- » sarracenicus. 10 gr. 8 sh. O \div
- » stenocephalus. 10 gr. 1 sh. V
- » Tanguticus. ::
- » thapsoides. R
- » tyrolense. R
- » uniflorus. T
- » Veitchianus. V
- » Wilsonianus. V

Serratula nudicaulis. R

Seseli caespitosa. 10 gr. 4 sh. \pm

- » gummifer. R \neq

Sibbaldia maxima. \times R

- » parviflora. \times R
- » procumbens. \times R

Sidalcea candida. R

- » malvæflora. R
- » oregana. R
- » spicata. R

Sideritis Eubæa. R

- » hisso-pifolia. R \neq
- » taurica. R

Silene acaulis. 10 gr. 8 sh. ||| R \pm

- » alba.
- » grandiflora.
- » alpestris. 10 gr. 4 sh. \pm R
- » alpina. 10 gr. 2 sh. ||| \neq
- » armeria. |
- » asterias. 10 gr. 2 sh. ||

Silene asterias grandiflora.

- » bryoides. 12 gr. 10 sh. \pm |||
- » Campanula. |||
- » ciliata. R
- » compacta. R
- » cordifolia. |||
- » Correvoniana. R |||
- » dinarica. R
- » Drummondi. R
- » Elisabethæ. ||| N
- » elongata. ||| R
- » exscapa. 10 gr. 10 sh. ||| \pm
- » fimbriata. R
- » Fortunei. 10 gr. 4 sh. ||
- » Legionensis. ||| R
- » Lerchenfeldiana. R
- » maritima. ||| R
- » monachorum. ||| N
- » odontopetala. R
- » oreades. R
- » petræa. R
- » pudibunda. ||| R N
- » pumilio. |||
- » pusilla. ||| N
- » quadrifida. ||| N
- » reichenbachiana. R
- » rupestris. ||| R \times
- » rupicola. R
- » saxifraga. 10 gr. 4 sh. R \neq
- » Schafta. 10 gr. 4 sh. R ||| B \neq

L'une des rares plantes saxatiles d'automne; fl. d'un carmin vif, culture facile.

- » Tomasiniana. ||| N
- » valesia. \neq
- » Veselowskvi. R
- » Zawadsky. R ||| \neq

Silphium lanceolatum. V

- » terebinthinaceum. V

Sissimbrium strictissimum. R \neq

Sissyrinchium anceps.

- » Bermudianum.
- » californicum. R
- » iridifolium. R

Smilacina amplexicaulis. \times O

- » racemosa. O \times
- » stellata. O \times

Smilax aspera. f

- » herbacea. R

Sobolewsia clavata. R

Soldanella alpina. 10 gr. 6 sh. R T

- » Clusii. R T
- » montana. R T
- » pusilla. R T
- » pyrolæfolia. R T

Solidago alpestris. R

- » canadensis. V
- » Drummondi. V
- » glaber. R
- » humilis. R

Solidago missouriensis. **R**
 » *nitida*. **R**
 » *pallida*. **V**
 » *puberula*. 10 gr. 2 sh.
 » *reflexa*. 10 gr. 2 sh. **V**
 » *Riddeli*.
 » *rigida*. 10 gr. 2 sh.
 » *rigidiscula*. 10 gr. 2 sh.
 » *Shortii*. **V** +
 » *spectabilis*. **V** +
Spartium junceum. 10 gr. 2 sh. Le beau
 genêt d'or du Midi.

Sphæralcea acerifolia. \wedge
 » *Munroana*. \wedge
Spigelia Marylandica. **H**
Spiræa filipendula. **H**
 » *Kamtschatica*. **H**
 » *palmata*. **H**
Specularia speculum. 10 gr. 4 sh. |
Stachys coccinea. \wedge
 » *corsica*. **R T**
 » *lanata*. **B** \neq
 » *scardica*. **R**

Statice articulata. $\| \|$ **R**
 » *coccinea*. $\| \|$
 » *Gmelini*. **V R**
 » *latifolia*. **V R**
 » *minuta*. $\| \|$
 » *occidentalis*. $\| \|$
 » *sinensis*. **R**
 » *Suworowi*. **R**

Statice des Canaries.
 » *arborescens* (Statice en arbre).
 » *brassicæformis*.
 » *hybrida*.
 » *imbricata*.
 » *macrophylla*.
 » *macroptera*.
 » *Perezii*.
 » *Perezii* \times *inbricata*.
 » *puberula*.

Ces superbes plantes s'élèvent très facilement de graines. Non rustiques chez nous elles constituent une précieuse décoration pour serres froides et appartements. Elles donnent, toute l'année, de grandes panicules de fleurs bleues et blanches.

Stipa aristella. **R**
 » *gigantea*. **R**
 » *pennata*. **R** \neq
Stobæa membranifolia. **V**
 » *radula*. **V**
Stockesia cyanea. **R**
Streptopus amplexifolius. **O** \times
 » *roseus*. **O** \times
Stylophorum diphyllum. **O** \div
 » *japonicum*. **O**
 » *lasiocarpum*. **O**
Swertia connata. **T**

Swertia longifolia. **T**
 » *perennis*. **T**
Symphandra armena. $\| \|$ **R**
 » *Hoffmanni*. $\| \|$ **R**
Tamus communis. **S O**
Telekia speciosa. 10 gr. 2 sh. **V** +
 » *speciosissima* (vrai). $\| \|$ **N**
Telephium imperati. 10 gr. 2 sh. $\| \|$ **S**
 » *orientale*. 10 gr. 2 sh. $\| \|$ **S**
Tetragonolobus purpureus. **H**
 » *siliquosus*. **H**
Teucrium Ardoini. **R**
 » *Chamædrys*. 10 gr. 3 sh. **B R** \neq
 » *divaricatum*. **R**
 » *Eugenæum*. **R**
 » *flavum*. **R** \wedge
 » *lucidum*. **R** $\| \|$
 » *lusitanicum*. **R**
 » *marum*. $\| \|$ \wedge
 » *massiliense*. **R** \neq
 » *montanum*. $\| \|$ **R**
 » *orientale*, à fl. très élégantes. 10 gr.
 4 sh. **R** \neq
 » *polium*. **R B** \neq
 » *pseudo-Chamædrys*. **R**
 » *pyrenaicum*. **B R**
 » *Scorodonia*. 10 gr. 2 sh. \div
Thalictrum aquilegifolium. 10 gr. 2 sh. **RO** \div
 » *cornuti*. **R**
 » *dasycarpum*. **R**
 » *Delavayi*. 10 gr. 8 sh. **V R** +
 » *diphterocarpum*. 10 gr. 10 sh. **V R** +
 » *Fendleri*. **R**
 » *flavum*. **H R**
 » *glaucum*. **H R V**
 » *macrocarpum*. **R**
 » *majus*. 10 gr. 2 sh. **R** \neq
 » *minus*. **R** \neq ::
 » *rubellum*. **R**
 » *saxatile*. **R** \neq ::
Thesleria gracilis. **R** ::
Thermopsis montana. :: **R V**
Thladiantha dubia. **f**
Thlaspi bellidifolia. **R** $\| \|$
 » *bulbosa*. **R**
 » *cepæfolia*. **R** $\| \|$
 » *limosellæfolia*. $\| \|$
 » *rotundifolia*. 10 gr. 8 sh. $\| \|$ **T**
 » *violascens*. **R**
Thymus marchallianum. **R** \pm \neq
 » *serpyllum*. **R** \pm \neq
Tiarella cordifolia. 10 gr. 2 sh. **O** \div
 » *poliphylla*. **O**
 » *purpurascens*. **O**
Tofieldia calyculata. **H T**
 » *glacialis*. **H T**
Tolmizæ Menziesii. **O**
Towsendia grandiflora. $\| \|$
 » *Wilcoxiana*. $\| \|$
Trachelium cœruleum. \wedge

Tradescantia undulatifolia. R
Tragopogon porrifolius. || ≠
Trautvetteria palmata. O X
Trientalis europea. O X
Trifolium alpinum. 10 gr. 5 sh. Pr R
 » *Badium.* Pr R
 » *rulens.* Pr
 » *spadiceum.* Pr R
Trillium atropurpureum. H O
 » *cernuum.* H O
 » *Kamtschaticum.* H O
 » *pendulum.* H O
Triosteum pinnatifidum. †
Tritoma, voir Kniphofia.
Trollius albiflorus. H
 » *altaicus.* H
 » *americanus.* H
 » *asiaticus.* H
 » *aurantiacus.* H
 » *caltheoides.* H
 » *europæus.* 10 gr. 2 sh. H
 » *hybridus.* H
 » *japonicus.* H
 » *ledebourii.* H
 » *sibiricus.* H
 » *yunnanensis.* H
Tropæolum poliphyllum. R
 » *pentaphyllum.* R
Tulipa greigii.
 » *marjoletti.*
 » *Turkestinaca.*
Tunica saxifraga. 10 gr. 2 sh. || ≠
 » *alba.* 10 gr. 2 sh. || ≠
Ulex europæus (ajonc). 10 gr. 2 sh. †
Umbilicus pendulinus. ||
 » *semenovi (v. en outre Cotyledon).*
Uniola latifolia. V +
Uropetalum viride. R
Vaccinium Myrtillus (Myrtille). X ::
 » *uliginosum.* X ::
 » *Vitis-Idæa (Airelle).* X ::
Valeriana alliaricefolia. R +
 » *celtica.* *
 » *dioica.* H
 » *Dioscoridis.* R
 » *globularicefolia.* R
 » *integrifolia.* R
 » *longiflora.* |||
 » *montana.* R |||
 » *officinalis.* H
 » *pyrenaica.* R
 » *Saliunca.* ||| R
 » *supina.* ||| R
 » *tripteris.* R |||
Vancouveria hexandra. O ::
Vella spinosa. |||
Veratrum album. R
 » *californicum.* R
 » *nigrum.* R
Verbascum Blattaria. ≠

Verbascum mucronatum. ≠
 » *Olympicum.* ≠
 » *Phœniceum.* R
 » *Songaricum.* R ≠
 » *Thapsus.* ≠
Verbena venosa. R
Vernonia altissima. V
 » *Arkansana.* V
 » *gigantea.* V
 » *glauc.* V
Veronica Allionii. ± ||| R
 » *alpina.* ||| N
 » *amethystina.* R
 » *aphylla.* ||| R
 » *argentea.* R
 » *austriaca.* R
 » *Balcana.* R
 » *bellidioides.* R X
 » *Biebersteiniana.* R
 » *buxifolia.* †
 » *carnea.* R
 » *caucasica.* R ±
 » *Chamœdrys.* R B ± Pr ≠
 » *crassifolia.* 10 gr. 2 sh. R V +
 » *foliosa.* R
 » *fruticulosa.* ± ||| R
 » *gentianoides.* ± R
 » *grandis.* R
 » *Hulkeana.* † ^
 » *incana.* ± R
 » *longifolia.* 10 gr. 2 sh. V +
 » *maritima.* 10 gr. 2 sh. V +
 » *alba.*
 » *rosea.*
 » *maxima.* V +
 » *malisseaefolia.* ± R
 » *multifida.* R
 » *nummularia.* ± R
 » *officinalis.* ± ::
 » *orchidea.* R
 » *oxyphilla.* R
 » *paniculata.* 10 gr. 2 sh. V + R
 » *pectinata.* R
 » *Ponæ.* R
 » *prenja.* R
 » *prostrata.* ± R
 » *alba.*
 » *rupestris.* ± R
 » *satureyoides.* ||| R
 » *saxatilis.* ||| R
 » *à fl. blanches.*
 » *spuria.* R
 » *serpyllifolia.* ± R
 » *spicata.* ± R S
 » *à fl. blanches.*
 » *stenophylla.* R
 » *tenuifolia.* R
 » *Teucrium.* 10 gr. 2 sh. R Pr ≠
 » *Traversi.* 10 gr. 4 sh. † R +
 » *urticifolia.* O ::

Veronica Whitalli. R

Vesicaria græca. ||| R

» utriculata. 10 gr. 2 sh. ||| ≠

Vicia aurantiaca.

Vicia amœna. R

» dumetorum. ÷÷

» fulgens. R

» Onobrychioides. R

» Orobus. R

» pyrenaica. :: ≠

» unijuga. R

Viola adunca.

» altaica. R

» arenaria. R

» atlantica. R

» Bertolini. R

» biflora. O R T

» Bosniaca. R

» calcarata. 10 gr. 6 sh. R Pr

» » alba.

» » flavescens.

» » grandiflora.

» » semperflorens.

» » tricolor.

» campestris. R

» canadensis. R

» canina. R ÷÷

» » rubra.

» cenisia. ||| R

» chinensis. R

» cognata. R

» comollia (vrai). ||| *

» cornuta. 10 gr. 2 sh. R B

» » à fl. blanches. 10 gr. 2 sh.

» » var. perfection.

» » var. à fl. roses.

» cucullata. $\frac{1}{2}$ O

» declivis. R Pr ≠

» delphinantha. *

» delphinifolia. R

» dissecta. ÷÷

» distans. ÷÷

» elatior. H R

» Florariensis (variété hybride, voisine de rothomagensis et qui fleurit

perpétuellement; l'une des meill. fl. alpines). 10 gr. 2 sh. R ||| B V ≠

Viola Florar. alba.

» » tricolor.

» glabella. R

» gracilis. R

» heterophylla. |||

» Jovi. R

» Labradorica. R

» latisepala. R

» lutea. R

» lutescens. ||| N R

» macedonica. R

» multifida. R

» munbyana. R

» nuttalli. R

» olympica. R

» oreocallis. R

» orphanides. R

» palmaris. R

» palmata. R

» palustris. H

» Patrini. R

» pedatifida. R

» pinnata. R

» pubescens. O

» pumila. R

» Riviniana. R

» rothomagensis. R |||

» sagittata. R

» sarmentosa. R

» splendida. R B

» Tommasiniana. |||

» Valderia. ||| R

» Wiedemanni. R

» Zoyzii. R

Vittadenia triloba. |||

Wahlenbergia gracilis. R

» lobelioides. R

Wiedemannia orientalis. R

Wulfenia carinthiaca. ||| X

Wyettia angustifolia. R +

Xanthoceras sorbifolia. 10 gr. 1 sh. +

Yucca glauca. V

Zauschneria californica. ± R

LES

PLANTES DES MONTAGNES ET DES ROCHERS

FOUGÈRES et ORCHIDÉES RUSTIQUES

Leur Culture dans les Jardins

par

H. CORREVON

Un volume illustré in-12.

Honoré de la médaille d'or de la Société nationale d'Horticulture de France
et de plusieurs prix d'honneur aux Expositions d'horticulture.

A la demande, fréquemment renouvelée, de rééditer plusieurs de ses ouvrages sur les plantes (dont treize sont entièrement épuisés à l'heure actuelle), M. H. Correvon a répondu par un nouveau travail, beaucoup plus considérable que tous les autres et qui peut être considéré comme les résu-
nant tous. C'est un gros volume in-12, de 491 pages, illustré par M. Fernand Correvon, et dont voici la table des matières :

- Préface.
- Chap. I. — Les plantes dans les montagnes. Leur caractère particulier ; leur nature ; leurs conditions d'existence.
- » II. — Acclimatation, semis et culture des plantes de montagnes.
- » III. — Cultures spéciales. Cultures dans le sphagnum, en terrines, en baquets ; la tourbière et la moraine.
- » IV. — Les plantes silicicoles ou calcifuges par le Dr Rosenthal.
- » V. — Les plantes saxatiles et murales ; les murs fleuris.
- » VI. — Construction des rocailles.
- » VII. — Jardins alpins et jardins botaniques alpins.
- » VIII. — Liste des plantes de montagnes cultivées dans les jardins. Leur indigénat, l'époque de leur floraison, leur description sommaire avec indication de la culture convenant à chacune d'elles.
- » IX. — Floraire. L'umbrosum ; toit fleuri ; gazons fleuris ; cultures sur radeau.
- » X. — La fougeraie.
- » XI. — Les orchidées de pleine terre.
- » XII. — Cactées rustiques.
- » XIII. — Les lys.
- » XIV. — La « Florarina ».
- Index alphabétique des genres du chapitre VIII.
- » des chapitres X, XI, XII et XIII.
- » des noms français.

Le volume est en vente chez l'auteur, à « Floraire », au prix de
10 francs, port en sus.

LISTE DES OUVRAGES DE M. H. CORREVON :

Les plantes des Alpes. Genève 1886	Epuisé	
Les Fougères rustiques. Genève 1890	»	
Les Orchidées rustiques. Genève 1893	Presque épuisé	Prix : Fr. 5.—
Le jardin de l'herboriste. Genève 1896	»	5.—
Flore coloriée de poche (1 ^{re} et 2 ^{me} éd.)	Epuisé	
Flora tascabile (1 ^{re} et 2 ^{me} éd.)	»	
Les plantes alpines et de rocailles	»	
Les Fougères de pleine terre	»	2. 50
Les Iris dans les jardins (Correvon et Massé)	Presque épuisé	4.—
Nos Cimetières (Publié par les soins de la Commission d'art public)	»	
Culture des plantes alpines dans le Sphagnum	»	1.—
Della cultura delle piante alpine nelle regioni secche e calde	»	1.—
Album des Orchidées de l'Europe	Epuisé	
Atlas de la Flore alpine (édité par les soins du Club alpin)	Epuisé	
Fleurs et Montagnes. Un vol. de poésies	Epuisé	
Par monts et par vaux (courses de montagnes).	Presque épuisé	6.—
Nos arbres. Un vol. in-8°, richement illustré	»	7. 50
La Flore alpine. Un vol. richement illustré	Epuisé	
The Alpine Flora, translated into english by Mr. E.-W. Clayforth; a superb vol. with 180 pictures of alpine pl. in watercolours. (Methuen)	»	18.—
Fleurs des champs et des bois; 100 plates representing 180 plants of the swiss mountains and fields, splen- didely painted and executed. It is one of the most beautiful books which as ever been made on the subject	£ 1	25.—
Les plantes des montagnes et des rochers.		

Les volumes de M. H. Correvon ont remporté le Prix d'honneur aux deux Expositions nationales suisses de 1896 et 1914 et un grand nombre de médailles d'or et d'argent, etc.

The books of Mr. H. Correvon have got the « Prix d'honneur » in the National Swiss exhibitions of 1896 and 1914, and a great number of diplomes, of gold and silver medals and of distinctions.

86.7
C821
HIVER 1919-1920

LISTE DES GRAINES

OFFERTES PAR LE

JARDIN CORREVON

(Jardin alpin d'acclimatation)

Floraire — Chêne-Bourg, GENÈVE

34^{me} CATALOGUE DE GRAINES

Seeds of alpine and perennial plants

OFFERED BY

M. H. CORREVON

Floraire Nursery, GENEVA.

Gardening Books

Of the 21 books Mr. Correvon has published on gardening matters, more than half of them are already exhausted. The continual and pressing demand for them has decided the author to reproduce three of them in one volume which forms a complete summary of what has been already published.

This makes a big volume in-12, illustrated, of 491 pages.

LES

PLANTES DES MONTAGNES ET DES ROCHERS

FOUGÈRES et ORCHIDÉES RUSTIQUES

Leur Culture dans les Jardins

Contents of the book :

Préface.

- Chap. I. — Les plantes dans les montagnes. Leur caractère particulier; leur nature; leurs conditions d'existence.
- » II. — Acclimatation, semis et culture des plantes de montagnes.
- » III. — Cultures spéciales. Cultures dans le sphagnum, en terrines, en baquets; la tourbière et la moraine.
- » IV. — Les plantes silicicoles ou calcifuges.
- » V. — Les plantes saxatiles et murales; les murs fleuris.
- » VI. — Construction des rocailles.
- » VII. — Jardins alpins et jardins botaniques alpins.
- » VIII. — Liste des plantes de montagnes cultivées dans les jardins. Leur indigénat, l'époque de leur floraison, leur description sommaire avec la culture convenant à chacune d'elles.
- » IX. — Floraire. L'ombrosum; toit fleuri; gazons fleuris; cultures sur radeaux.
- » X. — La fougeraie.
- » XI. — Les orchidées de pleine terre.
- » XII. — Cactées rustiques.
- » XIII. — Les lys.
- » XIV. — La « Florarina ».
- Index alphabétique des genres du chapitre VIII.
- » des chapitres X, XI, XII et XIII.
- » des noms français.

Price : **15 francs.** To be had at Floraire.

OFFERTES PAR LE

Floraire — Chêne-Bourg, GENÈVE

En collections aux conditions indiquées ci-dessus.

Notice for English customers.

Orders for seeds received here at Floraire are punctually attended to, and the parcels of seeds are sent direct to England. We generally forward them as « samples » (one to 6 d. postage). In war time we send them registered for the trifling extracharge of 2 1/4 d. more. Good sized packets of seeds are sold 8 d. each, the only difference being that in the case of rarer seeds fewer are put into the packet.

Our seeds are our own crop or have been recolted on the Alps by our own people.

We do special collections for special exigences ; as following ; Alpine Rockeries-Wallgarden — dryslopes and barrenplaces — Wettplaces-Marshes and boggardens-Underwoods — alpine and Swissmeadows-Chalk or clay soils-peat — borders and herbaceous perennials — dwarf and hedgingplants — Beesplants (Melliferous) — medicinalplants.

Explication des Signes.

Explanation of the marks in the seedlist.

Med	=	Pl. médicinales. — Medicinalplants.
Mel	=	Pl. pour abeilles. — For bees.
R	=	Plantes de rochers sans exigences spéciales. — Easy grown rockplants.
T	=	Tourbière. — English « moraine ».
H	=	Humidité. — Damp.
O	=	Plante d'ombre. — plant. for de Shade.
1/2 O	=	Mi-ombre. — Half shade.
S	=	Plante spéciale pour soleil. — Sunny wanting plant.
B	=	à bordure. — Dwarf & creeping good for the edging of borders.
Pr	=	Propres à émailler la prairie. — Swissmeadow.
Aq	=	Plantes aquatiques. — Waterplants.
Sp	=	Culture dans le Sphagnum. — Sphagnum culture or in the english « moraine ».
N	=	Nord. — To place Northside.
V	=	Plantes vivaces. — Perennial border plants.
*	=	Espèce de culture spéciale. — Special treatment ¹ .
×	=	Espèce de terre de Bruyère. — Peatplants.
^	=	Plantes délicates à protéger l'hiver. — Tenderplants.
 	=	» murales propres à semer dans les murs. — Wallplants.
≠	=	» propres à être naturalisées sur les pentes sèches et arides. — To naturalise on dry slopes and barren places.
::	=	» envahissantes. — Undergroundcreeping.
±	=	» trainantes et formant des touffes serrées. — Creeping.
÷	=	Pour sous bois. — For the Underwood.
+	=	Meilleures espèces pour longue floraison et fleur coupée. — Best sorts for cutting an the best lasting flowers.
f	=	Plantes grimpantes. — Climbing.
†	=	Arbuste pour rocailles. — Rockery shrubs.
 	=	Annuelle. — Annual.
 	=	Bisannuelle. — Biannual.

N. B. — Nous marquons généralement d'un X sur leur paquet les espèces de germination lente. — We generally mark X over the packet for the seeds which are slow germinating. Some genus (Ranunculaceae, Primulaceae, Rutaceae etc.) are long to germinate. All our seeds are fresh and must all come up if well treated.

¹ Nous rappelons ici que le volume de M. H. Correvon, *Les plantes des montagnes et des rochers*, contient toutes les instructions nécessaires pour la culture des plantes délicates ainsi que pour l'élevage des plantes alpines par semis.

LE JARDIN FLEURI

*Je voudrais rassembler toutes les fleurs du monde
En un jardin fleuri dont l'éclat radieux
Et les ardents parfums s'en iraient à la ronde
Proclamer la grandeur et la gloire de Dieu.*

*Je voudrais réunir en heureuse synthèse
Les Beautés des grands bois, des hauts monts et des champs,
Les fleurs des grands marais, celles de la falaise.
En former un ensemble aux rayons chatoyants*

*La joie est dans la fleur qui sourit à l'aurore,
Elle est dans le jardin rayonnant de couleurs;
Et, sur le noir rocher que le soleil colore
Et dont la nudité disparaît sous les fleurs.*

H. C.

Voulez-vous répandre la joie en vous et autour de vous ? Descendez au jardin et pratiquez la vertu du Sage en cultivant vous même vos plate-bandes et vos parterres. D'innombrables mortels ont connu par ce moyen-là le plus sincère et le plus vrai bonheur. Et, maintenant que l'Ange de la paix est descendu sur terre, aidons au mouvement ascensionnel de l'humanité et « jardinons ». Vous le sentez bien, vous tous qui, à si fréquentes reprises, m'avez entretenu de vos joies en jardinage, c'est là qu'est, non point tout le bonheur sans doute — n'exagérons rien — mais une forte part de bonheur. Ce bonheur est à votre portée et il coûte bien peu d'argent et d'efforts. Sans efforts d'ailleurs que devient l'homme ici-bas, sinon un simple parasite qui perd la notion de sa valeur personnelle et qui végète tristement sans rien rayonner autour de lui.

J'ai donné, l'an passé, dans la petite circulaire qui remplaçait notre liste des graines, mes opinions à ce sujet et ai reçu tant de marques de sympathie que j'en fus confondu. Retournons à la terre et demandons-lui, maintenant que la vie est moins dure et que la question subsistances est liquidée, autre chose que choux et pommes de terres : Faisons-la fleurir et rayonner de bonheur.

On me demande parfois des renseignements sur la manière de pratiquer le semis et, bien que j'aie déjà expliqué la chose dans de nombreuses publications et dans plusieurs ouvrages spéciaux j'y reviens sommairement :

Ceux de nos clients qui possèdent « Plantes des montagnes et des rochers » trouveront au chap. II, depuis la page 20, des renseignements complets sur ce sujet. En voici un résumé : Nos graines sont toujours fraîches et bonnes autant qu'il s'agit de celles que nous récoltons nous-mêmes ou faisons récolter par nos collecteurs dans les montagnes. Mais, comme tous les grainiers, nous recevons parfois des reproches : les graines n'auraient pas germé. Or, voici un fait récent qui expliquera la chose : L'an passé nous avons fait le même mois deux envois, à peu de chose près de même composition et d'espèces sortant des mêmes sachets. L'un des envois est allé à Philadelphie, l'autre en Angleterre. Du premier nous avons su que tout a germé sans aucune exception. Il s'agit d'une dame amateur qui fait elle-même le travail. Du second envoi on nous a reproché que tout a manqué à 4 % près. Mais, il se trouve que le client anglais, qui est pourtant un horticulteur expérimenté, a semé ses graines — croyant les avancer — dans une serre tempérée. Or, nous expliquons toujours que cela est contraire à la nature et qu'il faut, si possible, de la neige, sinon, en tous cas, le plein air ou la couche froide. Nous réussissons nos graines en les semant le plus tôt possible après la récolte, sinon au printemps, de bonne heure. Pour bien réussir il importe d'observer les conditions suivantes : faire un terreau léger, sablonneux, juste assez nourrissant pour donner les

éléments nécessaires à de toutes jeunes plantes. Nous le composons de : un tiers de tourbe ou terre de bruyère, un tiers de terre franche et un tiers de sable granitique ou calcaire suivant l'espèce. On sème en terrines, en pots ou en caissettes avec un fort drainage. Dans nos pays à climat continental, il est bon d'établir au-dessus du drainage une petite couche de Sphagnum qui entretient l'humidité constante et modérée. et même, ceci pour les climats plus secs et plus chauds encore, il faut mélanger un peu de Sphagnum tamisé à cette composition. Les pots ou terrines doivent être placés, enterrés si possible, dans une couche froide et bien aérée. S'il tombe de la neige il est bon de la laisser arriver sur le sol des semis.

Il faut, en semant, enterrer très peu, surtout s'il s'agit d'espèces aux graines fines et faire attention à l'arrosage qui doit se faire très légèrement pour qu'il n'arrache ou n'enterre pas les ~~pots~~ ^{petites graines}.

Il va sans dire qu'il ne s'agit ici que des espèces de germination difficile et non des plantes vivaces ordinaires dont la plus grande partie se sèment en plate-bande ou sous couche, en pleine terre et comme cela se pratique pour les salades, les choux et les pensées.

Il faut se souvenir en outre qu'il est des espèces dont les graines germent lentement et difficilement. C'est le cas pour les Gentianées, les Renonculacées, les Umbellifères, les Liliacées et plusieurs autres genres. Nous marquons d'une croix sur le paquet les espèces de ce groupe-là. Comme on l'a dit, publié et répété, les graines sont extrêmement variables dans leurs facultés de germination. Le Dr Yersin, qui découvrit le remède contre la peste et qui dirige l'Institut Pasteur en Annam, m'a donné des détails fort intéressants sur les expériences qu'il fait en ce moment-ci avec les graines que nous lui envoyons de Floraire pour son jardin botanique, dans la montagne annamite. Il fait germer les plus obstinées par un moyen artificiel qui me paraît préférable à celui que nous utilisons jusqu'à ce jour à Floraire. Le voici : Prendre de l'acide oxalique au lieu d'acide chlorydrique comme nous le faisons, en entourer les graines rebelles ou vieilles et les plonger entièrement dans la poudre oxalique et dans un linge qu'on tient dans l'eau pendant 15 minutes. L'eau se fond assez rapidement ; au bout d'un quart d'heure les sortir, puis les laver rapidement et les semer alors sur de la mousse humide ou un sol poreux. Les placer à la chaleur moyenne et attendre. Au bout de peu de jours les germes se montrent et la plante se forme.

Au surplus, ayons toujours la foi dans ce que nous entreprenons et sachons bien que notre action doit réussir. C'est le système du fameux philosophe Marden dont les livres sont si appréciés partout. C'est celui d'un jardinier très expert à qui je demandais comment il se faisait que tout ce qu'il bouturait, plantait et semait réussissait si bien. C'est, m'a-t-il répondu, que je crois en ce que je fais et que je suis sûr de la réussite. Les pensées ne sont-elles pas des forces ?

Au surplus pratiquons le vieil adage : « Semons de bonne graine et laissons faire à Dieu ». Le journal de la Croix-bleue rappelait dernièrement une coutume qui se perd dans nos campagnes suisses romandes mais que nos pères pratiquaient dans mon enfance. Voici l'affaire : Le correspondant du journal en question était encore enfant quand un vieux grand-père l'emmena aux champs où il assista à l'ensemencement d'un beau terrain. Quand tout fut semé, hersé, arrangé sur les bords et que les bœufs, placés sur la route, attendaient leur maître pour rentrer, celui-ci retourna dans son champ, fit cinq pas en avant puis, enlevant son chapeau et s'inclinant, prononça ces mots : « Nous avons semé, à Toi Seigneur de faire le reste. »

Croyons en ce que nous faisons et nous réussirons ; mais souvenons-nous que rien ne prospère sans le secours du Maître. Aidons tous et contribuons dans la mesure de nos forces, à l'œuvre de rénovation sociale et d'embellissement de la vie. Jardiniers et jardinants, travaillons pour le règne de la Beauté, de la Vérité et de la Justice. C'est aux champs que les vertus les plus sérieuses se rencontrent et c'est en travaillant la Terre que nous nous maintiendrons en état de bonne santé morale et physique.

H. CORREVON.

GRAINES DE PLANTES

DE

Montagnes et de Rochers, d'Arbustes de Rocailles

ET DE

PLANTES VIVACES

Abutilon vitifolium. \wedge
 Acæna Buchanani. R O \pm
 glabra. R
 glauca. R
 inermis. R \pm
 Novae Zelandiae. \pm B
 ovalifolia. \wedge \pm
 sarmentosa. \wedge \pm
 sericea. \pm

Acantholimon glumaceum. ||| \pm
 venustum. ||| \pm

Acanthus mollis. V S
 spinosissimus. V S
 spinosus. V S

Achillea abrotanoides. \pm S
 ageratifolia. \pm S
 ageratum. \equiv
 atrata. ||| R
 carpathica. R
 Clavenæ. R |||
 Correvoniaca. R |||
 fililoba. R
 filipendula. V +
 herba Rota. ||| S
 holosericea. R
 impatiens. R
 impunctata. ||| S

Achillea Kellereri. R
 Kernerii. R
 lanulosa.
 ligustica. R
 lingulata. R
 macrophylla. O
 millaefolium.
 mongolica. R
 meschata. ||| S
 nana. S *
 Reichardtiana.
 sarracenicæ (new). \pm S
 serbica. R B |||

Achillea sericea, belle espèce basse à fl. jaune
 vif. \neq :: +

 sibirica. V
 sulfurea.
 Taygetæa. R
 tomentosa. B R S \pm
 umbellata. R
 Vandasil. R S
 Wilzceeki. R S

Aconitum anthora. S R

 Cammarum. $\frac{1}{2}$ O V
 Columbianum. $\frac{1}{2}$ O V
 lycoctonum (yellowish). $\frac{1}{2}$ O V
 napellus. $\frac{1}{2}$ O V
 paniculatum. $\frac{1}{2}$ O V

Aconitum septentrionale. $\frac{1}{2}$ O V

 variegatum. $\frac{1}{2}$ O V
 var. album. $\frac{1}{2}$ O V
 Wilsoni. $\frac{1}{2}$ O V

Actæa alba. O ::

 rubra. O ::
 spicata. O ::

Adenophora denticulata. V S

 liliifolia. V S
 polymorpha. V S
 Potanini. V S
 verticillata (vrai). V S

Adenostyles albifrons. R O ::

 alpina. R O ::
 leucophylla. R S

Adonis pyrenaica. S

 vernalis. Grande Anémone à fl. d'or;
 Mars-Avril. S

Aethionema armenum. ||| S

 antitauri. ||| S
 cappadocium. ||| S
 cordatum (*Eunomia cordata*). ||| S
 coridifolium. ||| S
 creticum. ||| S
 Florariensis. ||| S

- Aethionema gracilis*. ||| S
grandiflorum. ||| S
hybrida. ||| S
Kotschyi. ||| S
persicum. ||| S
pulchellum. ||| S
rotundifolium. ||| S
saxatile. ||| S
schistosum. ||| S
sp. Asia Minor. ||| S
stylosum. ||| S
Thomasianum. ||| S
trinervium. ||| S
Warleyensis. ||| S
Agathea petiolata (nouveau). ||| R
Agrostemma coronaria (coquelourde). V
Ajuga pyramidalis. R ÷
genevensis. R Pr ::
reptans :: ≠ Pr ÷
alba.
Akebia quinata (grimpeuse).
Alchemilla alpina
splendens.
Alkana orientalis. S
Allium pedemontanum. R
Ursinum. O ÷
Victoriale (Herbe à 9 chemises). R
Alsine austriaca. |||
Banatica. |||
Bauhinorum. |||
caucasica. |||
hirsuta. |||
juniperifolia. |||
laricifolia. ||| R
liniflora. R
pinifolia. |||
recurva. |||
Rosani. ||| R
stricta. T
tenuifolia. |||
verna. |||
villarsii. |||
Althæa ficifolia. V
rosea (Rose trémière). V
 A fl. simples ou doubles ; à semer
 ou planter dans les grands jardins
 ou en bordure des massifs d'arbus-
 tes ; fleurissent de mai à octobre.
Alyssum amaranthum. |||
argenteum. ≠ R S
calycocarpum. R
condensatum. R S
gemonense. R
halimifolium. |||
idaeum. |||
lucidum. R
Moellendorffianum. |||
montanum. R
orientale. R
persicum. R

- Alyssum petraeum*.
pyrenaicum. |||
repens. |||
rostratum. R
saxatile. R =
var. citrinum.
var. compactum.
serpyllifolium. R
speciosum. R
spinosum. || R S
var. roseum. |||
tortuosum. R
Wiersbickii. R ≠
Wulfenianum. |||
Amelanchier vulgaris (arbre aux Edelweiss).
Amphycome arguta. ∧ R S
Amygdalus nana. ≠
Amsonia latifolia.
Anagallis tenella. T Sp
grandiflora. |
linifolia. ∧
Anchusa Dromoreana. Mel +
italica.
var. Opale.
 Bonnes Bourraches vivaces de
 grandes dimensions, aux innom-
 brables fl. d'un bleu intense (Mai-
 Octobre).
sempervirens. V
Androsace albana. * |||
arachnoidea. ||| R
Brigantia. R X
carnea. X R
chamaejasme. R |||
cylindrica. * |||
glacialis. * |||
Haussmanni. * |||
Helvetica. * ||| S
hirtella. * |||
imbricata (argentea) * ||| X
lactea. R
Laggeri. R X
lanuginosa. R
Mathildæ. |||
obtusifolia. R
oculata. R
Pacheri. |||
pretutiana. |||
primuloides. R
pubescens. |||
sarmentosa ± R
sempervivoides. R
septentrionalis. R |
Androsace villosa. R S
vitaliana. ||| R S
Wulfeniana. ||| *
Watkinsi. R
Anemone albana. R
alpina. R 1/2 O
apennina.

Anemone Baldensis. R

- » Chinensis. R
- » decapetala. R
- » dichotoma (pennsylvanica). :: R
- » globosa. :: R
- » Halleri. R X
- » Hepatica. R B
- » magellanica. R
- » montana. R
- » multifida. R
- » narcissiflora. R
- » nemorosa. O ::

Anemone nigricans. R X

- » polyantha. R
- » pratensis. R X
- » pulsatilla. B R S
- » var. alba
- » rivularis. R H
- » ranunculoides. O R
- » rubra. X
- » sulfurea. R X
- » stellata. S R X
- » sylvestris. A R
- » trifoliata. R
- » vernalis. R X

Angelica Archangelica. (Angélique). V Med

Antennaria alpina. R B

- » carpathica. R
- » dioica. R B ±
- » magellanica. R
- » plantaginea. B R ±
- » triplinervis. B R ±

Anthemis austriaca. R

- » carpathica. R
- » macedonia. R
- » montana. R
- » nobilis (camomille romaine). Med
- » rigescens. R
- » tinctoria. R +

Anthericum ramosum. R

Anthyllis montana. R B ≠

- » vulneraria. ±

Antirrhinum asarinum. ||| R S

- » glutinosum. ||| S
- » majus, type sauvage. ||| S V
- » Lightrose.
- » variétés en mélange.
- » sempervirens. |||
- » var. roseum.
- » siculum. |||
- » tortuosum. |||

Aphyllanthes monspeliensis. R S

Apios tuberosa. (Grimpant).

Aponogeton distachyon. Aq.

Aposeris foetida. O ::

Aquilegia alba. V Pr R

- » grandiflora.
- » alpina. O R
- » Récoltée dans les Alpes.
- » arctica. R

Aquilegia atrata. R Pr

- » californica. R V
- » calif. hybrida. V
- » canadensis. R
- » chrysantha. V
- » coerulea. V
- » Einseleana. R
- » flabellata. Blanc pur. R
- » formosa. R
- » glandulosa. R
- » Helenæ. R
- » hybrida extra. (Floraire). V
- » Jetschani. R
- » jucunda. R
- » longicalcarata. R
- » Olympica. R
- » Othonis. R
- » oxypetala. R
- » pubiflora. R
- » pyrenaica. R
- » rosea. R Pr
- » skinneri. Fl. rouge et jaune. R
- » transylvanica. R
- » vulgaris. Pr R
- » vulgaris, variétés cultivées à la haute montagne; superbe choix.

Les ancolies sont d'excellentes pl. d'ornement, de culture très facile, s'accommodant également de l'ombre et du soleil, mais préférant la mi-ombre et la fraîcheur. Leurs graines germent de suite.

Arabis albida. R

- » alpina. R
- » nana compacta.
- » superba.
- » aubrietoides. ||| R
- » bellidifolia. R H
- » caucasica. R
- » cenisia. R
- » coerulea. R
- » Halleri. | R
- » lucida. R
- » ovirensis. R
- » pendula. R
- » petrogena. |||
- » procurrens. R
- » pumila. R
- » rosea. |||
- » Soyeri. R
- » Sturii. R
- » suecica. R

Arctostaphylos. Uva Ursi (raisin d'ours).

R ≠ ± Med

Arctotis grandis. | (Aster argenté du Cap.)

Arenaria Balearica. |||

- » biflora. |||
- » cephalotes. |||
- » gracilis. |||
- » graminifolia. R Pr
- » grandiflora. R

Arenaria gypsophiloides. ||| R

- » Koriniana. |||
- » Kotschyana. |||
- » lanceolata. |||
- » laricifolia. |||
- » lateriflora. |||
- » longifolia. |||
- » montana. ||| R
- » nardiflora. |||
- » norvegica. |||
- » Sajenensis. R
- » Saxifraga. |||
- » sericea. R
- » tetraquetra. |||
- » tridentina. |||
- » verna. R

Aristolochia Clematitis. :: Med**Armeria alpina. R**

- » caespitosa. ||| R
- » græca. R
- » Halleri. R
- » majellensis. R B
- » maritima. R B
- » » alba. R B
- » plantaginea. R
- » setacea. R
- » vulgaris. B R ±

Arnica chamissonis. R

- » montana. T Sp R X Med

Aronicum scorpioides. R T**Artemisia absinthium V ≠ Med**

- » arborea. △
- » atrata. |||
- » austriaca. R ::
- » cœrulescens. R
- » discolor. R
- » glacialis. ||| R
- » glauca. :: B
- » granatensis. R |||
- » lanata. |||
- » maritima. |||
- » mutellina. (Génipi) Med R
- » nana. R
- » rupestris. R
- » sacrorum. :: ≠
- » spicata. (vrai génipi.) Med ||| * X
- » valesiaca. ||| ≠ X
- » vulgaris. ≠ Med

Asarum canadense. O B ::

- » europæum. O B ::

Asclepias Cornuti. V :: Mel

- » tuberosa. V + Mel

Asparagus tenuifolius. R S**Asperula azurea. +**

- » cynanchica. R
- » galioides. R
- » odorata. O :: Med
- » taurina. O ::

Asphodelus albus (Asphodèle). ≠

- » fistulosus. ≠

Asphodelus palaestinus. V**Asphodeline cretica. V**

- » gigantea. V
- » lutea. V

Aster alpinus. R

- » » à fl. blanches. R

- » amelloides. + Mel

- » Amellus. Pr ≠ Mel

Aster Amellus roseus. +

- » bessarabicus. + V Mel

- » cordifolius. V Mel

- » diplostephioides (subcœrul.). R Br

- » himalaicus. R

- » hybridus. + Mel

- » Ibericus. + V

- » lævis. V

- » novi-Belgii. Mel

- » Porteri. ≠ ||| Mel

- » Ptarmicoides. V

- » pumilus. R

- » pyreneus (vrai). R

- » rubellus. +

- » sericeus. R

- » suffruticosus. R

- » turbinellus. V

Astilbe Davidi. H

Délicate panicule de fleurs roses, dressée en gros épis.

- » Japonica. H

- » rivularis. H

Astragalus alopecuroides. R

- » alpinus. R

- » aristatus. |||

- » cicer. ≠ ::

- » depressus. R

- » exscapus. S

- » glycyphyllos. ≠

- » himalaicus. R

- » monspessulanus. ||| R

- » Onobrychis. R ±

- » reflexistipulus. R

- » uliginosus. R

- » vulpinus. R

Astrantia carinthiaca. R

- » carniolica. R

- » gracilis. R

- » helleborifolia. R

- » major. H R O :: Pr Mel

Plante très montagnarde et des plus facile à cultiver; l'une des meilleures pl. mellifères.

- » major à fl. roses.

- » minor. ||| N X

- » pauciflora. ||| N

Athamante cretensis. R |||

- » Matthioli. R

Atragene alpina. S O J**Atropa Belladonna (Belladone). O Med.**

- » » à fruits jaunes.

Aubrietia cilicica. ||| B

Aubrietia Columnæ. ||| B

- deltoidea. ||| B
- grandiflora. ||| B
- D. Mules. ||| B
- Eyrii. ||| B
- erubescens. ||| B
- Fire King. ||| B
- græca. ||| B
- Hendersonni. ||| B
- hybrida superba. ||| B
- Floraire. ||| B
- Kotschy. ||| B
- Leichtlini. ||| B
- libanotica. ||| B
- Lilac Queen. ||| B
- "Lloyd Edward". ||| B
- Moehreimi. ||| B
- Peter Barr. ||| B
- Pinardi. ||| B
- Pritchardi. ||| B
- purple King. ||| B
- purpurea. ||| B
- Richardsons. ||| B
- Souvenir de W. Ingram. ||| B

Petites Crucifères vivaces formant des tapis couverts de fl. d'un lilas plus ou moins vif suivant les espèces. Excellentes pour les murailles. — Elles se sont naturalisées sur les murs des environs de Vevey où, dès le mois de février, elles forment une décoration merveilleuse.

Azalea procumbens. ||| X**Banffia petræa. |||****Baptisia australis. V****Bartsia alpina. *****Bellidistrum Michelli. H****Bellis cœrulescens. ||| R**

mexicana. R

perennis.

sylvestris. R

Bellium bellioides. |||

Berberis Wilsoni; le plus beau du genre, nouvellement introduit de l'Asie centrale.

Berkheya purpurea. R**Berteroia incana. R ≠**

mutabilis. R ≠

Betonica alopecuroides.

grandiflora. Pr R

grandiflora superba Pr R

hirsuta. Pr R

officinalis. Pr R

orientalis. Pr R

stricta. Pr R

Etula nana. T R H

Idens dahlioides. Dahlia vivace et rustique à fl. roses.

Isotella lævigata. Pr R Mel

lucida. R

Blitum virgatum (Epinard-fraise).

Plante curieuse, portant comme des fraises d'un vermillon très vif, à l'aisselle des feuilles.

Borago laxiflora. R H

officinalis. Mel

Boykinia rotundifolia. ||| N**Brassica repanda ||| R****Braya pinnatifida. *****Brickellia grandiflora (Ageratum jaune).****Briza major.**

media.

Budleya variabilis

Arbuste à croissance rapide, à floraison abondante (fleurs en grappes violet et or) et qu'on élève facilement de graines.

Bulbocodium latifolium. R

vernum. Pr R

Buphtalmum grandiflorum. R

salicifolium. Pr ::

speciosissimum (très rare). ||| N

Bupleurum falcatum. R Pr

fruticosum. †

longifolium. R

petræum. R

ranunculoides. R C

stellatum. R |||

Caccinia glauca. R ≠**Calamintha acynos. R**

grandiflora. R ::

Calandrina umbellata. R**Calla palustris. Aq****Caltha palustris. H**

polysepala. H

Calystegia dahurica. f**Camassia esculenta N****Camomille (v. Anthemis nobilis).****Campanula acutangula |||**

alata. V

alaskana. R

alliariaefolia. V. fl. blanches décoratives. †

Allionii. R |||

barbata. R Pr

à fl. blanches.

Baumgartenii. R

betonicaefolia. R

bononiensis. R

cantburyana. R

capitata. R

carnica. |||

carpathica. B V R

alba.

grandiflora.

var. compacta.

var. Ditton's blue.

var. grandiflora.

Riverslea.

Le C. carpathica et ses variétés

(faciles à élever de semis) sont d'excellentes pl. de rochers, de plates-bandes et de bordures; fleurissent de mai jusqu'en automne; grandes fl., violettes ou blanches; pl. basses et formant tapis.

Campanula cenisia. ||| *

- » *cervicaria.* R X
- » *collina.* R ::
- » *crispa.* R |||
- » *crystallocalyx.* R
- » *dahurica.* Pr R
- » *elatinoides.* ||| O
- » *eriocarpa.* V
- » *excisa.* ||| *
- » *flexuosa.* ||| S
- » *fragilis.* ^ |||
- » var. *hirsuta.*
- » *garganica.* ||| R
- » *glomerata.* Pr R
- » var. à fl. blanches.
- » var. *acaulis.*

- » *Grossekii.* R
- » *hederacea.* ≠
- » *Hohenackeri.* R
- » *Imeritina.* R

Campanula incurva. R

- » *Kolenatiana.* R
- » *lactiflora.* R $\frac{1}{2}$ O ::
- » *lamiifolia.* R
- » *lanata.* |||
- » *latifolia.* R V O ::
- » à fl. blanches.
- » *azurea.*

- » *longistyla.* R
- » *macrantha.*
- » *macrorrhiza.* |||
- » *medium,* type des Hautes-Alp. R ||
- » type des jardins, mélange (*Campanule Carillon*).

- » *michauxioides.* R
- » *mirabilis.* |||
- » *nitida.* R
- » *nobilis.* R
- » *Palasiana.* R
- » *patula.* Pr |
- » *pelviformis.* R
- » *persicifolia.* V R O ::
- » *alba superba.*
- » *azurea.*

- » *petrea.* ||| S
- » *phytidocalix.* R
- » *psyllostachia.* R
- » *pulloides.* R
- » *punctata.* R ::
- » *pusilla.* ||| R
- » var. *alba.*
- » *pyramidalis.* ||| R Mel
- » *alba.*
- » *Raddeana.* R

Campanula Raineri. ||| R S

- » *rapunculus.* Pr
- » *rapunculoides.* Pr
- » *rhomboidalis.* Pr R
- » *lilacina.*
- » *rotundifolia.*
- » *alba.*
- » *soldanellaeflora.*
- » *rupestris.* |||
- » *ruthenica.* R
- » *Sarmatica.* R
- » *Saxifraga.* R |||
- » *Scheuchzeri.* R
- » à fl. blanches.

- » *sibirica.* R
- » *speciosa.* R

Campanula spicata. || R

- » *stenocodon.* |||
- » *Steveni.*
- » *subpyrenaica.*
- » *thyrsoidæa.* R
- » *tomentosa.* |||
- » *Trachelium.* R ≠
- » à fl. blanches.
- » à fl. doubles.

- » *turbinata.* B R
- » *urticifolia.* :: R

- » *Vanneri.* |||
- » *velutina.* |||
- » *Venzloi.* ||| R
- » *versicolor.* ||| R
- » *Vidali.* V
- » *Waldsteiniana.* ||| R
- » *Zoyzii.* ||| *

Campanula campanula. ^

- » *Capparis rupestris (Câprier).* ||| ^

Cardamine alpina. ||| *

- » *asarifolia.* H
- » *chenopodifolia.* R
- » *resedifolia.* |||
- » *sibirica.* H
- » *trifoliata.* O

Carduus acanthoides. Pr

- » *aurisocus.* Pr
- » *defloratus.* Pr
- » *nutans.* Pr Mel

Carex Baldensis. H

- » *bicolor.* H
- » *flava.* H
- » *Grayi.* H

Carlina acaulis. R Pr ≠

- » *Catananche cœrulea.* R
- » *Cathcartia villosa.* O X
- » *Caulophyllum thalictroides.* O
- » *Cedronella triphylla.* ^

Centaurea alpina. R

- » *axillaris.* R
- » *Babylonica.* V
- » *dealbata.* R
- » *Lugdunensis.* R

Centauria macrocephala. V
montana. R :: O ::
alba.
nervosa. Pr
Ruthenica. R
rutifolia. R
uniflora. R
Centranthus angustifolius. ≠ R ::
ruber (*Valér. rouge des murs*). :: ≠
R V
alba.
atrorubens.
Les *Centranthus* ou *Valériane des murs*
sont recommandables comme pl. de haute
décoration pour la garniture de plates-
bandes, des grands rochers, des murailles
en particulier. Elles fleurissent abondamment de
juin jusqu'en hiver et font un tableau mer-
veilleux dans un paysage.
Cephalaria alpina. V Mel
leucantha. V
Grandes scabieuses jaunes aux formes
architecturales.
Cerastium album. :: R
argenteum. :: R
Biebersteini. :: R
carinthiacum. :: R
chloræfolium. :: R S
columnæ. :: R S
glaciale. :: R S
illyricum. :: R S
lanatum. :: R S
Lerchenfeldianum. :: R S
lineare. :: R S
tomentosum. :: R S
uralensis. :: R S
villosum. :: R S
vulgatum. :: R S
Cerinth alpine. R
hæmostoma polyantha. ^
fastigiata. ^
viscosa. ^
Hamæpence diacantha. ||
Heiranthus Allionii, sorte de giroflée odo-
rante aux fleurs du plus bel
orangé, se succédant de juin à fin
novembre; pl. de grand effet.
|| + R Mel
Allionii grandiflorus.
Cheiri. (*Giroflée des murs*). :: V
var. horticoles.
Kewensis. R
nanus. R
Helidonium Franchetianum. O
laciniatum. O
lasiocarpum. O
majus. Med
Helone barbata. V + Mel
hybrida.
Chicorium Intybus. ≠ ||

Chicorium Intybus à fl. blanches.
Chlora perfoliata. | Pr
Chrysanthemum alpinum. R *
arcticum. R
coronopifolium. R
maximum. V +
uliginosum. V
Chrysogonum virginianum. R
Chrysopsis foliosa. R
Chrysosplenium alternifolium. :: H N
oppositifolium.
Cicuta virosa. Aq.
Cimicifuga cordifolia. O
fœtida. O
racemosa. O
Cineraria aurantiaca. R
campestris. R
suaveolens. V Mel
Circaea Lutetiana. O :: ::
Cirsium acaule. ± Pr Mel
Eriophorum. Pr R Mel
Erysithales. O ::
ferox. ≠ R
heretophyllum. H
monspessulanus. H
spinosissimum. R H
Cistus albidus. ^ +
creticus. ^ +
laurifolius. +
monspeliensis. ^ ±
polimorphus. ^ +
salviæfolius. +
vaginatus (*Bertolettianus*). ^
Ce sont les délicieux *Cistes* des garrigues
de la Méditerranée.
Claytonia perfoliata. H T R
virginiana. H T R
Clematis Buchanani. f
flamula (*liane de neige*). f
Fremonti. V
graveolens (fl. jaunes). f
integrifolia. V
montana. f
var. rosea.
recta. V R ≠
recta grandiflora.
recta purpureascens.
stans. V
Tangutica (fl. jaunes). f
tubulosa. R
virginiana. f
vitalba. f
viticella. f
Cneorum tricocum. ^ +
Cnicus Benedictus. Med
Codonopsis lanceolata. S R
ovata. S R
sylvestris. R
Colchicum autumnale. Med
Colletia chilensis. +

Collomia grandiflora. |
 Colluria geoides. R
 Comarum palustre. H T
 Commelina cœlestis. A
 Convallaria majalis (Muguet) ::
 var. à fl. roses.

Convolvulus altheoides.
 cantabricus. $\pm \wedge$
 Cneorum. $\wedge \dagger$
 mauritanicus. $\pm \wedge$
 Soldanella. **R** $\parallel \neq$

Coptis trifoliata. X
Coreopsis grandiflora. V +
» lanceolata. V +
» oculata. V +
» palmata. V
» Philadelphica. V
» tripteris. V

Coris monspeliensis. $\text{||| R} \wedge$
Cornus canadensis. $\pm \text{T} ::$
suecica. $\pm \text{T} ::$

Coronilla cappadocica.
 » coronata. †
 » emeroides. †
 » Emerus. † Mel
 » glauca. † Δ
 » montana. Pr R \neq Mel
 » varia. Pr \neq \div Mel

Cortusa Matthioli. 0 H
 » grandiflora. 0 H
 » pubens. 0 H

Corydalis australis. R
 » bulbosa (cava). O ÷
 » cheilanthifolia. ||| N
 » glauca. |
 » Halleri. R
 » lutea. ||| R
 » ochroleuca. ||| R
 » opiocarpa. O ÷
 » rupestris. |||
 » tuberosa. ÷
 » vaginans. R

Cotoneaster adpressa.
 » applanata.
 » congesta.
 » Davidiana (horizontalis). **Mel**
 » Franchetti.
 » frigida.
 » humifusa.
 » microphylla. **Mel**
 » nummularia.
 » pannosa.
 » rupestris.
 » sinensis.
 » tomentosa.
 » vulgaris.

Excellents arbustes pour rocailles recherchés des abeilles.

Cotyledon (*Umbilicus*) chrysanthus. R |||
» ciliolatus. |||

Cotyledon oppositifolius. **R** |||
 » Pestalozzae. |||
 » Sempervivum (Sedum Semp.). |||
 Crambe cordifolia. **V**
 » maritima. **V**
 Crepis aurea. **R H**
 » blattarioides. ÷÷
 » montana. **Pr**
 » rubra. **Pr**
 » Terglonensis. |||

Crocus vernus. Pr
Crucianella stylosa. \pm B R
Crucianella stylosa carmina.
Cuphæa lanceolata.

Cyananthus lobatus. ||| R
Cyclamen africanum. R
» Atkinsii. R
» Balearicum (vrai). R
» Coum type. +
» var. à fl. blanches et roses.
» europæum.
» græcum. R
» hederæfolium. R ÷
» album.
» ibericum. R
» latifolium. R
» repandum. R ÷
» Rohlfsianum. R

Cynoglossum nervosum. R
Cytisus albus.

» austriacus.
» capitatus.
Excellent arbrisseau de 1 m.
- 1 m. et demi qui se recouvre
de fleurs jaunes pendant une bonne
partie de l'année.
» caramanicus.
» hirsutus.
» Laburnum.
» nigricans.
» purpureus.
» radiatus.

Délicieux petit arbuste bas, aux
rameaux étalés, propre à garnir les
rocailles.

» scoparius (Sarthamnus Scoparius)
 Laphne alpina
 » buxifolium.
 » caucasica.
 » Laureola.
 » mezereum.
 » » à fl. blanches.
 » oleoides.
 » Philippi.
 » pontica.
 » pseudo-mezereum (luteum).
 » striata.

Datisca cannabina. R
Datura stramonium.

phinium azureum.
Belladonna. + V
phinium cachemirianum. R V
purpureum.
cardinale. R
chinense. Superbe, à fl. d'un bleu très pur. R + V
conspicuum. R
elatum (type). R
formosum. R V
coelestinum.
grandiflorum. R V
var. album.
var. azureum.
var. Tom Thumb.
hybridum. mélange des meilleures variétés. Excellentes pl., robustes et florifères, donnent les plus beaux tons bleus purs plus ou moins vifs, plus ou moins violacés; très faciles à élever et se développant rapidement.
Mehreimi. V
nudicaule.
sulfureum (Zall). R V
superbissimum. V
Thunbergi. R
ataria bulbifera. ÷÷ R
digitata. ÷÷ R
pinnata. ÷÷ R
anthus acaulis. R |||
alpestris. R
alpinus. R |||
albus.
arboreus. R
arenarius. R
armeria. R ÷÷
arvenensis. R B
asper. R
Balbisii. R
barbatus (Oeillet des poètes).
bicolor. R
brevicaulis. R
cæsius. R
anthus cæsius var. grandiflorus.
capitatus.
carthusianorum. Pr R
caucasicus. R
chinensis. ||
chinensis laciniatus.
collinus. R
erinitus. R
cruentus. R
deltoides. R B Pr
albus.
superbus.

Esp. tapissante et naine, très florifère, solide et de culture facile.
diadematus.
diffusus. R

Dianthus fimbriatus. R
fragrans. B R
frigidus. |||
furcatus. R
gallicus (vrai), délicieusement parfumé. R |||
giganteiformis. R
giganteus. R
graniticus. R
integer. R
Kamtschaticus. R |||
Liboschitzianus. R
Liburnicus. R
monspessulanus. Pr R
neglectus. ||| R
Orestis. R
pallens. R
petraeus. R
Plumarius. R B ±

L'une des meilleures pl. à bordure et aussi l'une de celles qui garnissent le mieux les rocs, les sommets des murs, les pentes arides au soleil; flor. prolongée et abondante; fl. très odorantes.

Plumarius var. bicolor.
candidus.
Cyclope.
floribundus.

Dianthus Plumarius var. grandiflorus.

hortensis.
laciniatus.
lilacinus.
robustus.
suaveolens.
zonatus.

Ces variétés d'œillets rampants sont excellentes pour former des bordures, garnir des talus secs et le sommet des murs.

puberulus. R
pungens. R
pyridicola. ||| R
Requieni. R
rupicola. R
Seguii. R
speciosus (de la Bernina). R Pr
spinosus. R |||
subacaulis. ||| R
subcaulescens. R
subfastigiatus. R
subneglectus. R
superbus. ÷÷ R 1/2 O
var. albus.
var. nanus.

Sternbergi. R
sylvestris. R Pr ≠
versicolor. R
viscidus. R
wimmeri. R

Dichondra repens. H ::
Dictamnus albus. V R S
Fraxinella V R S
Digitalis ferruginea. R
grandiflora. R ÷ Med
laevigata. R
lutea. R
nervosa. R
ochroleuca. R
orientalis. R
parviflora. R
purpurea. V ÷ Med
à fl. blanches.
 Ce sont des pl. solides, à flor.
 prolongée. cult. très facile.

Dimorphotheca aurantiaca. |

Dioscoræa caucasica. f

pyrenaica. O R

Dipsacus asper. ≠

Dodecatheon integrifolium. R H

Mædia. R H

pauciflorum. R

radicatum. R

splendens. R

Doronicum caucasicum. R

corsicum. R

Doryenium suffruticosum. ≠

Draba affinis. ||| R

aizoides. ||| R

v. grandiflora. ||| R

altaica. ||| R

armata. ||| R

athoa. ||| R

aurea. ||| R

Bertholoni. ||| R

borealis. ||| R

bronchialis. ||| R

carinthiaca. ||| R

corsica. R

cuspidata. ||| R

frigida. ||| R

Haynaldii. ||| R

hispanica. ||| R

incana. ||| R

Kotschyi. ||| R

laponica. ||| R

lasiocarpa. 10 gr. 6 sh. ||| R

laxa. ||| R

Loiseleurii. ||| R

longirostia. ||| R

magellensis. ||| R

oxycarpa. ||| R

pycnosperma. ||| R

repens. ||| R

rupestris. ||| R

Salomoni. ||| R

scabra. ||| R

Scandinavica. ||| R

stellata. ||| R

streptocarpa. ||| R

Draba subamplexicaulis. ||| R

Thomasi. ||| R

tomentosa. ||| R

Traunsteineri. ||| R

tridentata. ||| R

Zahlbrückneri. ||| R

Dracocephalum austriacum. R

botryoides. R

nutans. R

Ruprechtii. R

Ruyschianum. R

speciosum. R

thymifolium. R

turkestanicum. R

Dracunculus vulgaris. S

Drosera longifolia. Sp Med

Dryas Drummondii. ±

integrifolia. |||

lanata. ±

octopetala. ± ||| R

L'une des plus gracieuses pl. ta

pissantes pour rochers grandes t

blanches; semis facile.

octopetala minor.

tenella.

Echinops niveus. V ≠

Ritro. + V ≠

Echium petraeum (*Lithorp petr.*). |||

rubrum. △

vulgare. ≠

Edelweiss (voir *Leontopodium*).

Edrayanthus dalmaticus. ||| R

graminifolius. ||| R

tenuifolius. ||| R

Empetrum nigrum. ± T R

Ephedra altissima. ||| S ≠

Ephedra Helvetica. ||| S ≠

L'une des pl. les plus curieuses

de la flore suisse.

Epilobium abyssinicum. H

alpinum. ||| N

anagallifolium. R

augustifolium. O ÷ ::

caucasicum. ||| R

Fleischeri. |||

glabellum. ||| N

Hectori. R

hirsutum. H

à fl. blanches.

pubens. R N

rosmarinifolium. ≠ R

Eranthis cilicica. R

hiemalis. Pr ÷

Eremurus altaicus.

Bungei.

Elwesianus.

Himalaicus.

Him-robustus.

inderiensis.

robustus.

Eremurus Shelfordi.
 » *Tubergeni.*
 » *Warei.*
Erica carnea.
 » *ciliaris.*
 » *cinerea.*
 » *tetralix.*
Erica stricta. **R S**
Erigeron alpinus. **R**
 » *aurantiacus.* **R**
 » *ororantiacus hybridus.*
 » *caucasicus.* **R**
 » *cilicicus.* **R**
 » *compositus.* **R**
 » *elator.* **V**
 » *elatus grandiflorus.* **V**
 » *flagellaris.* **R** ≠
 » *glabellus.* **B R**
 Très voisin de l'*Aster* des Alpes.
 » *macranthus.* **R**
 » *multiradiatus.* **R**
 » *oreganum.* **R**
 » *Philadelphicus.* **H R**
 » *pulchellus.* **R**
 » *salsuginosus.* **R**
 » *speciosus.*
 Excellente plante vivace, à grands capitules lilas foncé autour d'un disque d'or ; juin-automne.
 » *trifidus.* **R**
 » *uniflorus.* **R**
Erinus alpinus. ||| **R**
 » *albus.* ||| **R**
 » *hirsutus.* ||| **R**
 » *albus.* ||| **R**
 » *hispanicus.*
 » *roseus.*
Eriogonum arboreum. **R**
 » *flavum.* **R**
 » *racemosum.* **R**
 » *umbellatum.* **R**
Eriophorum angustifolium. **H T**
 » *vaginatum.* **H T**
Eriophyllum caespitosum. **R** |||
Eritrichium nanum (Roi de l'Alpe). ||| *
Erodium amanum. **R** |||
 » *cheilanthisfolium.* **R** |||
 » *daucoides.* **R**
 » *Guicciardi.* **R**
 » *hymenoides.* **R** |||
 » *macradenum.*
 » *Manescavi.* 1/2 **O**
 Bonne pl. de roc. fleurissant tout l'été et l'automne.
 » *Olympicum.* **R**
 » *Romanum.* **R**
 » *supracanum.* ||| **T**
Erpetion reniforme. **H T**
Eryngium alpinum (*Panicaut* ou *Chardon bleu des Alpes*). **R V Pr** +

Eryngium amethystinum. **R**
 » *Bourgati* (*Le superbe chardon bleu des Pyrénées*). **R Pr** +
 » *cæruleum* (*chardon bleu grec*). ≠ +
 » *Davosianum.* (*C'est la variété très foncée de l'E. alpinum*).
 » *Florariensis.* **R**
Eryngium giganteum (*chardon bleu du Caucase*). **R** ≠
 » *maritimum.* **R V** ≠
 » *Olivierianum.* **R**
 » *planum* (*chardon bleu de l'Atlas*). ≠
 » *serbicum* (*vrai*). **R**
 » *Spinalba.* ≠
Erysimum Allionii (*Cheiranthus*). **V R** + ≠
 Plante excellente à floraison prolongée. fl. orangé très vif ; parfum suave ; culture extra-facile.
 » *Helveticum.* ≠
 » *ochroleucum.* **R** |||
 » *pachycarpum.* **R**
 » *pulchellum.* **R** ≠
 » *pumilum.* **R** |||
 » *purpureum.* |||
 » *Rhæticum* (*vrai*). **R**
Erythraea centaurea. **Pr** |
 » *gothica.* **T**
 » *latifolia.* **T**
 » *linarifolia.* **T**
 » *littoralis.* **T**
 » *ramosissima.* **T**
 » *Rumelica.* **T**
Eschscholzia aurantiaca. || **B** ≠ +
 Plante semi-vivace naine qui se ressème d'elle-même avec abondance et donne toute l'année et jusqu'en hiver de grandes fl. de pavots d'un orangé très vif.
Euphorbia altissima. **R** ≠
 » *Characias.* ^ **R**
 » *Dendroides.* ^ **R**
 » *Girardiana.* **R** ≠
 » *Lathyris.* **R** ||
 » *Myrsinites.* ||| **R**
 » *pilosa* (*E. polychroma*).
 » *spinosa.* **R** ||| ≠
Euphrasia lutea. |
 » *minor.* |
 » *montana.* |
Falcaria Rivini. **R** ≠
Falkia repens. ± ^
Farsetia eriocarpa. ≠ **R**
Ferula communis.
 » *glauc.*
 » *Narthex.* **Med**
 Grandes ombellifères au feuillage finement divisé et décoratives.
Festuca crinum-ursi. **B R** ≠
Fragaria indica. ± ::
Francoa appendiculata. **R**

Francoa sonchifolia. R
Fritillaria askabadensis. R
 » *delphinensis*. R Pr
 » *imperialis*.
 » *Meleagris*. Pr
Funkia coerulea. O
 » *cordata*. O
Galega officinalis. ≠
Gaillardia aurantiaca. V +
 » *grandiflora*. +
 Belle plante vivace à très grandes
 fl. de soleil, rouge et jaune; grand
 effet; culture facile.
Galium purpureum. Très précieuse plante
 d'ornement pour rochers et jardins
 alpins; gazon fin, fl. d'un brun
 noir. R ± ≠
 » *verum*. Pr
Galtonia candicans (Jacinthe du Cap). V.
Gaura Lindheimeri. V +
 Plante vivace à longs épis rose
 chair, excellente pour la fleur cou-
 pée; juin-novembre.
Gaya simplex. R
Genista andreana.
 » *anxantina*.
 » *cinerea*.
 » *germanica*.
 » *horrida*.
 » *junceae*.
 Le brillant Genêt jaune d'Espa-
 gne, l'un de nos meilleurs et plus
 solides arbustes.
 » *pilosa*.
 » *radiata*.
 » *sagittalis*. ≠ Pr
Genista tinctoria.
 Tous ces Genêts sont excellents
 pour garnir les rocailles au soleil.
 Floraison prolongée, plantes solides.
Gentiana acaulis.
 L'une des meilleures plantes des
 Alpes; germination lente, mais sûre.
 B R Pr.
 » *alpina* (vrai). R *
 » *altaica*. |
 » *angulosa*. T R Sp
 » *angustifolia*. ± B R
 » *asclepiadea*. H ÷
 » à fleurs blanches.
 » *axillaris*. |
 » *barbata*. ||
 » *bavarica*. T sp *
 » *Bigelowi*. T sp
 » *brachyphylla*. T S R
 » *bracteosa*. Sp
 » *campestris*. Pr
 » *Clusii*. R ±
 » *cruciata*. Pr R
 » *dahurica*. R

Gentiana decumbens. R
 » *depressa*. R
 » *detonsa*. T
 » *excisa*. R
 » *Favrati*. *
 » *Fetisowii*. R
 » *Freyniana*. R * T
 » *frigida*. R * T
 » *Frœlichii*. T R *
 » *Gentianella* (Hort. Angl.). R B
 » *germanica*. |
 » *Grombezesevskiyi*. R
 » *glomerata*. R
 » *hybrida* (straminea × Kesselr.). R
 » *imbricata*. T Sp
 » *Kesselringii*. R
 » à fl. blanches.
 » *Kochiana*. × R
 » *Lagodechiana*. T R
 » *lutea*. Br R Med
 » *macrophylla*. R
 » *cyanea*.
 » *mongolica*. R
 » *Moorcroftiana*. R
 » *nivalis*. | T
 » *Olivieri*. R
 » *pannonica*. T
 » *parryi*. R
 » *phlogifolia*. R
 » *Pneumonanthe*. T H
 » *punctata*. T R
 » *purpurea*. T R
 » *nana*.
 » *Rocheliana*. R
 » *Rostani*. T
 » *Saponaria*. T Sp
 » *Sceptrum*. T
 » *septemfida*. H T R
 » *cordifolia*.
 » *latifolia*.
 » *schistocalyx* × R
 » *straminea*. R
 » *tenella*. | Pr T
 » *Tibetica*. R
 » *Tshiantanica*. R
 » *glomerata*.
 » *triflora*.
 » *uliginosa*. |
 » *utriculosa*. |
 » *verna*. R P T
 » *alba grandiflora*.
Geranium aconitifolium (*rivulare*). R
 » *albiflorum*. R
 » *argenteum*. R
 » *armænum*. V
 » *cinereum*. R
 » *Endresii*. R ÷
 » *Fremonti*. R ^
 » *grandiflorum*. R ÷
 » *ibericum*. R

Geranium macrorrhizum. R O ::

- nepalense. R
- nodosum. H
- phæum. Pr R
- platyanthum. R
- platypetalum. R V
- pratense. R Pr Mel

Excellente plante pour rochers et plates-bandes, fleurissant tout l'été; germe de suite et produit la même année ses belles fleurs bleu-violet foncé. ::

- Richardsoni. R
- sanguineum. R ≠
- " à fleurs blanches. R
- subcaulescens. R
- sylvaticum. R ::

Gerardia tenuifolia. V +

Gerbera Abyssinica. R

- Jamesoni. ∧ +
- variétés.

Geum atrosanguineum. R H +

- bulgaricum. H
- chilense (à fl. rouge très vif).
- coccineum (*idem*).
- " grandiflorum. H R +
- Heldreichii. R
- Heterocarpum. R
- intermedium. H
- montanum. R Pr
- Mrs Bradshaw. R
- pyrenaicum. R Pr
- reptans. ||| R
- Rhæticum. ||| R
- rivale. H
- " grandiflorum.
- triflorum. H
- tyrolense. |||

Gilia coronopifolia. ||

Gillenia trifoliata. V H

L'une des meilleures et des plus florifères d'entre les plantes vivaces d'ornement, fl. blanc rosé, gracieusement suspendues sur tiges rouge brun. Mai-septembre.

- stipulacea. V H

Gladiolus palustris. H

Glaucium luteum. V R ≠

- rubrum. V ≠
- tricolor V R ≠
- " grandiflorum.

Globularia cordifolia. ||| ≠ ±

- " alba.
- incanescens. |||
- nana. ± ||| R
- nudicaulis. R B
- trychosantha. ± R ≠
- vulgaris. R
- " alba.

Glossocomia Clematidea. R

Gnaphalium Leontopodium. R

- supinum. T
- Goodenia (Selliera) repens. H
- Grindelia robusta. +
- Gutierrezia Euthamiae. R
- Gymnadenia conopea. Pr
- Gymnolomia multiflora. R
- Gypsophila alpicola. R |||
- libanotica. R
- paniculata. + V ≠
- paniculata compacta.
- repens. ± ||| R ≠
- " var. major.
- Rokejeka. R
- scorzoneraefolia. V ≠
- transylvanica. R

Haberba Rhodopensis. ||| N

Hablitzia tamnoides. f

Hacquetia Epipactis. O. ≠

Hedysarum lasiocarpum. R

- obscurum. R

Helenium autumnale. V Mel

- Hoopesi. V +

Helianthella quinquænervis. V +

- uniflora. V +

Helianthemum alpestre (jaune).

- amabile (carmin).
- apenninum (blanc).
- atrosanguineum.
- aurora.
- bicolor (jaune et rouge).
- coccineum (rouge ardent).
- cruentum (rouge vif).
- Fumana (jaune).
- grandiflorum (jaune). Pr
- mutabile.
- oelandicum (jaune).
- polyfolium (blanc).
- procumbens.
- rhodanthum (rougeâtre).
- roseum (rose clair).
- sulfureum.
- tomentosum (à feuilles blanch., fl. jaun.).
- variable.
- vulgare (jaune). Pr

Ce sont des pl. à gracieux feuill. persistant, aux fl. nombreuses, se succédant presque toute l'année quand on a soin de couper les tiges après la fleur; culture très facile. Pl. naines et touffues, excell. pour les rochers et talus arides. Lèvent facilement et rapidement.

Helichrysum anaticolicum. R S

- lanatum. R S
- odoratum. R S
- Stœkas. R S

Heliopsis lævis. V +

- scabra. V +

Heliopsis "Soleil d'or". V +

Helleborus altifolius. O R

» atropurpureus. O R

» colchicum. R O

» corsicus. O R

» foetidus. R ≠

» niger (Rose de Noël). O

» orientalis. R O

» purpurescens. R O

» viridis. R O

Heracleum giganteum. V

» Mantegazzianum.

L'une des meilleures plantes mellifères; formes gigantesques. V ÷ OH

Herniaria glabra. ≠

L'H. glabra est la meilleure pl. tapissante pour garnir les lieux secs et arides, en plein soleil, les sols maigres et stériles qu'elle recouvre rapidement.

Hesperis matronalis (*Giroflée vivace*).

» var. candidissima. V ≠

Heuchera glabra. O

» purpurescens. O

» rubescens. O

» sanguinea. R +

» » alba

» » grandiflora.

» » splendens

Hibiscus militaris. V

» palustris. V

» roseus. V

Hieracium albidum. R |||

» aurantiacum. R :: ≠ Pr

» lanatum. R ||| S

Hieracium rubrum, R

» stoloniflorum. R :: ≠ Pr

» viliosum. R

Hippocrepis comosa. R

Homogyne alpina. O R

Horminum pyrenaicum. R O

Houstonia cerulea. T Sp

» » alba.

Hugueninia tanacetifolia. O R

Hutschinsia alpina. ||| N

» Anerswaldi. ||| N

» brevicaulis. ||| N

Hyoscyamus niger (*Jusquiame*). Med

Hypericum Androsæmum. R

» aureum. †

» Balearicum. † ∧

» Coris. ||| S R

» empetrifolium. R

» fragile. ||| R

» hircinum. R

» hyssopifolium. R

» Kalmianum †

» Kotschyianum, ||| R

» linarifolium. X

» montanum. R

Hypericum nummulariæfolium. ||| R

» Olympicum. R

» Orientale. R

» organifolium. ||| R

» patulum. †

» perforatum (*Millerpertuis*). P ≠

» prolificum. †

» ptarmicæfolium. R

» pulchrum. O

» repens. ± B ||| ≠

» reptans. R ±

» rhodopeum. R

» Richeri. R

» tomentosum R

» transylvanicum. R

Hypochaeris Helvetica. R Pr

Hyssopus aristatus. R S ≠

» officinalis. R ≠

» alba.

» à fl. rouges.

Iberis gibraltarica. R Mel

» jucunda. ||| R

» saxatilis. ||| R

» sempervirens. R ||| ≠

» sempervirens nana.

» stylosa. |||

Impatiens glanduligera. O ÷ H Mel

» noli tangere. O ÷ H

Imperatoria angustifolia. R O

» Ostruthium. R H O Med

Incarvillea brevipes. V R

» Delavayi.

(*Gloxinia vivace*). L'une des meilleures plantes vivaces d'ornement que nous ait fourni l'Asie; s'élève facilement de semis.

» grandiflora. V R

» Olgae. V R

Inula acaulis. |||

» ensifolia. B R ≠

» glandulosa. V + R

» » grandiflora.

» Helenium (aulnée). Med

Plante officinale stomachique de grande valeur, appréciée déjà des Romains; belle plante d'ornement.

» hirta.

» limonifolia. R S

» macrocephala. V

» Royleana. R V +

Ipomaea Pandurata. f

Iris acutiloba. R

» caucasica. R

» chrysographis. R

» Forresti. R

» Fosteriaka. R

» foetidissima. O ≠ R

» gigantea. R

» humilis. R

» iberica. R *

Iris imbricata. R *
 » *Junionana*. R
 » *lævigata* (*Kæmpferi*). H V
 » *Loppi*. R
 » *Medwedewii*. R
 » *musulmanica*. R
 » *orchioïdes*. R
 » *paradoxa*. R
 » *prismatica*. R
 » *pseudo-Acorus* (Le lis héraldique).

H Aq

» *pyrenaica*. R
 » *sibirica*. H V R
 » *alba*
 » *sisyrinchium*. R
 » *stylosa*. V
 » *versicolor*. R
 » *virginica*. R

Isatis alpina vera. R

Isopyrum thalictroides. O

Jasione humilis. R X

» *montana*. R

» *perennis*. R

Jeffersonia diphylla. O X

Juniperus Cedrus. † ∧

» *nana*. †

» *Sabina*. † ± ≠

Jurinea latifolia. R

Kalopanax ricinifolia. †

Kernera saxatilis. || R

Kniphofia (*Tritoma*).

» *caulescens* (*Trit. en arbre*).

» *grandiflora*.

Kochia trichophylla. |

Lactuca perennis. R ≠

» *alba*.

» *virosa*. Med

Laserpitium gallicum. ≠ R

» *halleri*. ≠ R

» *latifolium*. ≠ R

» *siler*. ≠ R

Lathyrus alatus. R

» *grandiflorus*. V

» *heterophyllus*. f

» *incurvus*. R ::

» *latifolius*.

» *alba*.

» *maritimus*.

» *neurolobus*. R ::

» *odoratus*. f

(Pois de senteurs) variétés anglaises en mélange.

» *pyrenaicus*. R ::

» *rotundifolius*. f ::

» *sylvestris*. f ::

» *tuberosus*. R ::

Laurentia tenella. H R T Sp

Lavandula abrotanifolia. ∧

» *delphinensis*.

» *officinalis*. R ≠ B

Lavandula vera. R ≠ B

Leontopodium alpinum (*Etoile du glacier*, *glacier star*).

Semer dans un sol léger et tenir plutôt sec; repiquer jeune et cultiver au soleil et dans sol calcaire. Diviser tous les deux ans.

» *altaicum*.

» *Himalayense*.

» *japonicum*.

» *Lindavicum*.

» *sibiricum*.

» *transylvanicum*.

» *tibeticum*.

Leucanthemum maximum. V +

Levistichum officinale. V

Liatris scariosa. V

» *spicata*. V

Ligularia sibirica. V R

Lilium candidum. V

» *cordifolium*. O X

» *croceum*. V R

» *dalmaticum*. O

» *Martagon*. O ÷

» *album*.

» *pyrenaicum*. O ≠

Linaria alpina. R ||| T

» *alba*.

» *rosea*.

» *cymbalaria*. ||| O

» *alba*.

» *var. compacta*.

» *dalmatica*. R

» *var. splendens*.

» *genistifolia*. R

» *italica*. R S

» *macedonica*. R

» *Nyssana*. R

» *organifolia*. ||| R

» *pallida*. ||| R

» *Paucicii*. R

» *pilosa*. |||

» *purpurea*. R

» *spuria*. |||

» *triornitophora*. ||| T R

» *rosea*. ||| T R

» *striata*. ≠

» *tristis*. R

Lindelofia spectabilis.

» *afghanista*. V

Linum alpinum. R

» *austriacum*. R

» *catharticum*. |

» *collinum*. R

» *extra axillare*. R

» *flavum*. R ||| ≠ +

» *grandiflorum* (à fl. rouges). |

» *hirsutum*. ||| R

» *maritimum*. R

» *narbonense*. R +

- Linum nervosum*. **R**
 » perenne. **V R** \neq
 » à fl. blanches.
 » salsoloides. **||| R**
 » sibiricum. **R**
 » tenuifolium. **|||**
Lithospermum Fræbeli. **R**
 » graminifolium. **||| R**
 » intermedium. **||| R**
 » oleoides. **|||**
 » petræum (Echium).
 » purpureo-cœrulum. **O** \neq ::

Lloydia serotina. **T R**

Lobelia cardinalis (vrai). **H**

- » fulgens. **V**
 » Gerardiana. **V**
 » inflata. **R**
 » Kamtschatica. **R**
 » linnæoides. **T** \pm
 » speciosa. **R**
 » syphilitica. **H R**
 » alba.
 » rosea.

- » tupa. **H**
 » urens. **T R**

Lonicera alpigena. $\dagger \neq$ **O**

- » cœrulea. \dagger **O**
 » nigra. **O**

Lunaria rediviva. **O** \neq

Lupinus poliphyllus.

- » altus.
 » excelsior.
 » Moerheimii.

Les Lupins vivaces sont excellents pour la décoration de plates-bandes et jardins. Très parfumées, très abondantes, leurs fl. sont l'un des ornements les plus recommandables pour l'amateur qui aime la Beauté. Culture très facile, surtout dans les sols pauvres en chaux.

Luzula albidula. **O** \neq

- » nivea. **O** \neq
 » sylvatica. **O** \neq

Lychnis alpina.

- » alba.
 » chalcœdonica. **V** $+$
 » alba.
 » Delevayi. **R V**
 » flos cuculi. **H**
 » flos Jovis. **R**
 » alba.
 » fulgens. **R V**
 » Haageama. **R V**
 » viscaria. **R Pr**
 » alba.
 » splendens.

Lynosiris vulgaris. **R** $+$

Lysimachia atropurpurea. **||**

- » acrodonia. **H**

Lysimachia clethroides. **H**

- » dahurica. **H**
 » dubia. **H**
 » ephemerum. **H Aq**
 » quadrifolia. **H V O** ::
 » thyrsoflora. **H Aq**
 » verticillata. **H V** ::
 » violacea. **H**
 » vulgaris. **Aq** ::

Lythrum Salicaria. **H Aq Mel**

- » virgatum. **H Mel**

Malva Alcea. **|| R Pr** \neq

- » crispa. **Med**
 » moschata. **|| R Pr** \neq
 » alba.
 » sylvestris. **Med**

Malvastrum capense. \wedge

Mandragora officinalis. **R S Med**

Margyricarpus setosus. **R** \pm \dagger

Marrubium sericeum. \pm **R**

- » spinulosum. \pm **R**

Matthiola fenestralis. \wedge . **R**

- » incana, variétés (giroflée).
 » pedemontana. **:: |||** \neq
 » rupestris. **|||**
 » sinuata. **R**
 » tristis. **::** \equiv **R** \neq
 » valesiaca. **:: ||| R** \neq

Mayanthemum bifolium.

- » canadense.

Mazus rugosus. **H T** ::

Meconopsis cambrica. **O**

- » aurantiaca.
 » fl. pl.
 » integrifolia. **O** \times
 » nepalensis. **O** \times
 » paniculata. **|| O** \times
 » petiolata. **O** \neq
 » Prattii. **O** \times
 » rudis. **O** \times
 » sinuata latifolia. **O** \times
 » Wallichiana. **O** \times

Medicago Echinus. \mid

Melandrium rubrum. **Pr**

Melica altissima. **O** \neq

Melilotus albus.

- » officinalis.

Pl. médicinales et surtout mellifères de grande valeur.

Melissa officinalis (Mélisse). **Med**

Mentha Pulegium. **Med**

- » Requiemii. **||| N**

Mertensia ciliata. **R** $\frac{1}{2}$ **O**

- » oblongifolia. **R** $\frac{1}{2}$ **O**

- » paniculata (sibirica). **R** $\frac{1}{2}$ **O**

- » primuloides. \pm $\frac{1}{2}$ **O**

Meum athamanticum. \times :: **Pr Med**

- » Muttellinum. **R |||**

Michauxia campanuloides. **||**

Micromeria rupestris. **R |||**

Mimulus cardinalis. H
 „ *Lewisii.* T
 „ *luteus.* H ::
 „ *primuloides.* H Sp
 „ *ringens.* H
Mitchella repens. O X
Mittella pentandra. O
Mœhringia muscosa. |||
 „ *papulosa.* |||
 „ *pendula.* ||| N
 „ *sedoides.* |||
Molospermum cicutarium. R
Monarda dydima. V +
 „ „ *alba.*
 „ *fistulosa* (thé d'Oswego), V
 „ *florariensis.* V +
 „ *Kalmiana.* V
 „ *purpurea.* V +
 „ *superba.* V
Molucella spinosa. R
Morine longifolia. R
Mulgedium alpinum. O Mel
 „ *Bourgæi.* O Mel
 „ *plumieri.* O Mel
Myosotis alpestris. R
 „ *cæspitosa.*
 „ *lithospermifolia.* R
 „ *palustris.* H
 „ „ *albus.*
 „ „ *var. semperflorens.* H ::
 „ *Reichsteineri.* H
Myrrhis odorata. O
Nardus stricta. R ≠
Nepeta lanceolata. R
 „ *macrantha.* N
 „ *mussini.* Mel R B
 „ *Nepetella.* R
 „ *nuda.* R B ≠
Nigritella angustifolia. T *
Nuphar luteum. Aq
Nymphæa alba. Aq
Ocimum Basilicum (Basilic)
Oenothera acaulis. R
 „ *biennis grandiflora.* ||
 „ *Fraseri.* V R
 „ *macrocarpa* (*O. Missouriensis*).
 R V B ≠
 „ *pumila.* R
 „ *rosea mexicana.* R
 „ *serrulata.* R
 „ *speciosa.* R V ::
Omphalodes cappadocica. 1/2 O
 „ *Lucilæe.* ||| N
 „ „ *alba.*
 „ *nitida.* 1/2 O

Ononis cenisia. ± R |||
 „ *fruticosa.* † R
 „ *natrix.* R ≠
 „ *rotundifolia.* R ±
Onopordon bracteatum. ||
Onosma armena. ||| R ≠
 „ *Bourgæi.* ||| R ≠
 „ *Cassium.* ||| R ≠
 „ *echioides.* ||| R
 „ *Helveticum.* || R ≠
 „ *sericea.* ||| R ≠
 „ *stellulatum.* ||| R ≠
Opuntia albospina. †
 „ *arkansana.*
 „ *Camanchica*
 „ *cantabrigensis.*
 „ *cymochila.*
 „ *gigantea.*
 „ *greenii.*
 „ *macrorhiza.*
 „ *mesacantha.*
 „ *missouriensis.*
 „ *Raffinesquiana.*
 „ *rubra* (rouge vif).
 „ *Salmonia.* (fl. rouge saumon).
 „ *sphæacantha.*
 „ *vulgaris.*
 „ *Xanthostemma rosea.*
Origanum pulchrum. ||| R
Orobus niger. R O ::
 „ *tuberosus.* R
 „ *variegatus.* R
 „ *vernus.* O ::
Ostrowskya magnifica. R V
Othonopsis cheirifolia. R S
Oxalis acetosella. O :: ::
 „ „ *rosea.*
 „ *atrosanguinea.* R ≠
 „ *floribunda alba.* R
 „ „ *rosea.* R
Oxyria digyna. ||| N
Oxytropis Baikalensis. R S
 „ *campestris.* R S
 „ *Halleri.* R S
 „ *Laponica.* R S
 „ *ochroleuca.* R S
 „ *sulfurea.* R S
Pæonia albiflora.
 „ *anomala.*
 „ *coralina.*
 „ *decora* (Romanica).
 „ *lutea.* Pivoine arborescente, à fleur
 jaune vif; facile à cultiver.
Pæonia Mlokosievitchii.
 „ „ *officinalis.*

¹ Ces *Opuntia* sont des Cactées dont les graines lèvent facilement et qui sont rustiques à nos hivers. Il suffit, dans les pays du Nord, de tenir les plantes au sec (recouvertes de planches inclinées) pendant la mauvaise saison. Elles fleurissent abondamment l'été si l'on a soin de les planter au grand soleil. En Allemagne, on en cultive de grandes collections sans même les recouvrir de planches.

Pæonia peregrina.

- » Russi.
- » triternata.
- » Veitchi.

Papaver alpinum. ||| R ≠

Sol maigre et rocailleux.

- » alpino-nudicaule. R
- » atlanticum. O ≠
- » bracteatum (*involucratum*). V
- » Kernerii. |||
- » maximum. V
- » nudicaule. ||| R ≠
- » » à fl. blanches
- » » jaune vif.
- » » rouge cramoisi.
- » » Toutes teintes mélangées.

Le papaver nudicaule est l'une des plus florifères et des plus précieuses d'entre les plantes alpines ou vivaces. Il aime la fraîcheur et la mi-ombre et constitue l'un des meilleurs ornements des rochers. Fleurit tout l'été et jusqu'en hiver, très facile à cultiver; bon pour la fleur coupée. En sol rocailleux, pavéux et maigre il fait merveille.

- » oreophyllum. R 1/2 O
- » orientale. V R ≠

Le pavot d'Orient est la plus éclatante de nos fleurs de pl. terre. Sa grosse corolle d'un rouge ardent fait un effet grandiose dans les jardins. Culture facile.

- » pilosum. R
- » radiculatum. R
- » Rhæticum. R |||

Paracarium azureum. V

- » sylvestre. V

Paradisias Liliago. Pr R

- » Liliastrium. Lis de Saint-Bruno. Pr R
- » » major.

Paris quadrifolia. O ÷

Parnassia alpina. T

- » asarifolia. T
- » mysorensis. T R
- » palustris. T H

Parrya Menziesii. R

- » microcarpa. R

Patrinia heterophylla. R

- » palmata (triloba). R
- » rupestris. R V
- » scabiosæfolia. R

Pedicularis atrorubens. T

- » cenisia. T
- » foliosa. T
- » tuberosa. T
- » verticillata. T

Peganum Harmala. R ≠

Peltaria alliacea. :: ≠

- » turkestanica. :: ≠

Pentstemon acuminatus. R

- » albus. R
- » arizonicus. R
- » cæruleus. V R +
- » carinatus. R
- » diffusus. R
- » digitalis. V R + Mel
- » glaber roseus. R
- » glaucus. R
- » Gordoni splendens. R
- » gracile. R
- » heterophyllus. R +
- » humilis. ||| R B
- » hybridus hortensis (les meilleures variétés des jardins; excellentes plantes de décoration). V
- » lævigatus.
- » linarioides. ||| R B /
- » Murrayanus grandiflorus. R
- » ovatus. V
- » pubescens. V + R
- » pygmaeus. R
- » Richardsonis. R
- » rubricaulis. R
- » scouleri. R
- » venustus. R
- » Wrightii. R

Les *Pentstemon* sont les *Digitales* de l'Amérique du Nord; ce sont de bonnes plantes vivaces de plates-bandes ou de rochers qui fleurissent longtemps et sont très ornementales. On ne saurait trop en vanter la rusticité et la longue floraison; leurs fleurs sont d'entre les meilleures pour les bouquets. Il en est dont les teintes bleu d'azur rappellent les gentianes des Alpes.

Pericome caudata. V R

Petalostemon candidus. R

- » tenuifolius. R

Petasites albus. ÷

- » niveus. ÷

Peucedanum alsaticum. V Pr

Phaca alpina. † R

Phlomis alpina. V R

- » chrysophylla. V R
- » Lychnitis. R
- » Samia. V R +

Phlox decussata, les meilleures variétés des jardins en mélange. V +

- » Douglasi. R

Phygellus capensis. Mel

Physalis alkengi (Alkéenge) :: ≠

- » Franchetti. R ::

Physochlaina orientalis. R O

Physostegia virginiana. V +

- » » alba.

Phyteuma canescens. R

- » carestiae. R

Phyteuma hemisphaericum. |||

» *orbiculare.* Pr R

» *pauciflorum.* |||

» *Scheuchzeri.* |||

» *spicatum.* O ÷

Phytolacca decandra. V. Med.

Pinguicula alpina. T

» *grandiflora.* T

» *Reuteri.* T

» *vulgaris.* T

Pinus Cembro. (Arolle).

Plagius ageratifolius. ^ R

Plantago argenta. R ≠

Platycodon autumnale. V + R

» *grandiflorum.* V + R Pr

» *album.*

» *Mariesi.* R V

» *à fl. blanches.*

» *grandiflora.*

Ce sont les superbes campanules japonaises aux grandes fleurs fraîchement découpées et vivement colorées en bleu intense, blanc, opale ou azur. Très rustiques, très florifères (juillet-octobre), ce sont des plantes de grand effet et de premier ordre pour la décoration des plates-bandes et rochers (Mellifères). Faciles à élever de graines.

Podophyllum Emodi. O

Polemonium cœruleum. R V Pr H Mel

» *album.*

» *Berninæ.*

» *carneum.*

» *filicinum.* R

» *humile.* R

» *Himalayense.* R

» *molle.* R

» *pauciflorum.* R

» *pulchellum.* R

» *reptans.* R ±

» *Richardsoni.* R

Les Polémoines sont d'admirables plantes vivaces, formant de jolies touffes d'une verdure fine et gaie, et portant de beaux panicules de fl. bleues, blanches ou jaunes odorantes.

Polygala chamæbuxus. O ± ÷

» *Varedæ.* ± 1/2 O

Polygonatum multiflorum. ÷ Med

» *verticillatum.* O R ÷

» *vulgare.* R O ÷ Med

Polygonum alpinum. Pr R

» *amplexicaule.* V R

» *Auberti.* f

» *Baldschuanicum.* f

» *Bistorta.* H Pr Med

» *Brunonis.* R :: ≠

» *capitatum.* R

» *Emodi.* ± R ≠

Polygonum Sieboldi. V

» *viviparum.* T

Potentilla adjarica. R

» *alchemilloides.* R ±

» *alpestris.* R ±

» *argentea.* R

» *atrosanguinea.* V R +

» *aurea.* ||| R ±

» *bifurca.* ±

» *caulescens.* |||

» *crinita.* R

» *Engadinensis.* R ±

» *Fenzlii.* ± |||

» *fragiformis.* R

» *frigida.* ||| *

» *fruticosa.* + R

» *fulgens.* X R

» *glandulosa.* R

» *gracilis.* R

» *grandiflora.* R

» *Hippiana.* R ±

» *Hookeriana.* R

» *Hortensis* (var. hort. melang.)

» *Laponica.* R

» *montenegrina.* R

» *multifida.* R

» *Nepalensis.* +

Superbe espèce à fleurs rose tendre veinées de carmin.

» *nitida.* || ±

» *nivalis.* ±

» *nivea.* *

» *pedemontana.* R

» *peduncularis.* ± R

» *petiolulata.* |||

» *pygmæa.* ||| R

» *pyrenaica.* R

» *recta.* R ≠

» *rupestris.* R ≠

» *Salesowiana.* R H Med

» *sanguisorbæfolia.* R

» *sibbaldi.* ±

» *speciosa.* ± R

» *sulfurea.* R ≠

» *taurica.* R

» *Tormentilla.* R H

» *Transcaspiensis.* R

» *tridentata.* |||

» *valderia.* R

» *virgata.* R

» *viscosa.* R

» *Visiani.* R

» *Wrangeliana.* R

Pratia angulata. T R

Prenanthes purpurea. O ÷

Primula acaulis. O ÷ Pr

» *var. à fl. bleues.* R

» *admontensis.* |||

» *angustidens.* R

» *Arctotis.* |||

Primula Asthore. R T

- » Auricula (type alpin). R |||
- » Auricula var. horticoles.
- » " marginata.
- » auriculata. T $\frac{1}{2}$ O
- » Balbisii. |||
- » Beesiana. R T
- » bella. |||
- » Bellunensis. |||
- » Berninæ. |||
- » Bulleyana. R T
- » calycina (glaucescens). ||| N
- » capitata.
- » capitellata. T
- » cashmeirana. R $\frac{1}{2}$ O
- » " grandiflora.
- » Clusiana. R |||
- » Cockburniana. R
- » cortusoides. O
- » daonensis. ||| R
- » darialica. R T
- » decipiens. |||
- » decora. ||| R
- » deflexa. R T
- » denticulata. R
- » dentiflora (Andrews). T
- » discolor. |||
- » elatior. Pr $\frac{1}{2}$ O
- » " grandiflora. $\frac{1}{2}$ O
- » " Theodora (Hybride spontanée, entre les Pr elatior et Juliæ, qui a surgi en 1915 dans notre alpinum).
- » farinosa. H R T
- » " grandiflora.
- » Flørkeana. ||| N
- » Florariensis.

Espèce géante, hybride probable entre les Pr. Beesiana et « Unique ». Elle atteint 90 cent. de haut., a des tiges portant jusqu'à 10 étages de fleurs rose carné vif avec un oeil jaune d'or au centre. Une seule pl. a fourni 14 tiges fl. l'été passé, dans un sol frais. T R

- » floribunda. \wedge X
- » Forbesi. \wedge X
- » frondosa. H
- » goldlaced (Hort.) R
- » grandis. H
- » hirsuta (très belle espèce à fl. carmin). ||| N R
- » integrifolia. R N
- » involucrata. R H
- » japonica. R $\frac{1}{2}$ O
- » " purpurea.
- » " splendens.
- » Juliæ. R N X
- » kewensis. \wedge
- » latifolia (graveolens). ||| N
- » leucophylla. R

Primula longiflora. T R

- » luteola. O X
- » Lyssadell hybrid. H R
- » malacoides. \wedge
- » " alba.
- » marginata. ||| N R
- » Munroi. T
- » Murettiana. ||| N
- » muscarioides. T
- » œnensis. ||| N
- » officinalis. Pr
- » " variétés.
- » patens (type sauvage du Sieboldi). O
- » pedemontana. ||| N
- » Poissoni. H
- » pulverulenta. H
- » reticulata. X $\frac{1}{2}$ O
- » Rhætica. ||| N
- » rosea. H
- » " grandiflora.
- » saxatilis (cort. var. chinensis). $\frac{1}{2}$ O
- » Sibthorpi. B R
- » Sieboldi (var. Hort.) X
- » Sikkimensis. H $\frac{1}{2}$ O
- » spectabilis. ||| N R
- » variabilis, var. anglaises en mélange.
- » Veitchi. X \wedge
- » venusta. |||
- » veris (mélange des meilleures variétés anglaises). Pr R B \div
- » verticillata. \wedge
- » villosa. ||| N
- » viscosa. ||| N
- » " alba.

Prunella grandiflora. \pm B Pr

- » " purpurea. \pm B Pr
- » incisa rubra. Carmin très intense ; floraison prolongée ; pl. excell. pour tapisser le sol. B Pr R
- » laciniata. R

Pterocephalus (Scabiosa) Parnassi. \pm

Putoria calabrica. R S

Pycnanthemum lanceolatum. R

Pyrethrum corymbosum. \div

- » atosanguineum. V
- » macrophyllum. R \div \neq
- » poteriifolium. R
- » roseum. V $+$

Ramondia Nathalie. ||| N

- » pyrenaica. ||| N
- » " alba.
- » " rosea.
- » serbica. ||| N

Ranunculus aconitifolius. H $\frac{1}{2}$ O

- » alpestris. ||| N
- » amplexicaulis. R
- » anemonoides. R
- » bilobus. ||| N
- » glacialis. T R
- » graminæus. R S

Ranunculus Illyricus. R
 » **millæfoliatus.** R
 » **monspeulanus.** R
 » **montanus.** Pr R
 » **patavasifolius.** R S
 » **platanifolius.** H
 » **pyrenæus.** Pr R
 » **rutæfolius.** R
 » **Seguieri.** R |||
 » **serbicus.** R
 » **Thora.** Pr R
 » **Traunfellneri.** ||| N
Rehmania angulata. ^
Reseda sufruticosa.
Rheum Emodi. V
Rhodiola linifolia. |||
 » **rosea (Sedum Rhodolia).** |||
 » **rubra.** |||
Rhododendron chamæcistus. |||
 » **ferrugineum (La Rose des Alpes)**
Rhododendron ferrugineum album.
 » **hirsutum.** O
Rodgersia æsculifolia. H
 » **pedophylla.** H
Rodhea japonica. O
Romanzoffia Stichenis. T H
Romneya Coulteri. V S
 » **hybrida.** V S
 » **trychocalyx.** V S
Rosa alpina.
 » **pimpinellifolia.**
 » **rugosa.**
 » **rubiginosa (Sweet bryar).**
Rosmarinus officinalis. R S
Rubus arcticus. R
 » **laciniatus.** f
Rudbeckia bicolor. V +
 » **californica.** V +
 » **fulgida.** V +
 » **hirta.** V +
 » **laciniata.** V +
 » **nitida.** V +
 » **occidentalis.** V +
 » **purpurea.** V +
 » **grandiflora.** V +
 » **pinnata.** V +
 » **var. Soleil d'or.**
 Les Roubecques sont d'entre les meilleures et les plus précieuses des pl. vivaces; leurs fleurs, très apparentes, en capitules jaune et noir chez la plupart, rouge sombre ou carmin chez *intermedia purpurea*, durent longtemps et sont excellentes pour la fleur coupée. Culture des plus facile.
Ruellia ciliosa. R
Rumex flexuosus (feuillage brun foncé). R
Ruscus aculeatus. O ÷
 » **hypophyllum.** O ÷

Ruscus racemosus. O ÷
Ruta graveolens. R ≠
 » **patavina.** :: R ≠
Sagina subulata. R
 » **Linnæi**
Salix reticulata. R ±
 » **retusa.** R ±
Salvia azurea grandiflora. V
 » **bicolor.** ^
 » **bracteata.** R
 » **candelabrum.** R
 » **cypria.** R ±
 » **glutinosa.** R ÷
 » **Horminum.** | ≠ Med
 » **officinalis.** ± R ≠ Mel Med
 » **alba.**
 » **major.**
 » **pratensis.** Pr R Mel
 » **ringens.** R Mel
 » **scabiosæfolia.** ± R Mel
 » **Scalaria.** ≠ Mel Med
Samolus Valerandi. H T
Sanguinaria canadensis. O
Sanguisorba canadensis. H
 » **Vallistellinae.** H
Sauicula europæa. O ÷ Med
 » **Marylandica.** O ÷
Saponaria bellidifolia. R
 » **Boissieri.** |||
 » **cæspitosa.** ||| R
 » **cypria.** ||| R
 » **glutinosa.** | ≠
 » **lutea.** ||| R
 » **ocymoides.** ± ||| R Pr ≠
 » **var. alba.**
 » **rosea.**
 » **splendens.**
 » **officinalis.** :: ≠ Med
 » **à fl. doubles.**
Sarothamnus scoparius. X +
Sarracenia purpurea. T
Satureya intermedia. R
 » **diffusa.** Mel R B
 » **Hortensis (Sariette).** Mel R
 » **montana.** ||| R ≠ Mel
Saussurea alpina. R |||
 » **decurrens.** R |||
 » **depressa.** R |||
 » **discolor.** R |||
Saxifraga aconitifolia. N
 » **aizoides.** H ||| R
 » **Aizoon.** ||| R
 » **ajugæfolia.** ± 1/2 O
 » **Alberti.** |||
 » **Allionii.** ± B
 » **altissima.** ||| R
 » **ambigua.** ||| R
 » **androsacea.** H
 » **aphylla.** ||| N *
 » **apiculata.** |||

Saxifraga aretioides. |||

- » *aspera.* |||
- » *atropurpurea.* R ±
- » *augustana.* ||| N
- » *australis.* ||| R
- » *Balcana.* ||| R
- » *biflora.* ||| N
- » *Blavii.* ||
- » *blepharophylla.* ||| N
- » *Borissi.* |||
- » *Boryi.* |||
- » *Boydei.* |||
- » *brevifolia.* ||| R
- » *bronchialis.* R
- » *Brunoniana.* X ±
- » *bryoides.* |||
- » *Burseriana.* |||
- » *gloria*
- » *major.*
- » *cæsia.* |||
- » *cæspitosa.* ± R B
- » *var. rosea.* R B
- » *canaliculata.* ± R |||
- » *carpathica.* R T
- » *cartilaginea.* ||| R
- » *catalaunica.* ||| R
- » *cernua.* T
- » *Clusii.* T
- » *cochlearis.* ||| S R
- » *coriophylla.* |||
- » *Cotyledon.* |||
- » *crustata.* ||| R
- » *cuneifolia.* O X
- » *dalmatica.* ||| R
- » *decipiens.* B
- » *diapensioides.* ||| *
- » *diversifolia.* T H
- » *elatior.* ||| R
- » *Elisabethæ.* |||
- » *exarata.* ± B R
- » *Ferdinand-Coburgi.* |||
- » *flagellaris.* ± T R
- » *flavescens.* ||| R
- » *florulenta.* ||| N
- » *Forbesi.* R
- » *Fortunei.* R ^
- » *Friedrich-Augusti.* |||
- » *Geum.* B R 1/2 O
- » *Gibraltarica.* ± |||
- » *granulata.* T R
- » *Grisebachii.* |||
- » *Guilford seedling.* ± R
- » *Haagii.* |||
- » *Hausmanni.* ||| *
- » *hederacea.* ||| *
- » *Hedraeantha.* |||
- » *heucherifolia.* R N
- » *Hieracifolia.* H
- » *Hirculus.* H T
- » *var. grandiflora.*

Saxifraga Hostei. |||

- » *Huetii.* |
- » *hypnoides.* ± B
- » *irrigua.* R ||
- » *juniperina.* |||
- » *Kolenatiana.* ||| R
- » *Kotschyi.* |||
- » *Kinleyi.* |||
- » *Kyrollii.* |||
- » *lævis.* ||| N
- » *Lantoscana.* ||| R
- » *latina.* ||| N
- » *lingulata (vrai).* ||| R
- » *longifolia.* ||| R
- » *Ludoviciana.* |||
- » *luteo-purpurea.* |||
- » *luteo-viridis.* |||
- » *Mac Nabiana.* ||| R
- » *mædia (calyciflora).* |||
- » *mandschouriensis.* R
- » *marginata.* ||| R
- » *micranthidifolia.* R H
- » *moschata.* ± R
- » *murithii.* ||| N
- » *muscoides.* ± R
- » *mutata.* R ||| H
- » *nervosa.* R
- » *nivalis.* R N
- » *ortolenca.* |||
- » *oppositifolia.* ||| N R
- » *alba.*
- » *Paulinæ.* |||
- » *pectinata.* ||| R
- » *pedemontana.* ||| N
- » *peltata.* H
- » *pennsylvanica.* H
- » *petræa.* | |||
- » *planifolia.* |||
- » *porophylla.* |||
- » *primuloides.* O R
- » *Probyni.* |||
- » *Prostii.* ± R
- » *retusa.* ||| N
- » *rhætica.* ||| R
- » *Rhei superba.* R
- » *Rocheliana.* |||
- » *Rossii.* |||
- » *rotundifolia.* O
- » *Salomoni.* |||
- » *sancta.* |||
- » *scardica.* |||
- » *Segnieri.* ||| N
- » *splendens.* |||
- » *squarrosa.* |||
- » *stellaris.* H T
- » *Taygetaya.* ||| R
- » *Tellimoides.* H 1/2 O
- » *tenella.* ± R
- » *Thessalica.* |||
- » *Tombeancensis.* |||

Saxifraga umbrosa. O ± B

- Valdensis. ||| *
- varians. R
- Zelebori. ||| R
- Zimeterii. |||

Scabiosa caucasica. R V +

- alba grandiflora.
- cretica. R
- graminifolia.
- Lagodechiana.
- lyratifolia. (fl. grenat vif). R
- ochroleuca. R
- Olgae. R

Schivereckia podolica. R

Scilla nutans. O ÷

Scrophularia Hoppii. R ≠

- juratense. R ≠
- Marylandica. R
- trifoliata. Très belles fleurs rouge brique vif.

Scutellaria alpina. ± R

- à fl. blanches.
- altissima. R ≠
- Baikalensis. R
- lupulina. R
- macrantha. R
- orientale. R
- Siebthorpii. R
- tuberosa. R ::

Sedum acre. ||| ≠

- acutifolium.
- album. ≠
- alpestre (repens). R
- alsinæfolium. |
- altissimum. R ≠
- anacampseros. R
- annuum. |
- anopetalum. R
- asiaticum.
- atratum. |
- Cephæa. |
- cœruleum. |
- coloniensis. |||
- corsicum. ||| R
- dasiphyllum. || R
- gemmi ferum. R
- Hispanicum. |
- kamtschaticum. R ≠
- Laggeri. R
- Lydium. R
- maximowiczii. R ≠
- maximum. R ≠
- Middendorffianum. R
- obtusifolium. R
- oppositifolium. R B R ≠
- pilosum. ||
- populifolium. R
- purpurescens. R ≠
- reflexum (rupestre). R ≠
- Rhodantum. R

Sedum rubens (Crassula). |

- rubricaulæ. R ≠
- Selskyanum. R ≠
- Sempervivum (*Cotyled Semp.*). R |||
- spectabile. R V B
- splendens.
- spurium. R B ≠
- stoloniferum. R
- villosum. H

Sempervivum arachnoideum.

- atrovioleaceum.
- bungeanum.
- calcareum.
- debile.
- Juratense.
- Kapaornikense.
- mettenianum.
- montanum.
- ornatum.
- patens.
- pyrenaicum.
- Requienii.
- robustum.
- spinulifolium.
- tectorum.
- tenellum.
- Thomayeri.
- tomentosum.
- triste.
- Valesiacum.
- Wulfeni.
- mélange de plusieurs espèces.

Senecio abrotanifolius. R

- adonidifolius. R
- aurantiacus (*Cineraria aurant.*). R.
- carniolicus. R |||
- clivorum. R V
- cordatus. R O
- coriaceus. R
- doronicum. R
- Fendleri. R |||
- Fuchsii. O ÷
- incanus. ||| R T
- Jacobæus. R H
- jacquinianus. O ÷
- leucophyllus. * |||
- macrophyllus. V
- othonæ. R
- palmatifidus. R
- quinquæligulatus. R
- sarracenicus. O ÷
- stenocephalus. V
- sulfureus. R
- Tanguticus. ::
- uniflorus. T
- Veitchianus. V

Serratula nudicaulis. R

Seseli cæspitosa. ±

- glaucum. R ≠
- gummiifer. R ≠

Sibbaldia procumbens. X R

Sidalcea candida. R

» *malvaeflora.* R

Sideritis Eubæa. R

» *hissopifolia.* R ≠

» *taurica.* R

Silene acaulis. ||| R ±

» » *alba.*

» » *grandiflora.*

» *alpestris.* ± R

» *alpina.* ||| ≠

» *armeria.* |

» *asterias.* ||

» *asterias grandiflora.*

» *bryoides.* ± |||

» *Campanula.* |||

» *ciliata.* R

» *cordifolia.* |||

» *Correvoniana.* R |||

» *dinarica.* R

» *Elisabethæ.* ||| N

» *exscapa.* ||| ±

» *fimbriata.* R

» *Legionensis.* ||| R

» *Lerchenfeldiana.* R

» *maritima.* ||| R

» *monachorum.* ||| N

» *odontopetala.* R

» *oreades.* R

» *otites.* ≠

» *pudibunda.* ||| R N

» *pumilio.* |||

» *pusilla.* ||| N

» *reichenbachiana.* R

» *rupestris.* ||| R X

» *saxifraga.* R ≠

» *Schafta.* R ||| B ≠

L'une des rares plantes saxatiles d'automne; fl. d'un carmin vif, culture facile.

» *Tommasiniana.* R N

» *valesia.* ≠

» *Zawadsky.* R ||| ≠

Silphium lanceolatum. V

» *terebinthaceum.* V

Smilacina amplexicaulis. X O

» *racemosa.* O X

» *stellata.* O X

Smyrniurn perfoliatum. R

Sobolewsia clavata. R

Solanum Dulcamara. Med

Soldanella alpina. R T

» *Clusii.* R T

» *montana.* R T

» *pusilla.* R T

» *pyrolæfolia.* R T

Solidago alpestris. R

» *arctica.* R

» *canadensis.* V

» *humilis.* R

Solidago puberula. V

» *pygmæa.* R

» *reflexa.* Mel V

» *Riddeli.* V

» *rigida.* Mel

» *rigidiscula.* Mel

» *Shortii.* V + Mel

» *spectabilis.* V +

Spartium junceum. Le beau genêt d'or du

Midi. Mel

Spiræ Aruncus. O ÷

» *filipendula.* H

» *Kamtschatica.* H

» *palmata.* H

» *Ulmaria.* Med

» *venusta.* H

Specularia speculum. |

Stachys corsica. R T

» *glutinosa.* R

» *lanata.* B ≠ Mel

» *scardica.* R Mel

Statice latifolia. V R

» *tatarica.* V R

Statice des Canaries.

» *arborescens* (Statice en arbre).

» *brassicæformis.*

» *hybrida.*

» *imbricata.*

» *microphylla.*

» *macroptera.*

» *Perezii.*

» *Perezii* X *imbricata.*

» *puberula.*

Ces superbes plantes s'élèvent très facilement de graines. Non rustiques chez nous, elles constituent une précieuse décoration pour serres froides et appartements. Elles donnent, toute l'année, de grandes panicules de fleurs bleues et blanches.

Stipa gigantea. R

» *pennata.* R ≠

Stobæa membranifolia. V

» *radula.* V

Stokesia cyanea. R

Streptopus amplexifolius. O X

Stylophorum diphyllum. O ÷

» *japonicum.* O

» *lasiocarpum.* O

Swertia longifolia. T

» *perennis.* T

Symphiandra armena. ||| R

» *Hoffmanni.* ||| R

Synthesis reniformis. * O

Tamus communis. f O Med

Tanacetum vulgare. Mel Med

Telekia speciosa. V + Mel

» *speciosissima.* (vrai). ||| N

Telephium imperati. ||| S

» *orientale.* :: S

Teucrium Chamædrys. B R \neq Med Mel

- flavum. R \wedge
- lucidum. R |||
- marum. ||| \wedge
- montanum. ||| R
- orientale, à fl. très élégantes. R \neq
- polium. R B \neq
- pseudo-Chamædrys. R
- pyrenaicum. B R
- Scorodonia. \div Med

Thalictrum aquilegifolium. R O \div \neq

- Delavayi. V R +
- dipterocarpum. V R +
- Fendleri. R
- glaucum. H R V
- majus. R \neq
- minus. R \neq ::
- rubellum. R

Thelesperma gracilis. R ::**Thermopsis montana. :: R V****Thlaspi bellidifolia. R |||**

- cepæfolia. R |||
- rotundifolia. ||| T
- violascens. R

Thymus serpyllum. R \pm \neq Mel Med**Tiarella cordifolia. O \div** **Tofieldia calyculata. H T**

- glacialis. H T

Tolmiea Menziesii. O**Towsendia Wilcoxiana. |||****Trachelium cœruleum. \wedge** **Tradescantia undulatifolia. R**

- virginica. V

Tragopogon porrifolius. || \neq **Trautvetteria palmata. O \times** **Trientalis europea. O \times** **Trifolium alpinum. Pr R**

- Badium. Pr R

Tritoma, voir Kniphofia.**Trollius asiaticus. H**

- aurantiacus. H
- caltheoides. H
- europæus. H Med
- hybridus. H
- yunnanensis. H

Tropæolum poliphyllum. R

- pentaphyllum. R

Tulipa greigii

- marjoletti.

Tunica saxifraga. ||| \neq

- alba. ||| \neq

Ulex europæus (ajonc). + \times **Umbilicus pendulinus. |||**

- semenovi (v. en outre Cotyledon). |||

Viola latifolia. V +**Vaccinium Myrtillus (Myrtille). \times ::**

- uliginosum. \times ::
- Vitis-Idæa (Airelle). \times ::

Valeriana alliariefolia. R +

- celtica. *

Valeriana dioica. H

- integrifolia. R
- montana. R |||
- officinalis. H Med
- pyrenaica. R
- Saliunca. ||| R
- supina. ||| R
- tripteris. R |||

Vancouveria hexandra. O \div **Vella spinosa. |||****Veratrum album. R Med**

- nigrum. R

Verbascum Olympicum. \neq

- Phœniceum. R
- Songaricum. R \neq
- Thapsus. \neq Mel

Verbena venosa. R

- officinalis. Med

Vernonia altissima. V

- glauca. V

Veronica Allionii. \pm ||| R

- alpina. ||| N
- aphylla. ||| R
- armena. R
- austriaca. R
- Balcana. R
- bellidioides. R \times
- Biebersteiniana. R
- caucasica. R \pm
- crassifolia. R V +
- foliosa. R
- fruticulosa. \pm ||| R
- gentianoides. \pm R
- grandis. R
- incana. \pm
- longifolia (maritima) V + Mel
- alba.
- rosea.

- multifida. R

- nummularia. \pm R

- officinalis. \pm \div

- orchidea. R

- oxyphylla. R

- paniculata. V + R Mel

- pectinata. R

- pingnæfolia. R

- Ponæ. R

- prenja. R

- prostrata. \pm R

- rupestris. \pm R

- satireyoides. ||| R

- saxatilis. ||| R

- à fl. blanches.

- serpyllifolia. \pm R

- spicata. \pm R S

- spuria. R

- stenophylla. R

- tenuifolia. R

- Teucrium. R Pr \neq Mel

- Traversi. + R +

Veronica urticifolia. O ÷

» *virginica.* V Mel

» *Whitalli.* R

Vesicaria græca. ||| R

» *utriculata.* ||| ≠ Mel

Vicia Onobrychioides. R

» *Orobus.* R

» *sylvestris.*

» *unijuga.* R

Viola altaica. R

» *arenaria.* R

» *atlantica.* R

» *Bertolini.* R

» *biflora.* O R T

» *calcarata.* R Pr

» » *alba.*

» » *flavescens.*

» » *grandiflora.*

» » *semperflorens.*

» *campestris.* R

» *canadensis.* R

» *canina.* R ÷

» *cenisia.* ||| R

» *chinensis.* R

» *cognata.* R

» *comollia* (vrai). ||| *

» *cornuta.* R B

» » *à fl. blanches.*

» » *var. "Admiration"*

» » *var. grandiflora.*

» » *var. lutea.*

» » *var. à fl. roses.*

» *declivis.* R Pr ≠

» *delphinifolia.* R

» *dissecta.* ÷

» *distans.* ÷

» *elatior.* H R

» *Florariensis* (variété hybride, voisine de *rothomagensis* et qui fleurit perpétuellement; l'une des meill. fl. alpines). R ||| B V ≠

» *heterophylla.* |||

» *Jovi.* R

Viola latisejala. R

» *lutea.* R

» » *grandiflora.*

» *lutescens.* ≡ N R

» *multifida.* R

» *munbyana.* R

» *palmaris.* R

» *palustris.* H

» *Patrini.* R

» *pinnata.* R

» *pratensis.* R

» *pubescens.* O R

» *pumila.* R

» *purpurea.* R

» *rothomagensis.* R |||

» *splendida.* R B

» *Valderia.* ||| R

» *Zoyzii.* R

Vittadenia triloba. |||

Wahlenbergia lobelioides. R

» *Hederacea.* T

Wulfenia carinthiaca. ||| X

Wyettia angustifolia. R +

Xanthoceras sorbifolia. †

Yucca glauca. V

Addendum :

Anemone blanda.

Campanula grandis.

» » *alba.*

Cupressus Arizona.

Cyprés bleuâtre de toute résistance et rusticité et à croissance très rapide. C'est le feu président Roosevelt qui, il y a vingt ans, en a doté Floraire, où cet arbre se développe merveilleusement et fructifie abondamment.



Mur fleuri à Floraire.

EN PRÉPARATION

PAR H. CORREVEON

Un album des arbres représentant environ cent espèces d'arbres cultivés en Suisse (Illustrations de M^{lle} Adèle et de M. Fernand Correveon) à paraître vers la fin de l'année.

C'est un travail qui fera suite aux deux publications sur la Flore alpine et les Fleurs des Champs et des Bois dont il aura la forme et l'aspect.

L'ouvrage « Nos arbres » étant complètement épuisé et fréquemment redemandé, l'auteur a accepté la proposition de la maison Atar, bien connue par les superbes publications dont elle a la spécialité, de préparer un album qui sera richement illustré et dont le prospectus sera envoyé à toutes les personnes qui nous en feront la demande.

Les plantes vivaces.

Etude fortement documentée à laquelle nous travaillons depuis 1882 au moyen de toutes les données publiées jusqu'à ce jour. Avec la collaboration de M. W. Kesselring, chef de la maison, actuellement anéantie par les Bolchéviki, Regel et Kesselring de Petrograd. M. Kesselring, petit-fils et continuateur du fameux botaniste Edouard de Regel, est l'homme du monde entier le mieux instruit des questions concernant les plantes vivaces et surtout la flore asiatique, sa maison ayant été celle qui a le plus contribué à l'introduction de ces plantes-là dans l'horticulture.

Nous donnons, dans ce travail, toutes les instructions nécessaires à l'amateur de plantes de plein air, vivaces et ornementales. Grâce aux grandes bibliothèques horticoles et botaniques qui existent non seulement à Floraire, mais à Genève, nous sommes à même de fournir des renseignements précieux sur l'histoire des plantes cultivées dans les jardins, sur leur nomenclature, leur mode de culture et de reproduction, leur description, en un mot sur tout ce qui concerne les plantes vivaces cultivées ou à cultiver chez nous.



LES

PLANTES DES MONTAGNES ET DES ROCHERS

FOUGÈRES et ORCHIDÉES RUSTIQUES

Leur Culture dans les Jardins

par

H. CORREVON

Un volume illustré in-12.

Honoré de la médaille d'or de la Société nationale d'Horticulture de France
et de plusieurs prix d'honneur aux Expositions d'horticulture.

A la demande, fréquemment renouvelée, de rééditer plusieurs de ses ouvrages sur les plantes (dont quinze sont entièrement épuisés à l'heure actuelle), M. H. Correvon a répondu par un nouveau travail, beaucoup plus considérable que tous les autres et qui peut être considéré comme les résumant tous. C'est un gros volume in-12, de 491 pages, illustré par M. Fernand Correvon, et dont voici la table des matières :

Préface.

- Chap. I. — Les plantes dans les montagnes. Leur caractère particulier : leur nature ; leurs conditions d'existence.
- » II. — Acclimatation, semis et culture des plantes de montagnes.
- » III. — Cultures spéciales. Cultures dans le sphagnum, en terrines, en baquets ; la tourbière et la moraine.
- » IV. — Les plantes silicicoles ou calcifuges par le Dr Rosenthal.
- » V. — Les plantes saxatiles et murales ; les murs fleuris.
- » VI. — Construction des rocailles.
- » VII. — Jardins alpins et jardins botaniques alpins.
- » VIII. — Liste des plantes de montagnes cultivées dans les jardins. Leur indigénat, l'époque de leur floraison, leur description sommaire avec indication de la culture convenant à chacune d'elles.
- » IX. — Floraire. L'ombrosum ; toit fleuri ; gazons fleuris ; cultures sur radeau.
- » X. — La fougèraie.
- » XI. — Les orchidées de pleine terre.
- » XII. — Cactées rustiques.
- » XIII. — Les lys.
- » XIV. — La « Florarina ».
- Index alphabétique des genres du chapitre VIII.
- » des chapitres X, XI, XII et XIII.
- » des noms français.

Ce volume est en vente chez l'auteur, à « Floraire », au prix de
15 francs, port en sus.

LISTE DES OUVRAGES DE M. H. CORREVEON :

Les plantes des Alpes. Genève 1885	Epuisé.	
Les Fougères rustiques. Genève 1890	»	
Les Orchidées rustiques. Genève 1893.	»	
Le jardin de l'herboriste. Genève 1896	»	
Flore coloriée de poche (1 ^{re} et 2 ^{me} éd.).	»	
Flora tascabile (1 ^{re} et 2 ^{me} éd.).	»	
Les plantes alpines et de rocailles.	»	
Les Fougères de pleine terre.	Prix. . Fr.	4.—
Les Iris dans les jardins (Correvon et Massé)	»	6.—
Nos Cimetières (Publié par les soins de la commission d'art public.	Epuisé.	
Culture des plantes alpines dans le <i>Sphagnum</i>	»	
Della cultura delle piante alpine nelle regioni secche e calde	Prix. . Fr.	1.—
Album des Orchidées de l'Europe	Epuisé.	
Atlas de la Flore alpine (édité par les soins du Club alpin) Epuisé.		
Fleurs et Montagnes. Un vol. de poésies	»	
Par monts et par vaux (courses de montagnes)	»	
Nos arbres. Un volume in-8°, richement illustré. Epuisé.		
La Flore alpine. Un vol. richement illustré (2 ^{me} éd. entiè- rement revue et transformée	»	30.—
The Alpine Flora, translated into english by Mr. E.-W. Clayforth : a superb vol. with 180 pictures of alpine pl. in watercolours	»	30.—
Fleurs des champs et des bois ; 100 plates representing 180 plants of the swiss mountains and fields, splen- didely painted and executed. It is one of the most beautiful books which as ever been made on the subject	£ 1	» 30.—
Les plantes des montagnes et des rochers	»	15.—
Plantes et santé, publié en 1917, presque épuisé.	»	10.—

Les volumes de M. H. Correvon ont remporté le prix d'honneur aux deux Expositions nationales suisses de 1896 et 1914 et un grand nombre de médailles d'or et d'argent, etc.

The books of Mr. H. Correvon have got the « Prix d'honneur » in the National Swiss exhibitions of 1896 and 1914, and a great number of diplomes, of gold and silver medails and of distinctions.

HIVER 1920-1921

LISTE DES GRAINES

OFFERTES PAR LE

JARDIN CORREVON

(Jardin alpin d'acclimatation)

Floraire — (Chêne-Bourg) GENÈVE

33^{me} CATALOGUE DE GRAINES

Seeds of alpine
and perennial plants

OFFERED BY

THE

FLORAIRE Nursery, GENEVA

Gardening Books

Of the 21 books Mr. Correvon has published on gardening matters, more than half of them are already exhausted. The continual and pressing demand for them has decided the author to reproduce three of them in one volume which forms a complete summary of what has been already published.

This makes a big volume in-12, illustrated, of 491 pages.

LES

PLANTES DES MONTAGNES ET DES ROCHERS

FOUGÈRES et ORCHIDÉES RUSTIQUES

Leur Culture dans les Jardins

Contents of the book :

Préface.

- Chap. I. — Les plantes dans les montagnes. Leur caractère particulier leur nature ; leurs conditions d'existence.
- » II. — Acclimatation, semis et culture des plantes de montagne.
- » III. — Cultures spéciales. Cultures dans le sphagnum, en terrines, en baquets ; la tourbière et la moraine.
- » IV. — Les plantes silicicoles ou calcifuges.
- » V. — Les plantes saxatiles et murales ; les murs fleuris.
- » VI. — Construction des rocailles.
- » VII. — Jardins alpins et jardins botaniques alpins.
- » VIII. — Liste des plantes de montagnes cultivées dans les jardins. Leur indigénat, l'époque de leur floraison, leur description sommaire avec la culture convenant à chacune d'elles.
- » IX. — Floraire. L'ombrosum ; toit fleuri ; gazons fleuris ; cultures sur radeaux.
- » X. — La fougeraie.
- » XI. — Les orchidées de pleine terre.
- » XII. — Cactées rustiques.
- » XIII. — Les lys.
- » XIV. — La « Florina ».
- Index alphabétique des genres du chapitre VIII.
- » des chapitres X, XI, XII et XIII.
- » des noms français.

Price : 15 francs. To be had at Floraire.

LISTE DES GRAINES

OFFERTES PAR LE

JARDIN CORREVON

(Jardin alpin d'acclimatation)

Floraire — Chêne-Bourg, GENÈVE

Nos semences se vendent au prix de 75 cent. à 1 fr. le paquet.

Les personnes que le choix d'une collection embarrasse peuvent nous abandonner ce soin. Nous faisons des collections de graines à *notre choix*.

12 espèces pour	7 fr. 50
25 » »	15 francs
50 » »	30 »
100 » »	60 »

Nous préparons, sur demande, des collections de graines d'espèces propres aux usages suivants :

Rochers et jardins alpins.

Murailles fleuries.

Pentes arides.

Marécages.

Sous-bois.

Prairie alpine.

Sols calcaires.

Sols non calcaires.

Bordures.

Pl. vivaces pour plates-bandes.

Meilleures plantes pour bosquets.

Pl. mellifères pour abeilles.

Pl. médicinales.

Pl. à parfums.

En collections aux conditions indiquées ci-dessus.

Notice for English customers.

Orders for seeds received here at Floraire are punctually attended to, and the parcels of seeds are sent direct to England. We generally forward them as « samples » (6 d. postage). We send them registered for the trifling extracharge of 2 1/2 d. more. Goodsized packets of seeds are sold 10^d each, the only difference being that in the case of rarer seeds fewer are put into the packet.

Our seeds are our own crop or have been recolted on the Alps by our own people.

We do special collections for special exigences; as following; Alpine Rockeries—Wallgarden — dryslopes and barrenplaces Wettplaces—Marshes and boggardens—Underwoods—alpine and Swissmeadows—Chalk or clay soils—peat—borders and herbaceous perennials — dwarf and hedgingplants — Beesplants (Melliferous) — medicinalplants.

Explication des Signes.

Explanation of the marks in the seedlist.

Aq	=	Plantes aquatiques. — Waterplants.
B	=	Plante à bordure. — Dwarf & creeping good for the edging of borders.
H	=	Humidité. — Damp.
Med	=	Pl. médicinales. — Medicinalplants.
Mel	=	Pl. pour abeilles. — For bees!
N	=	Nord. — To place Northside.
O	=	Plante d'ombre. — plant. for de Shade.
1/2 O	=	Mi-ombre. — Half shade.
Pr	=	Propres à émailler la prairie. — Swissmeadow.
R	=	Plantes de rochers sans exigences spéciales. — Easy grown rockplants.
S	=	Plante spéciale pour soleil. — Sunny wanting plant.
Sp	=	Culture dans le Sphagnum. — Sphagnum culture or in the english « moraine ».
T	=	Tourbière. — English « moraine ».
V	=	Plantes vivaces. — Perennial border plants.
*	=	Espèce de culture spéciale. — Special treatment ¹ .
×	=	Espèce de terre de bruyère. — Peatplants.
∧	=	Plantes délicates à protéger l'hiver. — Tenderplants.
	=	» murales propres à semer dans les murs. — Wallplants.
≠	=	» propres à être naturalisées sur les pentes sèches et arides. — To naturalise on dry stopes and barren places.
::	=	» envahissantes. — Undergroundcreeping,
±	=	» traînantes et formant des touffes serrées. — Creeping.
÷	=	Pour sous bois. — For the Underwood.
+	=	Meilleures espèces pour longue floraison et fleur coupée. — Best sorts for cutting an the best lasting flowers.
f	=	Plantes grimpanes. — Climbing.
†	=	Arbuste pour rocailles. — Rockery shrubs.
	=	Annuelle. — Annual.
	=	Bisannuelle. — Biannual.

N. B. — Nous marquons généralement d'un X sur leur paquet les espèces de germination lente. — We generally mark X over the packet for the seeds which are slow germinating. Some genus (Ranunculaceae, Primulaceae, Rutaceae, etc.) are long to germinate. All our seeds are fresh and must all come up if well treated.

¹ Nous rappelons ici que le volume de M. H. Correvon, *Les plantes des montagnes et des rochers*, contient toutes les instructions nécessaires pour la culture des plantes délicates ainsi que pour l'élevage des plantes alpines par semis.

DU SEMIS DES PLANTES ALPINES

Nos graines sont toujours fraîches et ont leur faculté germinative en tant qu'elles ont été récoltées à Floraire ou par nos employés dans les montagnes. Mais il est des clients qui se plaignent de ne pas réussir et c'est pour ceux qui n'ont pas encore l'expérience des graines alpines que nous redonnons ici les renseignements qui ont déjà été publiés tout au long et au détail dans notre volume *Plantes des Montagnes et des Rochers* (Ch. II).

Faire un terreau très léger, sablonneux, juste assez nourrissant pour donner les éléments nécessaires à de toutes jeunes plantes. Nous le composons de : un tiers de tourbe ou terre de bruyère, un tiers de terre franche et un tiers de sable granitique ou calcaire suivant l'espèce. On sème en terrines, en pots ou en caissettes avec un fort drainage. Dans nos pays à climat continental, il est bon d'établir en-dessus du drainage une petite couche de Sphagnum qui entretient l'humidité constante et modérée, et même, ceci pour les climats plus secs et plus chauds encore, il faut mélanger un peu de Sphagnum tamisé à cette composition. Les pots ou terrines doivent être placés, enterrés si possible, dans une couche froide et bien aérée. S'il tombe de la neige il est bon de la laisser arriver sur le sol des semis. L'influence de la neige sur la germination des graines est certaine. Un de nos amis ayant lu ce que nous avons publié à ce sujet nous a montré dans un jardin de la montagne des semis d'une espèce à germination difficile, capricieuse et lente qui ont levé chez lui, après avoir été exposées à la neige pendant un long hiver, au premier printemps et dans une telle abondance qu'on peut dire que toutes les graines ont germé. En tous cas n'allez pas placer vos semis dans une serre chaude ainsi que l'on fait plusieurs de nos correspondants qui n'ont, cela va de soi, pas réussi.

Le semis sur place n'est à recommander que quand il s'agit de naturaliser des plantes dans des pelouses, des sous-bois et des coins arides et sauvages qu'on veut animer de fleurs, ou bien encore dans les fentes des murs pour établir des « murs fleuris ».

Il faut, en semant, enterrer très peu, surtout s'il s'agit d'espèces aux graines très fines, et faire attention à l'arrosage qui doit se faire très légèrement pour qu'il n'arrache ou n'enterre pas les graines.

Il va sans dire qu'il ne s'agit ici que des espèces de germination difficile et non des plantes vivaces ordinaires dont la plus grande partie se sèment en plate-bande ou sous couche, en pleine terre et comme cela se pratique pour les salades, les choux et les pensées.

Il faut se souvenir en outre qu'il est des espèces dont les graines germent lentement et difficilement. C'est le cas pour les Gentianées, les Renonculacées, les Ombellifères, les Liliacées et plusieurs autres genres. Nous marquons d'une croix sur le paquet les espèces de ce groupe-là.

Nous n'indiquons sur cette liste déjà très longue, que les espèces les plus demandées et les plus courantes. Nous avons récolté un beaucoup plus grand nombre de graines, mais n'en pouvons donner la liste ici. Qu'on sache seulement que nous possédons, outre les espèces indiquées ici, des graines de très nombreuses espèces rares et que nous fournissons sur demande.

Quand on nous demande des collections nous les formons d'espèces les plus faciles à cultiver et de germination prompte. Nous répétons que, dans ce cas, nos clients veuillent bien nous donner quelques indications sur les conditions offertes aux plantes, exposition, climat, etc.

Enfin, dites-vous bien que le plus tôt vous commandez vos graines le mieux vous serez servis.

Païement.

En francs suisses, s. v. p. En monnaie étrangère nous calculons au cours le plus avantageux pour le client, toujours *au-dessus* du cours officiel; aujourd'hui, par exemple, nous comptons les cours suivants: Angleterre 23 fr. par Lst.; France 50 cent. par fr. français (au lieu de 37); Belgique, idem; Italie, également. Nous faisons ainsi un sacrifice — qui est gros pour nous — parce que nous estimons qu'il est juste que nous nous efforçons, dans l'infiniment petite mesure où nous pouvons le faire, à rétablir le cours du change, la Suisse étant la première intéressée à la chose puisqu'elle souffre, plus que n'importe qui, de l'état de choses actuel qui est un grave obstacle à ses exportations.

Ces conditions ne s'appliquent pas aux articles de librairie que nous devons, à cause des conventions passées avec nos éditeurs, vendre en argent suisse seulement.

Nous prions nos nouveaux clients que nous ne connaissons pas encore de bien vouloir joindre à leur commande le montant soit en chèque sur la Suisse, soit en un mandat postal.

GRAINES DE PLANTES

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

DE

Montagnes et de Rochers, d'Arbustes de Rocailles

ET DE

PLANTES VIVACES

Acæna glabra. R

» *glauca.* R

» *inermis.* R \pm

» *ovalifolia.* $\wedge \pm$

» *samentosa.* $\wedge \pm$

Acanthus mollis. V S

» *spinosissimus.* V S

Achillea ageratum. \neq

» *aizoon.*

» *Clavenæ.* R |||

» *filipendula.* V +

» *herba Rota.* ||| S

» *holosericea.* R

» *impunctata.* ||| S

» *Kellereri.* R

» *macrophylla.* O

» *millæfolium.*

» » *roseum.*

» *mongolica.* R

» *moschata.* ||| S

» *nana.* S *

» *sarracenia (new).* \pm S

» *serbica.* R B |||

» *sericea, belle espèce basse à fl. jaune*

» *vif.* $\neq :: +$

» *tomentosa.* B R S \pm

» *umbellata.* R

» *Vandasii.* R S

Aconitum anthora. S R

» *Cammarum.* $\frac{1}{2}$ O V

» *Columbianum.* $\frac{1}{2}$ O V

» *Fischeri.* O V

» *lycoctonum (yellowish).* $\frac{1}{2}$ O V

» *napellus.* $\frac{1}{2}$ O V

» *paniculatum.* $\frac{1}{2}$ O V

» *septentrionale.* $\frac{1}{2}$ O V

» *variegatum.* $\frac{1}{2}$ O V

» » *var. album.* $\frac{1}{2}$ O V

» » *var. roseum.*

» *Wilsoni.* $\frac{1}{2}$ O V

Actæa rubra.

» *spicata.*

Adenophora liliifolia. V S

» *verticillata (vrai).* V S

Adenostyles albifrons. R O \div

» *alpina.* R O

» *leucophylla.* R S

Adonis pyrenaica. S

» *vernalis.* Grande anémone à fl. d'or;
mars-avril. S

» *Walziana.* S

Aethionema armenum. ||| S

» *antitauri.* ||| S

» *cappadocum.* ||| S

» *cordatum (Eunomia cordata).* ||| S

» *creticum.* ||| S

» *Florariensis.* ||| S

» *gracilis.* ||| S

» *grandiflorum.* ||| S

» *Kotschyi.* ||| S

» *saxatile.* ||| S

» *schistosum.* ||| S

» *stylosum.* ||| S

» *Thomasianum.* ||| S

» *trinervium.* ||| S

Agatheia petiolata (nouveau). ||| R

Agave virginica. S

Agróstemma coronaria (coquelourde). V

Ajuga pyramidalis. R \div

» *genevensis.* R Pr. ::

» *reptans.* \neq Pr \div

Alchemilla alpina.

Allium pedemontanum. R

» *Ursinum.* O \div

» *Victoriale (Herbe à 9 chemises)* R

Alsine austriaca. |||

» *Banatica.*

» *Bauhinorum.* |||

» *caucasica.*

» *hirsuta.* |||

Alsine juniperifolia. |||

» *laricifolia.* ||| R

» *liniflora.* R.

» *recurva.* |||

» *Rosani.* ||| R

» *stricta.* T

» *verna.* |||

» *villarsii.* |||

Althæa ficifolia. V

» *rosea* (Rose trémière). V

A fl. simples ou doubles ; à semer
ou planter dans les grands jardins
ou en bordure des massifs d'arbustes ;
fleurissent de mai à octobre.

Alyssum amaranthum. |||

» *alpestre.* |||

» *argenteum.* ≠ R S

» *condensatum.* R S

» *creticum.* |||

» *flexicaule.* ||| R

» *halimifolium.* |||

» *ideum.* |||

» *lucidum.* R

» *Mœllendorffianum.* |||

» *montanum.* R

» *orientale.* R

» *persicum.* R

» *petraeum.*

» *pyrenaicum.* |||

» *repens.* ||| 

» *rostratum.* R

» *saxatile.* R ≠

» » *var. citrinum*

» » *var. compactum.*

» *speciosum.* R

» *spinosum.* || R S

» *tortuosum.* R

» *Wiersbickii.* R ≠

» *Wulfenianum.* |||

Amphycome arguta. ∧ R S

Amsonia latifolia.

Anagallis tenella. T Sp

» *grandiflora.* |

» *linifolia.* ∧

Touffes serrées se couvrant de fl.
vermillon (mai-octobre).

Anchusa italica. Mel

» » *var. Dromoreana.* Mel

» » *var. Floraire.* Mel

Bonnes Bourraches vivaces de
grandes dimensions, aux innom-
brables fl. d'un bleu intense (mai-
octobre).

Androsace albana. * |||

» *Brigantiaca.* R X

» *carnea.* X R

» *chamaejasme.* R |||

» *coronopifolia.*

» *cylindrica.* * |||

» *glacialis.* * |||

Androsace Halleri.

» *Hausmanni.* * |||

» *Helvetica.* * ||| S

» *imbricata (argentea).* * ||| X

» *lactea.* R.

» *Mathildæ.* |||

» *obtusifolia.* R

» *oculata.* R

» *prætutiana.* |||

» *primuloides.* R

» *sarmentosa.* ± R

» *sempervivoides.* R

» *septentrionalis.* R |

» *villosa.* R S

» *vitaliana.* ||| R S

» *Wulfeniana.* ||| *

Anemone albana. R

» *alpina.* R ¹/₂ O

» *amoena.*

Anemone Baldensis. R

» *blanda.* R

» *Chinensis.* R

» *decapetala.* R

» *dichotoma (pennsylvanica).* :: R

» *Halleri.* R X

» *Hepatica.* R B

» *Hortensis*, en belles variétés.

» *magellanica.* R

» *montana.* R

» *multifida.* R

» *narcissiflora.* R

» *nemorosa.* O ÷

» *nigricans.* R X

» *polyantha.* R

» *pratensis.* R X

» *pulsatilla.* B R S

» » *var. alba.*

» *rivularis.* R H

» *rubra.* X

» *sulfurea.* R X

» *stellata.* S R X

» *sylvestris.* A R

» *transylvanica.* R

» *trifoliata.* R

» *vernalis.* R X

Anemonopsis macrophylla. O X

Angelica Archangelica. (*Angélique*). V Med

Antennaria alpina. R B

» *carpathica.* R

» *dioica.* R B ±

» *magellanica.* R

» *plantaginea.* B R ±

» *triplinervis.* B R ±

Anthemis austriaca. R

» *carpathica.* R

» *montana.* R

» *nobilis* (camomille romaine). Med

» *tinctoria.* R +

Anthericum ramosum. R (Petit lis des ro-
chers).

- Anthyllis montana.** R B \neq
Antirrhinum asarina. ||| R S
 » majus, type sauvage. ||| S V
 » corail.
 » Lightrose.
 » orangé vif.
 » variétés en mélange.
 » sempervirens. |||
 » var. roseum.
Aphyllanthes monspeliensis. R S
Aponogeton distachyon. Aq.
Aposeris foetida. O \div
Aquilegia alba. V Pr R
 » grandiflora.
 » alpina. O R
 (Récoltée dans les Alpes). La plus belle des Ancolies.
 » arctica. R
 » atrata. R Pr
 » californica. R V
 » canadensis. R
 » chrysantha. V
 » cœrulea. V
 » glandulosa. R
 » Haylodgensis. Superbe hybride à grandes fl. et à longs éperons.
 » Helenæ. R
 » hybrida extra (Floraire). V
 Fl. multicolores, grands éperons, teintes les plus harmonieuses; pl. d'un effet superbe, composant des tableaux merveilleux.
 » Othonis. R
 » oxypetala. R
 » pubiflora. R
 » pyrenaica. R
 » roses. R Pr
 » skinneri. Fl. rouge et jaune. R
 » transylvanica. R
 » vulgaris. Pr R
 » vulgaris, variétés cultivées à la haute montagne; superbe choix.

Les ancolies sont d'excellentes pl. d'ornement, de culture très facile, s'accommodant également de l'ombre et du soleil, mais préférant la mi-ombre et la fraîcheur. Leurs graines germent de suite. A recommander les var. de vulgaris pour jeter dans un sous-bois ou une pelouse fraîche; effet merveilleux, floraison abondante en mai-juin.

- Arabis albida.** R
 » alpina. R
 » nana compacta.
 » superba.
 » arenosa.
 » bellidifolia. R H
 » caucasica. R
 » cœrulea. R
 » Halleri. | R

- Arabis lucida.** R
 » ovirensis. R
 » procurrens. R
 » pumila. R
 » rosea. |||
 » Soyeri. R
 » Sturii. R
Arctostaphylos alpina.
 » Uva Ursi (*raisin d'ours*) R \neq \pm Med
Arctotis grandis. | (Aster argenté du Cap.)
Arenaria Balearica. |||
 » biflora. |||
 » graminifolia. R Pr
 » grandiflora. R
 » Kotschyana. |||
 » laricifolia. |||
 » lateriflora. |||
 » longifolia. |||
 » montana. ||| R
 » nardiflora. |||
 » purpurescens. R
 » Sajenensis. R
 » Saxifraga. |||
 » sericea. R
 » tetraquetra. |||
 » tridentina.
 » verna. R
Armeria alpina. R
 » caespitosa. ||| R
 » Halleri. R
 » majellensis. R B
 » maritima. R B (vulgaris).
 » à fl. blanc pur.
 » plantaginea. R
 » setacea. R
Arnica montana. T Sp R \times Med
Aronicum scorpioides. R T
Artemisia absinthium. V \neq Med
 » arborea. \wedge
 » atrata. |||
 » austriaca. R ::
 » discolor. R
 » glacialis. ||| R
 » glauca. :: B
 » granatensis. R |||
 » lanata. |||
 » maritima. |||
 » mutellina. (Génipi). Med R
 » nana. R
 » rupestris. R
 » sacrorum. :: \neq
 » spicata (vrai Génipi). Med ||| * \times
 » Tournefortiana. \neq
 » valesiaca. ||| \neq \times
 » vulgaris. \neq Med
Asarum canadense. O B \div
 » europæum. O B \div
Asclepias Cornuti. V :: Mel
 » tuberosa. V + Mel
 L'une des plus brillantes des pl.

vivaces; 50 cent. haut, fl. en ombelles étalées, d'un orangé très vif, grand effet. (Août-octobre).

Asparagus tenuifolius. R S

Asperula azurea.

» *cynanchica*. R

» *galioides*. R

» *hirta*. R

» *odorata* O ÷ Med

» *taurina*. O ÷

Asphodelus albus (*Asphodèle*). ≠

Asphodeline cretica. V

» *lutea*. V (Bâton de Jacob).

Aster alpinus. R

» » à fl. blanches. R

» » à fl. roses.

» *amelloides*. + Mel

» *Amellus*. Pr ≠ Mel

» *Amellus roseus*. +

» *bessarabicus*. + V Mel

» *cordifolius*. V Mel

» *diplostephioides* (subcœrul). R Br

» *himalaicus*. R

» *hybridus*. + Mel

» *Ibericus*. + V

» *lævis*. V

» *novi-Belgii*. Mel

» *Porteri*. ≠ ||| Mel

» *Parmicoides*. V

» *pumilus*. R

» *pyreneus* (vrai). R

» *roseus*.

» *sericeus*. R

» *suffruticosus*. R

Astilbe Davidi. H

Délicate panicule de fleurs roses, dressée en gros épis.

» *rivularis*. H

Astragalus alopecuroides. R

» *alpinus*. R

» *aristatus*. |||

» *cicer*. ≠ ÷

» *depressus*. R

» *exscapus*. S (du Simplon).

» *glycyphyllos*. ≠

» *himalaicus*. R

» *monspessulanus*. ||| R

» *Onobrychis*. R ±

Astrantia carinthiaca. R

» *gracilis*. R

» *major*. H R O ÷ Pr Mel

Plante très montagnarde et des plus faciles à cultiver; l'une des meilleures pl. mellifères.

» *major* à fl. roses.

» *minor*. ||| N X

Athamante cretensis. R |||

Atragene alpina. S O f

» *Coreana*, à fl. jaunes.

Atropa Belladonna (*Belladone*). O Med

» » à fruits jaunes.

Aubrietia deltoidea. ||| B

» *grandiflora*. ||| B

» *Eyrii*. ||| B

» *erubescens*. ||| B

» *Fire King*. ||| B

» *Florariensis*. ||| B

» *græca*. ||| B

» *Hendersonni*. ||| B

» *hybrida superba*. ||| B

» *italica*. ||| B

» *Floraire*. ||| B

» *Kötschyi*. ||| B

» *Leichtlini*. ||| B

» *libanotica*. ||| B

» *Lilac Queen*. ||| B

» "Lloyd Edward". ||| B

» *Moehreimi*. ||| B

» *Paul's lilac*.

» *Peter Barr*. ||| B

» *Pinardi*. ||| B

» *Pritchardi*. ||| B

» *purple King*. ||| B

» *purpurea*. ||| B

» *Richardsoni*. ||| B

» *Rosea grandiflora*.

» *Souvenir de W. Ingram*. ||| B

Petites Crucifères vivaces formant des tapis couverts de fl. d'un lilas plus ou moins vif suivant les espèces. Excellentes pour les murailles. Elles se sont naturalisées sur les murs des environs de Vevey où, dès le mois de février, elles forment une décoration merveilleuse.

Azalea procumbens. ||| X

Banffia petræa. |||

Baptisia australis. V

Bartsia alpina. *

» *spicata*. R

Bellidiastrum Melchelli. H

Bellis cœrulescens. ||| R

» *mexicana*. R

Bellium belliioides. |||

» *nivale*. |||

Berberis Wilsoni; le plus beau du genre, nouvellement introduit de l'Asie centrale.

Berkheya purpurea. R

Betonica alopecuroides.

» *grandiflora*. Pr R

» *grandiflora superba*. Pr R

» *hirsuta*. Pr R

» *officinalis*. Pr R

Bidens dahlioides. *Dahlia* vivace et rustique à fl. roses.

Biscutella lævigata. Pr R Mel

» *lucida*. R

Blitum virgatum (Epinard-fraise).

Plante curieuse, portant comme des fraises d'un vermillon très vif, à l'aisselle des feuilles.

Bocconia microcarpa. V

Borago laxiflora. R H

» *officinalis*. Mel

Boykinia rotundifolia. ||| N

Brassica repanda. ||| R

Braya pinnatifida *

Brickellia grandiflora (*Ageratum* jaune).

Briza major.

» *media*.

Budleya variabilis.

Arbuste à croissance rapide, à floraison abondante (fleurs en grappes violet et or) et qu'on élève facilement de graines.

Bulbocodium latifolium. R

» *vernum*. Pr R

Bupthalmum grandiflorum. R

» *salicifolium*. Pr ::

» *speciosissimum* (très rare). ||| N

Bupleurum falcatum. R Pr

» *fruticosum*. †

» *longifolium*. R

» *ranunculoides*. R C

» *stellatum*. R |||

Calacia sonchifolia. I Fl. vermillon vif.

Calamintha acynos. R

» *alpina*.

» *grandiflora*. R ::

Calandrina umbellata. R

Calla palustris. Aq

Caltha palustris. H

» *polysepala*. H

Calystegia dahurica. f

Camomille (v. *Anthemis nobilis*).

Campanula acutangula. |||

» *alata*. V

» *alliarisefolia*. V Fl. blanches décoratives. ⇌

» *Allionii*. R |||

» *barbata*. R Pr

» *bellidifolia*. |||

» *betonicaefolia*. R

» *bononiensis*. R

» *capitata*. R

» *carpathica*. B V R

» » *alba*.

» » » *grandiflora*.

» » » *var. compacta*.

» » *Riverslea*.

Le *C. carpathica* et ses variétés (faciles à élever de semis) sont d'excellentes pl. de rochers, de plates-bandes et de bordures; fleurissent de mai jusqu'en automne; grandes fl., violettes ou blanches; pl. basses et formant tapis.

» *cenisia*. ||| *

Campanula cervicaria. R X

» *collina*. R ::

» *crispa*. R |||

» *cristallocalyx*. R

» *dahurica*. Pr R

» *elatinoides*. ||| O

» *eriocarpa*. V

» *excisa*. ||| *

» *Fenestrellata*. |||

» *flexuosa*. ||| S

» *garganica*. ||| R

» *glomerata*. Pr R

» » *var. à fl. blanches*.

» » *var. acaulis*.

» *grandis*. V

» » *à fl. blanches*.

» *incurva*. R

» *istriaca*. |||

» *Kolenatiana*. R

» *lactiflora*. R $\frac{1}{2}$ O ⇌

» *lamiifolia*. R

» *lanata*. ||| (*velutina*).

» *latifolia*. R V O ⇌

» » *à fl. blanches*.

» » *azurea*.

» *libanotica*.

» *longistyla*. R

» *macrantha*.

» *macrorrhiza*. |||

» *medium*, type des Htes-Alpes. R ||

» *medium*, type des jardins, mélange de toutes couleurs (*Campanule Carillon*).

» la même à fl. doubles.

» *michauxioides*. R

» *mirabilis*. |||

» *muralis* (*Portenschlagiana*). |||

» *nitida*. R

» *nobilis*. R

» *Palasiana*. R

» *patula*. Pr |

» *pelviformis*. R

» *persicifolia*. V R O ⇌

» » *alba superba*.

» » *azurea*.

» » *à fl. doubles*.

» *petraea*. ||| S

» *phytidocalix*. R

» *psyllostachia*. R

» *pulloides*. R

» *punctata*. R ::

» » *à fl. blanches*.

» *pusilla*. ||| R

» *pyramidalis*. ||| R Mel

» » *alba*.

» *Raddeana*. R

» *Raineri*. ||| R S

» *rapunculoides*. Pr

» *rhomboidalis*. Pr R

» *rotundifolia*.

Campanula rotundifolia alba.

- » rupestris. |||
- » ruthenica. R
- » Sarmatica. R
- » Saxifraga. R |||
- » Scheuchzeri. R
- » » à fl. blanches.
- » sibirica. R
- » soldanellæflora. R
- » speciosa. R
- » spicata. || R
- » stenocodon. |||
- » Steveni.
- » subpyrenaica.
- » Tenorei.
- » thrysoidæa. R.
- » tomentosa. |||
- » Tommasiniana.
- » Trachelium. R ≠
- » » à fl. blanches.
- » » à fl. doubles.
- » urticifolia. ÷ R
- » Vanneri. |||
- » Yenzloi. ||| R
- » versicolor. ||| R

Canarina Campanula. ∧

Cardamine alpina. ||| *

- » asarifolia. H
- » chenopodifolia. R
- » resedifolia. |||
- » sibirica. H

Carduus acanthoides. Pr

- » aurisocus. Pr
- » defloratus. Pr
- » nutans. Pr Mel

Carex Baldensis. H

- » Buchananii (feuill. brun).

Carlina acaulis. R Pr ≠

- » acanthifolia. R ≠
- » cynara (Chardon d'or). R

Cathcartia villosa. O X

Caulophyllum thalictroides. O

Cedronella triphylla. ∧

Centaurea alpina. R

- » Babylonica. V
- » dealbata. R
- » macrocephala. V
- » montana. R :: O ÷
- » » à fl. blanches.
- » præalta. R
- » Ruthenica. R
- » rutifolia. R
- » uniflora. R

Centranthus angustifolius. ≠ R |||

- » ruber (Valér. rouge des murs). ||| ≠
- » R V
- » alba.
- » atrorubens.

Les Centranthus ou Valériane des murs sont recommandables comme pl. de haute

décoration pour la garniture de plates-bandes, des grands rochers, des murailles surtout. Elles fleurissent abondamment de juin jusqu'en hiver et font un tableau merveilleux dans un paysage.

Cephalaria alpina. V Mel

- » leucantha. Mel.

Cerastium album. ||| R

- » alpinum.
- » argenteum. ||| R
- » columnæ. ||| R S
- » glaciale. ||| R S.
- » illyricum. ||| R S
- » Lerchenfeldianum. ||| R S
- » tomentosum. ||| R S
- » uralensis. ||| R S
- » villosum. ||| R S
- » vulgatum. ||| R S

Cerinthæ alpina. R

Chænostoma polyantha. ∧

- » fastigiata. ∧
- » viscosa. ∧

Chamæpeuce diacantha. ||

Cheiranthus Allionii, sorte de giroflée odorante aux fleurs du plus bel orange, se succédant de juin à fin novembre; pl. de grand effet.

|| + R Mel

- » Cheiri (Giroflée des murs). ||| V

- » » var. horticoles.

- » nanus. R

Chelidonium Franchetianum. O

Chelone barbata. V + Mel

L'une des plus brillantes d'entre les plus vivaces; fl. vermillon ardent (juin-novembre).

- » imberbe. V
- » obliqua. V

Chrysanthemum alpinum. R *

- » arcticum. R
- » coronopifolium. R.
- » maximum. V + (grande marguerite blanche).
- » uliginosum. V

Chrysogonum virginianum. R

Chrysopsis foliosa. R

Chrysosplenium alternifolium. ||| H N

- » oppositifolium.

Cimicifuga cordifolia. O

- » foetida. O
- » racemosa. O
- » simplicifolia. O

Cineraria aurantiaca. R

- » campestris. R
- » suaveolens. V Mel

Circaea Lutetiana. O ÷ ::

Cirsium acaule. ± Pr Mel

- » Eriophorum. Pr R Mel
- » Erysithales. O ÷
- » ferox. ≠ R

Cirsium heretophyllum. **H**
 » *monspessulanus*. **H**
 » *spinosissimum*. **R H**
Cistus *albidus*. \wedge †
 » *incanus*. \wedge †
 » *ladoniferus*. \wedge †
 » *laurifolius*. †
 » *monspeliensis*. \wedge ±
 » *salviæfolius*. †
 » *vaginatus*. (*Bertolettianus*). \wedge
 Ce sont les délicieux Cistes des garigues de la Méditerranée.

Claytonia perfoliata. **H T R**
 » *virginiana*. **H T R**

Clematis *Buchanani*. *f*
 » *flammula* (liane de neige). *f*
 » *Fremonti*. **V**
 » *graveolens* (fl. jaunes). *f*
 » *integrifolia*. **V**
 » *montana*. *f*
 » *var. rosea*.
 » *recta*. **V R** ≠
 » *purpurescens*.
 » *stans*. **V**
 » *Tangutica* (fl. jaunes). *f*
 » *vitalba*. *f*
 » *viticella*. *f*

Clintonia borealis. $\frac{1}{2}$ **O**
Codonopsis lanceolata. **S R**
 » *ovata*. **S R**

Colchicum autumnale. **Med**

Collomia grandiflora. |

Colluria geoides. **R**

Coluteocarpus reticulatus. **R**

Commelina cœlestis. \wedge

Convallaria majalis (*Muguêt*). ::
 » *var. à fl. roses*.

Convolvulus cantabricus. ± \wedge

» *mauritanicus*. ± \wedge
 » *Soldanella*. **R** ||| ≠

Coreopsis grandiflora. **V** +

» *lanceolata*. **V** +
 » *oculata*. **V** +
 » *Philadelphica*. **V**
 » *tenuifolia*. **V**
 » *tripteris*. **V**

Pl. viv. de toute première importance; cult. facile; fleur. tout l'été: jaune très vif; grand effet.

Cornus canadensis. ± **T** ::
 » *suecica*. ± **T** ::

Coronilla cappadocica.

» *coronata*. † **Mel**
 » *Emerus*. † **Mel**
 » *montana*. **Pr R** ≠ **Mel**
 » *varia* **Pr** ≠ :: **Mel**

Cortusa Matthioli. **O H**

» *grandiflora*. **O H**

» *pubens*. **O H**

Corydalis australis. **R**

Corydalis bulbosa (cava). **O** ÷÷

» *cheilanthifolia*. ||| **N**
 » *glauca*. |
 » *Halleri*. **R**
 » *lutea*. ||| **R**
 » *ochroleuca*. ||| **R**
 » *ophiocarpa*. **O** ÷÷
 » *rupestris*. |||
 » *vaginans*. **R**

Cotoneaster adpressa.

» *applatana*.
 » *congesta*.
 » *Davidiana* (*horizontalis*). **Mel**
 » *Franchetti*.
 » *frigida*.
 » *humifusa*.
 » *monpinensis*.
 » *pauciflora*.
 » *rupestris*.
 » *thymifolia*.
 » *vulgaris*.

* Excellents arbustes pour rocailles, recherchés des abeilles.

Cotyledon (Umbilicus) chrysanthus. **R** |||

» *libanoticus*.
 » *oppositifolius*. **R** |||
 » *Pestalozzae*. |||
 » *platiphyllus*. |||
 » *sempervivum* (*Sedum semp.*). |||
 » *umbilicus*. |||

Crambe cordifolia. **V**

» *maritima*. **V**

Crepis aurea. **R H**

» *pygmæa*. **R** |||

» *rubra*. **Pr**

Crocus vernus. **Pr**

Crucianella stylosa ± **B R**

» *carminata*.

Cuphæa miniata. |

Cyananthus lobatus. ||| **R**

Cyclamen africanum. **R**

» *Atkinsii*. **R**
 » *Balearicum* (vrai). **R**
 » *Coum type*. +
 » *var. à fl. blanches et roses*.
 » *europæum*.
 » *album*.
 » *hederæfolium*. **R** ÷÷
 » *album*.
 » *ibericum*. **R**
 » *latifolium*. **R**
 » *Rohlfianum*. **R**

Cynoglossum nervosum. **R**

Cypripedium Calceolus. **O** ×

Cytisus albus.

» *capitatus*.

Excellent arbrisseau de 1 m. à 1 m. et demi qui se recouvre de fleurs jaunes pendant une bonne partie de l'année.

- caramanicus.
- » hirsutus.
- » nigricans.
- » purpureus.
- » radiatus.

Délicieux petit arbuste bas, aux rameaux étalés, propre à garnir les rocailles.

- » scoparius (Sarthamnus scoparius).

Daphne alpina.

- » buxifolium.
- » caucasica.
- » Gnidium.
- » Laureola.
- » mezereum.
- » » à fl. blanches.
- » olcoides.
- » Philippi.
- » pontica.
- » pseudo-mezereum (luteum).
- » striata.

Delphinium Belladonna. + V

- » cardinale. R
- » chinense. Superbe, à fl. d'un bleu très pur. R + V
- » elatum (type). R
- » formosum. R V
- » » celestinum.
- » grandiflorum. R V
- » » var. album.
- » » var. azureum.
- » » var. Tom Thumb.
- » hybridum, mélange des meilleures variétés. Excellentes pl., robustes et florifères, donnent les plus beaux tons bleu pur plus ou moins vifs, plus ou moins violacés; très faciles à élever et se développant rapidement.
- » hybridum à fl. doubles (mélange).
- » Mœhreimi. V
- » nudicaule.
- » sulfureum (Zall). R V
- » superbissimum. V

Dentaria bulbifera. ÷ R

- » digitata. ÷ R
- » pinnata. ÷ R

Dianthus acaulis. R ||| (D. frigidus).

- » alpestris. R
- » alpinus. R |||
- » arenarius. R
- » armeria. R ÷
- » arvernensis. R B
- » asper. R
- » Balbisii. R
- » barbatus (Oeillet des poètes).
- » cæsius. R
- » » var. grandiflorus.
- » capitatus.
- » caryophyllos. V

Dianthus carthusianorum. Pr R

- » chinensis. =
- » » laciniatus.
- » collinus. R
- » cruentus. R
- » Cyri. R
- » deltoides. R B Pr
- » » albus.
- » » superbus.

Esp. tapissante et naine, très florifère, solide et de culture facile.

- » diadematus.
- » diffusus. R
- » furcatus. R
- » gallicus (vrai), délicieusement parfumé. R |||
- » giganteus. R
- » glacialis. X
- » Holtzeri. R
- » Kamtschatikus. R |||
- » Liboschitzianus. R
- » Liburnicus. R
- » monspessulanus. Pr R
- » neglectus. ||| R
- » petraeus. R
- » Plumarius. R B ±

L'une des meilleures pl. à bordure et aussi l'une de celles qui garnissent le mieux les rocs, les sommets des murs, les pentes arides au soleil; flor. prolongée et abondante; fl. très odorantes.

- » Plumarius var. bicolor.
- » » candidus.
- » » Cyclope.
- » » floribundus.
- » » grandiflorus.
- » » hortensis.
- » » laciniatus.
- » » lilacinus.
- » » robustus.
- » » suaveolens.
- » » zonatus.

Ces variétés d'œillets rampants sont excellentes pour former des bordures, garnir des talus secs et le sommet des murs.

- » puberulus. R
- » pungens. R
- » pyridicola. ||| R
- » Requieni. R
- » rupicola. R
- » Segueri. R
- » speciosus (de la Bernina). R Pr
- » spinosus. R |||
- » stellaris. I
- » subacaulis. ||| R
- » subcaulescens. R
- » subfastigiatus. R
- » subneglectus. R

Dianthus superbus. $\ddot{\div}$ R $\frac{1}{2}$ O

» var. *albus.*

» var. *nanus.*

» *Sternbergi.* R

» *sylvestris.* R Pr \neq

» *versicolor.* R

» *viscidus.* R

» *wimmeri.* R

Dictamnus albus. V R S

» *Fraxinella.* V R S

Digitalis ferruginea. R

» *grandiflora.* R $\ddot{\div}$ Med

» *laevigata.* R

» *lutea.* R

» *ochroleuca.* R

» *orientalis.* R

» *parviflora.* R

» *purpurea.* V $\ddot{\div}$ Med

» à fl. blanches.

Ce sont des pl. solides, à flor.
prolongée; cult. très facile.

Dimorphotheca aurantiaca. |

Dioscoræa caucasica. f

» *pyrenaica.* O R

Diotis candidissima. R

Dodecatheon giganteum. R

» *Jeffrayi.* R

» *Mædia.* R H

Doronicum carpetanum. R

» *corsicum.* R

» *excelsum.* V

Draba affinis. ||| R

» *aizoides.* ||| R

» v. *grandiflora.* ||| R

» *alpina.* R

» *altaica.* ||| R

» *armata.* ||| R

» *athoa.* ||| R

» *aurea.* ||| R

» *Bertholoni.* ||| R

» *borealis.* ||| R

» *bronchialis.* ||| R

» *bruniifolia.* ||| R

» *carinthiaca.* ||| R

» *cortata.* ||| R

» *corsica.* R

» *cuspidata.* ||| R

» *Dedeana.* R

» *Flachizensis.* R

» *frigida.* ||| R

» *Haynaldi.* ||| R

» *hispanica.* ||| R

» *incana.* ||| R

» *Kotschy.* ||| R

» *laponica.* ||| R

» *lasiocarpa.* 10 gr. 6 sh. ||| R

» *laxa.* ||| R

» *Loiseleur.* ||| R

» *longirostia.* ||| R

» *magellanica.* ||| R

Draba nivalis. R

» *olympica.* |||

» *oxycarpa.* ||| R

» *pycnosperma.* ||| R

» *pyrenaica.* ||| (Petrocallis pyr.)

» *repens.* ||| R

» *rigida.* |||

» *rupestris.* ||| R

» *Salomoni.* ||| R

» *scabra.* ||| R

» *Scandinavica.* ||| R

» *stellata.* ||| R

» *streptocarpa.* ||| R

» *subamplexicaulis.* ||| R

» *Thomasii.* ||| R

» *tomentosa.* ||| R

» *Traunsteineri.* ||| R

» *tridentata.* ||| R

» *Zahlbrückneri.* ||| R

Dracocephalum austriacum. R

» *botryoides.* R

» *nutans.* R

» *Ruprechtii.* R

» *Ruyschianum.* R

» *speciosum.* R

» *thymifolium.* R

» *turkestanicum.* R

Drosera longifolia. Sp Med

Dryas Drummondii. \pm

» *integrifolia.* |||

» *lanata.* \pm

» *octopetala.* \pm ||| R

L'une des plus gracieuses pl.
tapissantes pour rochers, grandes
fl. blanches; semis facile.

» *octopetala minor.*

» *tenella.*

Echinops niveus. V \neq

» *Ritro.* + V \neq

» *sphaerocephalus.* \neq

Echium petraeum (*Lithorp petr.*). |||

» *rubrum.* \wedge

Edelweiss (voir *Leontopodium*).

Edrayanthus dalmaticus. ||| R

» *bosniacus.* |||

» *graminifolius.* ||| R

» *tenuifolius.* ||| R

Empetrum nigrum. \pm T R

Ephedra Helvetica. ||| S \neq

L'une des pl. les plus curieuses
de la flore suisse.

Epilobium abyssinicum. H

» *alpinum.* ||| N

» *angustifolium.* O $\ddot{\div}$::

» *Fleischeri.* |||

» *glabellum.* ||| N

» *Hectori.* R

» *hirsutum.* H

» à fl. blanches.

» *Linnæoides.* R T

- Epilobium pubens.* **R N**
 » *rosmarinifolium.* \neq **R**
Eranthis cilicica. **R**
 » *hiemalis.* **Pr** $\ddot{=}$
Eremostachys laciniata. **V**
Eremurus altaicus.
 » *Bungei.*
 » *Elwesianus.*
 » *Himalaicus.*
 » *Him-robustus.*
 » *induriensis.*
 » *robustus.*
Eremurus Shelfordi.
 » *Tubergeni.*
 » *Warei.*
Erica carnea.
 » *ciliaris.*
 » *cinerea.*
 » *stricta.* **R S**
 » *vulgaris (Calluna).* \times
Erigeron alpinus. **R**
 » *aurantiacus.* **R**
 » *ororantiacus hybridus.*
 » *caucasicus.* **R**
 » *compositus.* **R**
 » *elatiior.* **V**
 » *flagellaris.* **R** \neq
 » *glabellus.* **B R**
 Très voisin de l'Aster des Alpes.
 » *macranthus.* **R**
 » *oreganum.* **R**
 » *Philadelphicus.* **H R**
 » *pulchellus.* **R**
 » *speciosus.*
 Excellente plante vivace, à grands capitules lilas foncé autour d'un disque d'or; juin-automne.
 » *trifidus.* **R**
 » *uniflorus.* **R**
Erinacea pungens. **S**
Erinus alpinus. $|||$ **R**
 » à fl. blanches. $|||$ **R**
 » à fl. carmin vif. $|||$ **R**
 » *hirsutus.* $|||$ **R**
 » à fl. blanches. $|||$ **R**
 » *hispanicus.*
 » *roseus.*
Eriogonum arboreum. **R**
 » *Jamesi.* **R**
 » *flavum.* **R**
 » *racemosum.* **R**
 » *umbellatum.* **R**
Eriophorum angustifolium. **H T**
 » *vaginatum.* **H T**
Eriophyllum caespitosum. **R** $|||$
Eritrichium nanum (Roi de l'Alpe). $|||$ *
Erodium amanum. **R** $|||$
 » *cheilanthisfolium.* **R** $|||$
 » *chrysanthum.* **R** $|||$
 » *Crispii.* **R**

- Erodium daucoides.* **R**
 » *Guicciardi.* **R**
 » *hymenoides.* **R** $|||$
 » *macradenum.*
 » *Manescavi.* $\frac{1}{2}$ **O**
 Bonne pl. de roc. fleurissant tout l'été et l'automne.
 » *Olympicum.* **R**
 » *Romanum.* **R**
Erpetion reniforme. **H T**
Eryngium alpinum (Panicaud ou Chardon bleu des Alpes). **R V Pr** +
Eryngium amethystinum. **R**
 » *Bourgati (Le superbe chardon bleu des Pyrénées).* **R Pr** +
 » *cæruleum (chardon bleu grec).* \neq +
 » *Davosianum.* (C'est la variété très foncée de l'E. alpinum).
 » *Florariensis.* **R**
 » *giganteum (chardon bleu du Caucase).* **R** \neq
 » *maritimum.* **R V** \neq
 » *planum (chardon bleu de l'Atlas).* \neq
 » *serbicum (vrai).* **R**
 » *Spinalba (du Mont-Ventoux).* \neq
 » *violaceum.* **V**
Erysimum Allionii (Cheiranthus). **V R** + \neq
 Plante excellente à floraison prolongée. fl. orangé très vif; parfum suave; culture extra-facile.
 » *Kotschyanum* $|||$
 » *ochroleucum.* **R** $|||$
 » *pulchellum.* **R** \neq
 » *purpureum.* $|||$
Erythraea centaurea. **Pr.** |
 » *Giffusa.*
 » *gothica.* **T**
 » *linarifolia.* **T**
 » *littoralis.* **T**
 » *ramosissima.* **T**
 » *Rumelica.* **T**
Eschscholzia aurantiaca. $||$ **B** \neq +
 Plante semi-vivace naine qui se resseme d'elle-même avec abondance et donne toute l'année et jusqu'en hiver de grandes fl. de pavots d'un orangé très vif.
Eschscholzia à fl. blanches, à fl. roses, à fl. carmin, à fl. jaunes pâle, etc. en coul. sépar. ou en mélange.
Euphorbia altissima. **R** \neq
 » *Girardiana.* **R** \neq
 » *Lathyris.* **R** $||$ **Med**
 » *Myrsinites.* $|||$ **R**
 » *pilosa (E. Polychroma).*
 » *spinosa.* **R** $|||$ \neq
Eupatorium ageratoides. **V** +
Farsetia eriocarpa. \neq **R**
Ferula communis.
 » *glauca.*

Grandes ombellifères au feuillage
finement divisé et décoratives.

- Festuca crinum-ursi.* B R ≠
Fœniculum vulgare (Fenouil).
Fragaria rosesflora. R
Francoa appendiculata. R
Fritillaria askabadensis. R
 » *delphinensis.* R Pr
 » *imperialis.*
 » *Meleagris.* Pr
 » *pyrenaica.* R
Funkia cœrulea. O
 » *cordata.* O
Gagea Liotard. R
Galega officinalis. ≠
Gaillardia grandiflora. +

Belle plante vivace à très grandes
fl. de soleil, rouge et jaune; grand
effet; culture facile (juil.-déc.).

- Galium purpureum.* Très précieuse plante
d'ornement pour rochers et jardins
alpins; gazon fin, fl. d'un brun
noir. R ± ≠
 » *verum.* Pr

- Galatella incana.* V
Galtonia candicans (Jacinthe du Cap). V
Gaura Lindheimeri. V +

Plante vivace à longs épis rose
chair, excellente pour la fleur cou-
pée; juin-novembre.

- Genista andreana* (fl. rouge et jaune).
 » *auxantina.*
 » *germanica.*
 » *horrida.*
 » *juncea.*

Le brillant Genêt jaune d'Espa-
gne, l'un de nos meilleurs et plus
solides arbustes.

- » *pilosa.* ≠
 » *radiata.* ≠
 » *sagittalis.* ≠ Pr
 » *tinctoria.*

Tous ces Genêts sont excellents
pour garnir les rocailles au soleil.
Floraison prolongée, plantes solides.

- Gentiana acaulis,*

L'une des meilleures plantes des
Alpes; germination lente, mais sûre.

B R Pr

- » *alpina* (vrai). R *
 » *altaica.* |
 » *angulosa.* T R Sp
 » *angustifolia.* ± B R
 » *asclepiadea.* H ÷
 » à fleurs blanches.
 » *axillaris.* |
 » *bavarica.* T Sp *
 » *Bigelowi.* T Sp
 » *brachyphylla.* T S R
 » *bracteosa.* Sp

- Gentiana campestris.* Pr

- » *Clusii.* R ±
 » *crassicaule.* R
 » *cruciata.* Pr R
 » *dahurica.* R
 » *depressa.* R
 » *detonsa.* T
 » *excisa.* R
 » *Favrati.* *
 » *Fetisowii.* R
 » *Freyniana.* R * T
 » *frigida.* R * T
 » *Gentianella* (Hort. Angl.) R B
 » *germanica.* |
 » *glomerata.* R
 » *Grombezewskyi.* R
 » *hybrida* (straminea × Kesseln.). R
 » *imbricata.* T Sp
 » *Kesselringii.* R
 » à fl. blanches.
 » *Kochiana.* × R
 » *Lagodechiana.* T R
 » *lutea.* Br R Med
 » *macrophylla.* R
 » *mongolica.* R
 » *Moorcroftiana.* R
 » *nivalis.* | T
 » *Olivieri.* R
 » *pannonica.* T
 » *parryi.* R
 » *phlogifolia.* R
 » *Pneumonanthe.* T H
 » *punctata.* T R
 » *purpurea.* T R
 » *Rocheliana.* R
 » *Sceptrum.* T
 » *schistocalyx.* × R
 » *septemfida* (très belle et facile). HT R
 » *cordifolia.*
 » *latifolia.*
 » *straminea.* R
 » *tenella.* Pr T
 » *Tibetica.* R
 » *Tshiantanica.* R
 » *glomerata.*
 » *triflora.*
 » *uliginosa.* |
 » *utriculosa.* |
 » *verna.* R P T
 » à fl. blanches.
 » *grandiflora.*
 » *Walujewi.* R

- Geranium aconitifolium* (*rivulare*) R

- » *albiflorum.* R
 » *armænum.* V
 » *cinereum.* R
 » *Endresii.* R ÷
 » *grandiflorum.* R ÷
 » *Ibericum.* R
 » *macrorrhizum.* R O ÷

Geranium nodosum. H

- » phæum. **Pr R**
- » platypetalum. **R V**
- » platyanthum. **R**
- » pratense. **R Pr Mel**

Excellente plante pour rochers et plates-bandes, fleurissant tout l'été; germe de suite et produit la même année ses belles fleurs bleu violet foncé. ::

- » Richardsoni. **R**
- » sanguineum. **R** \neq
- » » à fl. blanches. **R**
- » sessiliflorum. **R**
- » sylvaticum. **R ::**
- » tuberosum. **R**

Gerardia tenuifolia. V +

Gerbera Jamesoni. \wedge +

Geum atrosanguineum. R H +

- » bulgaricum. **H**
- » chilense (à fl. rouge très vif).
- » coccineum (*idem*).
- » » grandiflorum. **H R +**
- » Florariense. Pl. basse, à fl. jaune brillant et sépales bruns (mai-novembre).
- » Heldreichii. **R**
- » intermedium. **H**
- » montanum. **R Pr**
- » Mrs Bradschaw. **R**
- » pyrenaicum. **R Pr**
- » reptans. **||| R**
- » Rheticum. **||| R**
- » rivale. **H**
- » » grandiflorum.
- » tyrolense. **|||**

Gilia coronopifolia. ||

Gillenia trifoliata. V H

L'une des meilleures et des plus florifères d'entre les plantes vivaces d'ornement; fl. blanc rosé, gracieusement suspendues sur tiges rouge brun. (mai-septembre).

- » stipulacea. **V H**

Gladiolus palustris. H

Glaucium luteum. V R \neq

- » rubrum. **V \neq**
- » tricolor. **V R \neq**
- » » grandiflorum.

Globularia cordifolia. **||| \neq \pm**

- » nana. **\pm ||| R**
- » nudicaulis. **R B**
- » trychosantha. **\pm R \neq**
- » vulgaris. **R**

Gnaphalium Leontopodium R

Goodenia (Selliera) repens. H

Grindelia robusta. +

Gutierrezia Euthamiae. R

Gymnolomia multiflora. R

Gypsophila alpicola. R |||

Gypsophila cerastioides. |||

- » libanotica. **R**
- » paniculata. **+ V \neq**
- » paniculata compacta.
- » repens. **\pm ||| R \neq**
- » » var. major.
- » Rokejeka. **R**
- » scorzoneræfolia. **V \neq**
- » transylvanica. **R**

Haberba Rhodopensis. ||| N

- » Ferdinand-Coburgi. **||| N**

Hacquetia Epipactis. O \neq (Dondia Ep.).

Happlocarpha Leichtlini. R

Hedysarum obscurum. R

Helenium autumnale. V Mel

- » Hoopesi. **V +**
- » pumilum magnificum. **V +**
- » Helianthella quinqueanervis. **V +**
- » uniflora. **V +**

Helianthemum alpestre (jaune).

- » amabile (carmin).
- » apenninum (blanc).
- » atrosanguineum.
- » aurora.
- » bicolor (jaune et rouge).
- » coccineum (rouge ardent).
- » cruentum (rouge vif).
- » cupreum (aciné).
- » Fumana (jaune).
- » grandiflorum (jaune). **Pr**
- » mutabile.
- » polyfolium (blanc).
- » procumbens (jaune).
- » rhodanthum (rougeâtre).
- » roseum (rose clair).
- » sulfureum (rouge).
- » vulgare (jaune). **Pr**

Ce sont des pl. à gracieux feuill. persistant, aux fl. nombreuses, se succédant presque toute l'année quand on a soin de couper les tiges après la fleur; culture très facile. Pl. naines et touffues, excell. pour les rochers et talus arides. Lèvent facilement et rapidement.

Helichrysanthemum anatolicum. R S

- » lanatum. **R S**
- » odoratum. **R S**
- » Stœkas. **R S**

Heliopsis lævis. V +

- » scabra. **V +**

Grandes pl. à fl. jaune vif, ornementales, solides et d'entre les meilleures pour la fleur coupée.

Heliotropium europæum (Héliotrope annuel à fl. blanches).

Heliopsis "Soleil d'or". V +

Helleborus colchicum. R O

- » corsicus. **O R**
- » foetidus. **R \neq**

Helleborus niger (Rose de Noël). **O**

» **orientalis**. **R O**

» **viridis**. **R O**

Heracleum giganteum. **V**

» **Mantegazzianum**

L'une des meilleures plantes mellifères; formes gigantesques; belle pl. à isoler ou à semer dans les lieux ombragés et humides. **V ÷ H O**

» **pyrenæum**. **V**

Herniaria glabra. **≡**

L'H. glabra est la meilleure pl. tapissante pour garnir les lieux secs et arides, en plein soleil, les sols maigres et stériles, qu'elle recouvre rapidement.

Hesperis matronalis (*Giroflée vivace*).

» var. **candidissima**. **V ≠**

Heuchera purpureascens. **O**

» **rubescens**. **O**

» **sanguinea**. **R +**

» **alba**.

» **grandiflora**.

» **maxima**.

» **rosea**.

» **splendens**.

» **Zabeli**. **+**

Hibiscus militaris. **V**

» **palustris**. **V**

» **roseus**. **V**

Hieracium albidum. **R |||**

» **aurantiacum**. **R :: ≠ Pr**

» **lanatum**. **R ||| S**

» **pilosella**. **≠**

» **rubrum**. **R**

» **stoloniflorum**. **R :: ≠ Pr**

» **villosum**. **R**

Hippocrepis comosa. **R**

Homogyne alpina. **O R**

Horminum pyrenaicum. **R O**

Houstonia coerulea. **T Sp**

» **alba**.

Hugueninia tanacetifolia. **O R**

Hutchinsia alpina. **||| N**

» **Anerswaldi**. **||| N**

» **brevicaulis**. **||| N**

Hylomecon vernalis. **O**

Hyoscyamus niger (*Jusquiame*) **Med**

Hypericum Androsæmum. **R**

» **aureum**. **†**

» **Balearicum**. **† ∆**

» **Coris**. **||| S R**

» **empetrifolium**. **R**

» **fragile**. **||| R**

» **Henrys**. **R**

» **Hookeri**. **R**

» **hyssopifolium**. **R**

» **Kalmianum**. **†**

» **Kotschyannum**. **||| R**

» **linarifolium**. **×**

Hypericum nummulariæfolium. **||| R**

» **Olympicum**. **R**

» **Orientale**. **R**

» **organifolium**. **||| R**

» **patulum**. **†**

» **perforatum** (*Millepertuis*). **P ≠ Med**

» **prolificum**. **†**

» **ptarmicæfolium**. **R**

» **repens**. **± B ||| ≠**

» **rhodopeum**. **R**

» **Richeri**. **R**

Hypochaeris Helvetica. **R Pr**

Hyssopus officinalis. **R Mel. Med. =**

» à fl. blanches.

» à fl. rouges.

Iberis gibraltarica. **R Mel**

» **Jordani**. **R**

» **jucunda**. **||| R**

» **saxatilis**. **||| R**

» **sempervirens**. **R ||| ≠**

» **sempervirens nana**.

» **Taurica**. **|||**

Impatiens glanduligera. **O ÷ H Mel**

» **noli tangere**. **O ÷ H**

Imperatoria angustifolia. **R O**

» **Ostruthium**. **R H O Med**

Incarvillea Delavayi.

(*Gloxinia vivace*). L'une des meilleures plantes vivaces d'ornements que nous ait fourni l'Asie; s'élève facilement de semis.

» **Olgæ**. **V R**

» **variabilis**. **I**

Inula ensifolia. **R ≠**

» **glandulosa**. **V + R**

» **grandiflora**.

» **Helenium** (aulnée). **Med**

Plante officinale stomachique de grande valeur, appréciée déjà des Romains; belle plante d'ornement.

» **hirta**.

» **macrocephala**. **V**

» **Royleana**. **R V +**

Ipomaea Pandurata. **f**

Iris caucasica. **R**

» **chrysographis**. **R**

» **Clarkei**. **R**

» **ensata**. **R**

» **Forresti**. **R**

» **fœtidissima**. **O ≠ R**

» **gigantea**. **R**

» **Guldenstædtiana**. **V**

» **iberica**. **R ***

» **imbricata**. **R ***

» **Junionana**. **R**

» **lævigata** (*Kämpferi*). **H V**

» **musulmanica**. **R**

» **orchioïdes**. **R**

» **paradoxa**. **R**

» **prismatica**. **R**

Iris pseudo-Acorus (Le lis hérauldique).

H Aq

- » pumila. R
- » pyrenaica (récolté à Gavarnie). R
- » sibirica. **H V R**
- » » alba.
- » sisyrinchium. R
- » stenogyna. V
- » stylosa. V
- » versicolor. R
- » virginica. R

Isatis alpina vera. R

Isopyrum thalictroides. O

Jasione humilis. R X

- » montana. R
- » perennis. R

Jeffersonia diphylla. O X

Juniperus nana. †

- » Sabina. † ± ≠

Kernera saxatilis (Cochlearia sax.). ||| R

Kniphofia (Tritoma).

- » caulescens (*Trit. en arbre*).
- » grandiflora.
- » hybrida.
- » Tuckii.

Lactuca perennis. R ≠

- » » alba.

Laserpitium gallicum. ≠ R

- » halleri. ≠ R
- » latifolium. ≠ R
- » siler. ≠ R

Lasiospermum lanatum. R

Lathyrus grandiflorus. V

- » heterophyllus. f
- » incurvus. R ::
- » latifolius.
- » » alba.
- » maritimus.
- » odoratus. f

(Pois de senteur) variétés anglaises en mélange.

- » pyrenaicus. R ::
- » sylvestris. f ::

Laurentia tenella. **H R T Sp**

Lavandula delphinensis.

- » officinalis. R ≠ B

Lavatera maritima. ^

Leontopodium alpinum (*Etoile du glacier, glacier star*).

Semer dans un sol léger et tenir plutôt sec ; repiquer jeune et cultiver au soleil et dans sol calcaire. Diviser tous les deux ans.

- » altaicum
- » Himalayense.
- » japonicum.
- » Lindavicum.
- » sibiricum.
- » transylvanicum.
- » tibeticum.

Levistichum officinale. V

Liatris scariosa. V

- » graminifolia. V
- » spicata. V

Ligularia sibirica. V R

Lilium croceum. V R

- » dalmaticum. O
- » Martagon (à semer sous bois). O ÷
- » » album.
- » pyrenaicum. O ≠

Linaria alpina. R ||| T

- » » alba.
- » » concolor.
- » » rosea.
- » cymbalaria. ||| O
- » » alba.
- » dalmatica. R
- » genistifolia. R
- » italica. R S
- » macedonica. R
- » organifolia. ||| R
- » pallida. ||| R
- » pilosa. |||
- » purpurea. R
- » striata. ≠
- » supina. R
- » triornitophora. ||| T R
- » » rosea. ||| T R
- » tristis. R

Lindelia spectabilis.

Linum alpinum. R

- » austriacum R
- » catharticum. |
- » collinum. R
- » extra axillare. R
- » flavum. R ||| ≠ +
- » grandiflorum (à fl. rouge violent). |
- » hirsutum. ||| R
- » narbonense. R +

Linum nervosum. R

- » perenne. (sibiricum) V R ≠
- » » à fl. blanches.
- » salsoloides. ||| R
- » tenuifolium. |||
- » Fræbeli. R
- » graminifolium. ||| R
- » intermedium. ||| R
- » latifolium. R
- » oleoides. |||
- » petræum (Echium).
- » » à fl. roses.
- » purpureo-cœrulum. O ≠ ::

Lloydia serotina. T R

Lobelia cardinalis (vrai). H

- » fulgens. V
- » Gerardiana. V
- » Gibberoa. ^
- » inflata. R
- » Kamtschatica. R
- » linnæoides. T ±

- Lobelia speciosa*. R
 „ *syphilitica*. H R
 „ „ *alba*.
 „ „ *rosea*.
 „ *tupa*. H
 „ *urens*. T R
Lonicera alpigena. † ≠ O
 „ *coerulea*. † O
 „ *nigra*. O
 „ *pyrenaica*. R |||
 „ *tibetica*. R
Lunaria rediviva. O ≠
Lupinus poliphyllus.
 „ „ *albus*.
 „ „ *excelsior*.
 „ „ *Moerheimii*.

Les Lupins vivaces sont excellents pour la décoration de plates-bandes et jardins. Très parfumées, très abondantes, leurs fl. sont l'un des ornements les plus recommandables pour l'amateur qui aime la Beauté. Culture très facile, surtout dans les sols pauvres en chaux.

- Luzula alba*. O ::
Lychnis alpina.
 „ „ *alba*.
 „ *chalconica*. V +
 „ „ *alba*.
 „ *Delevayi*. R V
 „ *flos cuculi*. H
 „ *flos Jovis*. R
 „ „ *alba*.
 „ *fulgens*. R V
 „ *Haageana*. R V
 „ *viscaria*. R Pr
 „ „ *alba*.
 „ „ *splendens*.
Lynosiris vulgaris. R +
Lysimachia atropurpurea. ||
 „ *acrodonia*. H
Lysimachia clethroides. H
 „ *dahurica*. H
 „ *dubia*. H
 „ *ephemerum*. H Aq
 „ *quadrifolia*. H V O ::
 „ *thyrsiflora*. H Aq
 „ *verticillata*. H V ::
 „ *violacea*. H
 „ *vulgaris*. Aq ::
Lythrum Salicaria. H Aq Mel
 „ *virgatum*. H Mel
Malva Alcea. || R Pr ≠
 „ *crispa*. Med
 „ *moschata*. || R Pr ≠
 „ „ *alba*.
 „ *sylvestris*. Med
Malvastrum capense. ^
Mandragora officinalis. R S Med
Margyricarpus setosus. R ± †

- Marrubium sericeum*. + R
 „ *spinulosum*. + R
Matthiola fenestralis. √ R
 „ *incana*. variétés giroflée).
 „ *pedemontana*. :: ||| ≠
 „ *sinuata*. R
 „ *tristis*. :: ||| R ≠
 „ *valesiaca*. :: ||| R ≠
Mayanthemum bifolium.
 „ *canadense*.
Mazus rugosus. H T ::
Moconopsis cambrica. O
 „ „ *aurantiaca*.
 „ „ *fl. pl.*
 „ *nepalensis*. O X
 „ *petiolata*. O ::
 „ *Prattii*. O X
 „ *rudis*. O X
 „ *sinuata latifolia*. O X
Melandrium rubrum. Pr
Melica altissima. O ::
Melilotus albus.
 „ *officinalis*
 Pl. médicinales et surtout mellifères de grande valeur.
Melissa officinalis (Melisse). Med et Mel
Melittis Melysophyllum. R O
Mentha Pulegium. Med
 „ *Piperita*. Med
Menyanthes trifoliata (Trèfle d'eau).
Mertensia ciliata. R 1/2 O
 „ *oblongifolia*. R 1/2 O
 „ *paniculata (sibirica)*. R 1/2 O
 „ *primuloides*. ± 1/2 O
Meum athamanticum. X :: Pr Med
 „ *Muttellinum*. R |||
Michauxia campanuloides. ||
Micromeria rupestris. R ||
 „ *piperella*. |||
Mimulus cardinalis. H
 „ *luteus*. H ::
 Excellente pl. à naturaliser sur le bord des eaux et dans les lieux humides; fleurit tout l'été.
 „ *var. Monarque*.
 „ *moschatus*.
 „ *primuloides*. H Sp
 „ *ringens*. H
Mœhringia muscosa. |||
 „ *papulosa*. |||
 „ *pendula*. ||| N
 „ *polygonoides*. |||
 „ *sedoides*. |||
Molospermum cicutarium. R
Monarda didyma. V +
 „ „ *alba*.
 „ *fistulosa* (thé d'Oswego). V Mel
 „ *florariensis*. V +
 „ *Kalmiana*. V Mel
 „ *purpurea*. V +

Monarda superba. V
Morine longifolia. R
Mulgedium alpinum. O Mel
 » *Bourgæi*. O Mel
 » *plumieri*. O Mel
Myosotis alpestris. R
 » *cæspitosa*.
 » *lithospermifolia* R
 » *palustris*. H
 » *albus*.
 » *var. semperflorens*. H ::
Myrrhis odorata. O Pr
Narcissus poeticus (le Narcisse de Montreux). Pr
Nardus stricta. R ≠
Nepeta lanceolata. R
 » *macrantha*. N
 » *missini*. Mel R B
 » *nuda*. R B ≠
Nigella damascana (L'amour en cage).
Nigritella angustifolia. T *
Nuphar luteum. Aq
Nymphaea alba. Aq
Oenothera acaulis. R
 » *biennis grandiflora*. ||
 » *Fraseri*. V R
 » *macrocarpa* (*C. Missouriensis*).
 R V B ≠
 » *pumila*. R
 » *rosea mexicana*. R
 » *serrulata*. R
 » *speciosa*. R V ::
Omphalodes cappadocica. 1/2 O
 » *linifolia*. |
 » *Lucilæe*. ||| N
 » *nitida*. 1/2 O
Ononis cenisia. ± R |||
 » *fruticosa*. † R
 » *natrix*. R ≠
 » *rotundifolia*. R ±
Onopordon bracteatum. ||
Onosma alto-rosea. R
 » *Bourgæi*. ||| R ≠
 » *Cassium*. ||| R ≠
 » *echioides*. ||| R
 » *Helveticum*. ||| R ≠
 » *sericea*. ||| R ≠
 » *stellatum*. ||| R ≠
Ophiopogon japonicum. O
Opuntia albospina.¹
 » *arkansana*.
 » *Camanchica*.
 » *cantabrigensis* (à formes gigantesques).

Opuntia cymochyla.
 » *fulgens*.
 » *gigantea*.
 » *greenii*.
 » *longispina*.
 » *macrorhiza*.
 » *mesacantha*.
 » *missouriensis*.
 » *ophiocarpa*.
 » *orbicularis*.
 » *Raffinesquiana*.
 » *rubra* (rouge vif).
 » *Salmonæa* (fl. rouge saumon).
 » *sphaeracantha*.
 » *vulgaris*.
 » *Xanthostemma rosea*.
Origanum pulchrum. ||| R
Orobus niger. R O ::
 » *variegatus*. R
 » *verpus*. O ::
Ostrowskya magnifica. R V
Othonopsis cheirifolia. R S
Oxalis acetosella. O :: ::
 » *rosea*.
 » *atrosanguinea*. R ≠
 Pl. naine et tapissante. au feuill.
 brun foncé, propre à semer dans
 les lieux arides.
 » *floribunda alba*. R
 » *rosea*. R
Oxyria digyna. ||| N
Oxytropis Baikalensis. R S
 » *campestris*. R S
 » *foetida*. R |||
 » *Halleri*. R S
 » *Laponica*. R S
 » *montana*. R |||
 » *ochroleuca*. R S
 » *pilosa*. R
 » *sulfurea*. R S
Pæonia albiflora.
 » *anomala*.
 » *coralina*.
 » *decora* (Romanica).
 » *lutea*. Pivoine arborescente, à fleur
 jaune vif; facile à cultiver.
 » *Mlokosievitchii*.
 » *officinalis*.
 » *peregrina*.
 » *Russi*.
 » *tenuifolia*.
 » *triternata*.
 » *Veitchi*.
Papaver alpinum. ||| R ≠

¹ Ces *Opuntia* sont de : Cactées dont les graines lèvent facilement et qui sont rustiques à nos hivers. Il suffit, dans les pays du Nord, de tenir les plantes au sec (recouvertes de planches inclinées) pendant la mauvaise saison. Elles fleurissent abondamment l'été si l'on a soin de les planter au grand soleil. En Allemagne, on en cultive de grandes collections, sans même les recouvrir de planches. L'O. *cantabrigensis* atteint chez nous, au pied d'un mur abrité, 1^m de haut et une superbe envergure.

Papaver. En teintes séparées ou mél. dans les var. rouge vif, écarlate, rose, blanc pur, jaune soufre, orangé, etc. — A semer dans un sol aride et caillouteux ou en murailles; à naturaliser dans les jardins de montagnes, surtout calcaires.

- » *alpinum laciniatum.* ≡
- » *atlanticum.* O ≠
- » *bracteatum (invol^ucratum).* V
- » *Burseri.* |||
- » *Kernerii.* |||
- » *maximum.* V
- » *nudicaule.* ||| R ≠
- » » à fl. blanches
- » » » jaune vif.
- » » » rouge cramoisi.
- » » Toutes teintes mélangées.

Le papaver nudicaule est l'une des plus florifères et des plus précieuses d'entre les plantes alpines ou vivaces. Il aime la fraîcheur et la mi-ombre et constitue l'un des meilleurs ornements des rochers. Fleurit tout l'été et jusqu'en hiver, très facile à cultiver; bon pour la fleur coupée. En sol rocailleux, pa-veleux et maigre il fait merveille.

- » orientale. V R. ≠

Le pavot d'Orient est la plus éclatante de nos fleurs de pl. terre. Sa grosse corolle d'un rouge ardent fait un effet grandiose dans les jardins. Culture facile.

- » *pyrenaicum.* |||
- » *radicatum.* R
- » *Rhaeticum.* R |||
- » *somniferum.* Le pavot à opium à gr. fl. blanc pur. **Med Mel**

Paradisias Liliago. Pr R

- » *Liliastrum.* Lis de Saint-Bruno. Pr R
- » » major.

Paris quadrifolia. O ÷÷

Parnassia alpina. T

- » *asarifolia.* T
- » *mysorensis.* T R
- » *palustris.* T H

Paronychia sespyllifolia. |||

Parochetos communis. ^

Parrya Menziesii. R

- » *microcarpa.* R

Patrinia heterophylla. R

- » *rupestris.* R V

Pedicularis atrobens. T

- » *foliosa.* T
- » *tuberosa.* T
- » *verticillata.* T

Peganum Harmala. R ≠

Peltaria alliacea. :: ≠

Pentstemon acuminatus. R

Pentstemon albus. R

- » *arizonicus.* R
- » *Bradbury gem.*
- » *cæruleus.* V R +
- » *carinatus.* R
- » *diffusus.* R
- » *digitalis.* V R + **Mel**
- » *glaber roseus.* R
- » *glaucus.* R
- » *Gordoni splendens.* R
- » *gracile.* R
- » *heterophyllus.* R +
- » *humilis.* ||| **R B**
- » *hybridus hortensis* (les meilleures variétés des jardins; excellentes plantes de décoration, fleurissant jusqu'en décembre).
- » *laevigatus.*
- » *linarioides.* ||| **R B f**
- » *Murrayanus grandiflorus.* R
- » *ovatus.* V
- » *pubescens.* V + R
- » *purpureus.* V
- » *pygmæus.* R
- » *Richardsoni.* R
- » *rubricaulis.* R
- » *scouleri.* R
- » *unilateralis.* V R + D'un bleu superbe.
- » *venustus.* R

Les Pentstemons sont les Digitales de l'Amérique du Nord; ce sont de bonnes plantes vivaces de plates-bandes ou de rochers qui fleurissent longtemps et sont très ornementales. On ne saurait trop en vanter la rusticité et la longue floraison; leurs fleurs sont d'entre les meilleures pour les bouquets. Il en est dont les teintes bleu d'azur rappellent les gentianes des Alpes. Faciles à élever de semis.

Pericome caudata. V R

Petalostemon candidus. R

- » *tenuifolius.* R

Petasites albus. ÷÷

- » *niveus.* ÷÷

Phaca alpina. † R

Phlomis alpina. V R

- » *chrysophylla.* V R
- » *fruticosa.* R
- » *Lychnitis.* R
- » *Samia.* V R +

Phlox decussata, les meilleures variétés des jardins en mélange. V +

- » *Douglasi.* R

Phygелиs capensis. **Mel**

Physalis alkalengi (Alkékenge). :: ≠

- » *Franchetti.* R ::

Physoclaina orientalis. R O

Physostegia virginiana. V +

» » alba.

Phyteuma canescens. R

» carestiae. R

Phyteuma hemisphaericum. |||

» orbiculare. Pr. R

» pauciflorum. |||

» Scheuchzeri. |||

» spicatum. O ÷

Pinguicula alpina. T

» grandiflora. T

» Reuteri. T

» vulgaris. T

Pinus Cembro (Arolle).

Plantago argenta. R ≠

Platycodon autumnale. V + R

» grandiflorum. V + R Pr

» » album.

» Mariesi. R V

» » à fl. blanches.

» » grandiflora.

Ce sont les superbes campanules japonaises aux grandes fleurs fraîchement découpées et vivement colorées en bleu intense, blanc, opale ou azur. Très rustiques, très florifères (juillet-octobre), ce sont des plantes de grand effet et de premier ordre pour la décoration des plates-bandes et rochers (Mellifères). Faciles à élever de graines.

Podophyllum Emodi O

Polemonium coeruleum. R V Pr H Mel

» » album.

» Berninae.

» carneum (belles fl. roses).

» filicinum. R

» pauciflorum. R

» reptans. R ±

» Richardsoni. R

Les Polémoines sont d'admirables plantes vivaces, formant de jolies touffes d'une verdure fine et gaie, et portant de beaux panicules de fl. bleues, blanches ou jaunes odorantes.

Polygala chamæbuxus. O ± ÷

» Varedæ. ± 1/2 O

Polygonatum multiflorum. ÷ Med

» verticillatum. O R ÷

Polygonum Auberti. f

» Baldschuanicum. f

» Bistorta. H Pr Med

» capitatum. R

» Emodi. ± R ≠

» Sieboldi. V

» sphaerostachum. T

» vacciniifolium. H R

» viviparum. T

Potentilla alchemilloides. R ±

Potentilla alpestris. R ±

» argentea. R ≠

» atrosanguinea. V R + à fl. rouge vif.

» aurea. ||| R ±

» bifurca. ±

» caulescens. |||

» crinita. R

» Engadinensis. R ±

» Fenzlii. ± |||

» fragiformis. R

» frigida. ||| *

» fruticosa. † R

» fulgens. X R

» glandulosa. R

» gracilis. R

» grandiflora. R

» Hippiana. R ±

» Hookeriana. R

» Hortensis (var. hort. melang.).

» montenegrina. R

» mooniana. R

» multifida. R

» Nepalensis. +

Superbe espèce à fleurs rose tendre veinées de carmin (de Juin en Déc.).

» nitida. || ±

» nivalis. ±

» ochroleuca. R

» pedemontana. R

» peduncularis. ± R

» petiolulata. |||

» pyrenaica. R

» recta. R ≠

» rupestris. R ≠

» » var. grandiflora.

» Salesowiana. R H Med

» sanguisorbæfolia. R

» sibbaldi. ±

» speciosa. ± R

» sulfurea. R ≠

» tanacetifolia. R

» taurica. R

» Tormentilla. R H

» Transcaspiensis. R

» tridentata. R

» valderia. R

» virgata. R

» Visiani.

» Wrangeliana. R

Pratia angulata. T R

Prenanthes purpurea. O ÷

Primula acaulis. O ÷ Pr

» » var. à fl. bleues. R

» Arctotis. |||

Primula Asthore. R T

» Auricula (type alpin). R |||

» Auricula var. horticoles.

» Aylin (Lyssadell). T R

» auriculata. T 1/2 O

Primula Balbisii. |||

- » *Beesiana*. **R T**
- » *bella*. |||
- » *Bellunensis*. |||
- » *Berninæ*. |||
- » *biflora*. |||
- » *Bullesii*. |||
- » *Bullyana*. **R T**
- » *calycina* (*glaucescens*). ||| **N**
- » *capitata*.
- » *capitellata*. **T**
- » *cashmiriana*. **R** $\frac{1}{2}$ **O**
- » *alba*.
- » *grandiflora*.
- » *hybrida*.

Cockburniana. **R**

cortusoides. **O**

Cottiae. **R N**

darialica. **R T**

decipiens. |||

denticulata. **R**

» *alba*.

» *grandiflora*

dentiflora (Andrews). **T**

discolor. |||

elatio. **Pr** $\frac{1}{2}$ **O**

» *grandiflora*. $\frac{1}{2}$ **O**

» *Theodora* (Hybride spontané, entre les **Pr elatio** et *Juliae*, qui a surgi en 1915 dans notre alpinum).

farinosa. **H R T**

» *grandiflora*.

» *groenlandica*.

Flørkeana. ||| **N**

Florariensis.

Espèce géante, hybride probable entre les **Pr. Beesiana** et « *Unique* ». Elle atteint 90 cent. de haut., a des tiges portant jusqu'à 10 étages de fleurs rose carné vif avec un œil jaune d'or au centre. Une seule pl. a fourni 14 tiges fl. l'été passé, dans un sol frais. **T R**

Forbesi. \wedge \times

frondosa. **H**

goldlaced (Hort.) **R**

grandis. **H**

hirsuta (très belle espèce à fl. carmin). ||| **N R**

integrifolia. **R N**

intricata.

involutrata. **R H**

japonica. **R** $\frac{1}{2}$ **O**

» *alba*.

» *atrosanguinea*.

» *lilacina*.

» *purpurea*.

» *splendens*.

Juliae. **R N** \times

kewensis. \wedge

Primula latifolia (*graveolens*). ||| **N**

» *leucophylla*. **R**

Primula longiflora. **T R**

» *luteola*. **O** \times

» *Lyssadell hybrid*. **H R**

» *macroralyx*. **R**

» *magellanica*. **T R**

» *malacoides*. \wedge

» *alba*.

» *marginata*. ||| **N B**

» *mollis*. **R**

» *Munroi*. **T**

» *Murettiana*. ||| **N**

» *muscaroides*. **T**

» *oenensis*. ||| **N**

» *officinalis*. **Pr**

» *variétés*.

» *Pallasi*. **R**

» *patens* (type sauvage du Sieboldi). **O**

» *pedemontana*. ||| **N**

» *Poissoni*. **H**

» *prænsens*. \wedge

» *pulverulenta*. **H**

» *purpurea*. \times **T**

» *reticulata*. \times $\frac{1}{2}$ **O**

» *Rhætica*. ||| **N**

» *rosea*. **H**

» *grandiflora*.

» *saxatilis* (cort. var. *chinensis*). $\frac{1}{2}$ **O**

» *scottica*. **T**

» *sibirica chinensis*. **R T**

» *Sibthorpi*. **B R**

» *Sieboldi* (var. *Hortic.*). \times

» *Sikkimensis*. **H** $\frac{1}{2}$ **O**

» *suaveolens*. **R**

» *Theodora*. **R**

» *uralensis*. **R**

» *variabilis*, var. anglaises en mélange.

» *Veitchi*. \times \wedge

» *venusta*. |||

» *veris* (mélange des meilleures variétés

anglaises). **Pr R B** \div

» *var. à fl. bleues*.

» *verticillata*. \wedge

» *viscosa*. ||| **N**

» *alba*.

» *Wilsoni*. **T**

Prunella grandiflora. \pm **B Pr**

» *purpurea*. \pm **B Pr**

» *incisa rubra*. Carmin très intense ;

floraison prolongée ; pl. excell.

pour tapisser le sol. **B Pr R**

Pteroccephalus (Scabiosa) Parnassi. \pm

Putoria calabrica. **R S**

Pycnanthemum lanceolatum. **R**

Pyrethrum atrosanguineum. **V**

» *hybridum*. **V** $+$

Les *Pyrethrums* hybrides (fl. roses, rouges, grenat, carmin, blanches,

etc.) sont les meilleures d'entre les fl. à bouquets (juillet-oct.).

- » *macrophyllum*. R $\div \neq$
- » *roseum*. V +
- » *Tschihat-cheffi*. B

Ramondia pyrenaica. ||| N

- » *serbica*. ||| N

Ranunculus aconitifolius. H $\frac{1}{2}$ O

- » *alpestris*. ||| N
- » *anemonoides*. R
- » *bilobus*. ||| N
- » *creticus*.
- » *glacialis*. T R
- » *graminæus*. R S

Ranunculus Illyricus. R

- » *millæfoliatus*. R
- » *monspessulanus*. R
- » *montanus*. Pr R
- » *parnassifolius*. R S
- » *pyrenæus*. Pr R
- » *rutæfolius*. R
- » *Seguieri*. R |||
- » *Thora*. Pr R

Rehmania angulata. Δ

Reseda glauca. R

- » *sufruticosa*.

Rheum Emodi. V

- » *palmatum*. V

Rhodiola linifolia. |||

- » *rosea* (*Sedum Rhodolia*). |||
- » *rubra*. |||

Rhododendron chamæcistus. |||

- » *ferrugineum* (*La Rose des Alpes*). |||
- » *album*.
- » *hirsutum*. O
- » *Kantschaticum*. \times

Rodgersia mæsculifolia. H

- » *podophylla*. H

Rodhea japonica. O

Romanzoffia Sitchensis. T H

Romneya Coulteri. V S

- » *hybrida*. V S
- » *trychocalyx*. V S

Rosa alpina.

- » *pimpinellifolia*.

Rosmarinus officinalis. R S

Rubus laciniatus. f

- » *saxatilis*. R
- » *xanthocarpus*. \neq R

Rudbeckia bicolor. V +

- » *fulgida*. V +
- » *hirta*. V +
- » *laciniata*. V +
- » *nitida*. V +
- » *occidentalis*. V +
- » *purpurea*. V +
- » *grandiflora*. V +
- » *pinnata*. V +
- » *var. Soleil d'or*.
- » *speciosa*.

Les Roubecques sont d'entre les meilleures et les plus précieuses des pl. vivaces; leurs fleurs, très apparentes, en capitules jaune et noir chez la plupart, rouge sombre ou carmin chez *intermedia*, *purpurea*, durent longtemps et sont excellentes pour la fleur coupée. Culture des plus facile.

Ruellia ciliosa. R

Rumex alpinus (Remède contre le cancer).

- » *flexuosus* (feuillage brun foncé). R

Ruta graveolens. R \neq

- » *montana*. Δ
- » *patavina*. :: R \neq

Sagina subulata. R

- » *Linnæi*.

Salix reticulata. R \pm

- » *retusa*. R \pm

Salvia azurea grandiflora. V

- » *bicolor*. Δ
- » *bracteata*. R
- » *candelabrum*. R
- » *cypria*. R \pm
- » *glutinosa*. R \div
- » *Horminum* | \neq Med
- » *officinalis*. \pm R \neq Mel Med
- » *à fl. blanches*.
- » *à fl. rouges*.
- » *major*.
- » *pratensis*. Pr R Mel
- » *ringens*. R Mel
- » *scabiosæfolia*. \pm R Mel
- » *Scalaria*. \neq Mel Med

Samolus Valerandi. H T

Sanguinaria canadensis. O

Sanguisorba canadensis. H

- » *Vallistellinæ*. H

Sanicula Marylandica. O \div

Saponaria bellidifolia. R

- » *Boissieri*. |||
- » *cæspitosa*. ||| R
- » *cypria*. ||| R
- » *glutinosa*. | \neq
- » *lutea*. ||| R
- » *ocymoides*. \pm ||| R Pr \neq
- » *var. alba*.
- » *rosea*.
- » *splendens*.
- » *officinalis*. :: \neq Med
- » *à fl. doubles*.
- » *pulvinaris*. |||

Sarcocapnos speciosa. |||

Sarothamnus scoparius. \times \dagger

Sarracenia purpurea. T

Satureya intermedia. R

- » *diffusa*. Mel R B
- » *Hortensis* (*Sariette*). Mel R
- » *montana*. ||| R \neq Mel

Saussurea alpina. R |||

Saussurea chinensis. R

» *discolor*. R |||

Saxifraga aconitifolia. N¹

» *adscendens*. R

» *ægyplos*. R

» *æmula*. R

» *affinis*. R

» *aizoides*. H ||| R

» *Aizoon*. ||| R

» *ajugæfolia*. ± ¹/₂ O

» *Alberti*. |||

» *Allionii*. ± B

» *altissima*. ||| R

» *ambigua*. ||| R

» *anceps*.

» *androsacea*. H

» *aphylla*. ||| N *

» *apiculata*. |||

» » *micrantha*. |||

» *aquatica*. T

» *aretioides*. |||

» *aspera*. |||

» *atropurpurea*. R ±

» *augustana*. ||| N

» *australis*. ||| R

» *Balcana*. ||| R

» *Bartoloni*. |||

» *biflora*. ||| N

» *blepharophylla*. ||| N

» *Borissi*. |||

» *Boryi*. |||

» » *major*. |||

» *Boydei*. |||

» *brevifolia*. ||| R

» *bronchialis*. R

» *Brunoniana*. × ±

» *bryoides*. |||

» *Burseriana*. |||

» » *gloria*.

» » *major*.

» *cæsia*. |||

» *cæspitosa*. ± R B

» » *var. rosea*. R B

» *canaliculata*. ± R |||

» *cantabrica*. B ¹/₂ O

» *capitata*. R

» *carinthiaca*. |||

» *carniolica*. |||

» *carpathica*. R T

» *cartilaginea*. ||| R

» *catalaunica*. ||| R

» *cernua*. T

» *cervicornis*. |||

» *Cherrytree*. R

» *Clusii*. T

» *cochlearis*. ||| S R

» *Colvillei*. R

Saxifraga coniferæ. |||

» *coriophylla*. |||

» *Cotyledon*. |||

» » *hybrida*.

» *crustata*. ||| R

» » *major*.

» *cuneata*. |||

» *cuneifolia*. O ×

» *cymbalaria*. O

» *cymosa*. |||

» *dalmatica*. ||| R

» *decipiens*. B

» » *var. grandiflora hybrida*.

» *Delavayi*. R.

» *Delphii*. |||

» *dentata*. R

» *diapensioides*. ||| *

» *diversifolia*. T H

» *elatior*. ||| R

» *Elisabethæ*. |||

» *Escheri*. R

» *exarata*. ± B R

» *Facchini*. |||

» *Ferdinand-Coburgi*. |||

» *flagellaris*. ± T R

» *flavescens*. ||| R

» *florulenta*. ||| N

» *Forbesi*. R

» *Fortunei*. R ∧

» *Friedrich-Augusti*. |||

» *Gaudini*. ||| R

» *gemmifera*. R

» *Geum*. B R ¹/₂ O

» *Gibraltarica*. ± |||

» *globulifera*. ||| R

» *granulata*. T R

» *Grisebachii*. |||

» *Guilford seedling*. ± R

» *Haagii*. |||

» *Hausmanni*. ||| *

» *hederacea*. ||| *

» *Hedærantha*. |||

» *heucherifolia*. R N

» *Hieracifolia*. H

» *Hirculus*. H T

» *Hostei*. |||

» *Hueti*. |||

» *hypnoides*. ± B

» *intricata*. R

» *iratiana*. R

» *irrigua*. R |||

» *Islandica*. R

» *juniperina*. |||

» *Kolenatiana*. ||| R

» *Kotschy*. |||

» *Kinleyi*. |||

» *Kyrillii*. |||

¹ D'après la Monographie d'Engler.

Saxifraga Labradorica. R

- » *laevis.* ||| N
- » *Lantoskana.* ||| R
- » *lasiophylla.* R O
- » *latina.* ||| N
- » *lingulata* (vrai). ||| R
- » *longifolia.* ||| R
- » *Ludoviciana.* |||
- » *luteo-purpurea.* |||
- » *luteo-iridis.* |||
- » *macedonica.* |||
- » *Mac Nabiana.* ||| R
- » *mædia* (*calyciflora*). |||
- » *marginata.* ||| R
- » *micranthidifolia.* R H
- » *moschata.* ± R
- » *murithii.* ||| N
- » *muscoïdes.* ± R
- » *mutata.* R ||| H
- » *nervosa.* R
- » *nivalis.* R N
- » *Obristii.* |||
- » *ochroleuca.* |||
- » *oppositifolia.* ||| N R
- » » *alba.*
- » » *pyrenaica.*
- » *Paulinæ.* |||
- » *pectinata.* ||| R
- » *pedatifida.* R
- » *pedemontana.* ||| N
- » *peltata.* H
- » *pennsylvanica.* H
- » *Petraschii* |||
- » *petræa.* | |||
- » *planifolia.* |||
- » *porophylla.* |||
- » *Portæ.* |||
- » *primuloides.* O R
- » *Probyni.* |||
- » *Prostii.* ± R
- » *pseudo-sancta.* |||
- » *pubescens.* R O
- » *pulchella.* R
- » *pungens.* |||
- » *retusa.* ||| N
- » *Reyheri.* R
- » *Rhei superba.* R
- » *robusta.* |||
- » *Rocheliana.* |||
- » » *var. purpurea.* |||
- » *Rossii.* |||
- » *rosularis.* |||
- » *rotundifolia.* O
- » *Salomoni.* |||
- » *sancta.* |||
- » *sarmentosa.* R
- » » *tricolor.*
- » *scardica.* |||
- » » *var. obtusa.*
- » *Seguieri.* ||| N

Saxifraga sempervivoides. |||

- » *splendens.* |||
- » *spontemica.* R
- » *squarrosa.* |||
- » *stabiana.* |||
- » *stellaris.* H T
- » *stenoglossa.* |||
- » *stenopetala.* R
- » *Sternbergi.* R
- » *Sturmiana.* |||
- » *supra aizoides.* T
- » *Taygetaya.* ||| R
- » *Tellimoides.* H 1/2 O
- » *tenella.* ± R
- » *Thessalica.* |||
- » *Tombeanensis.* |||
- » *trifurcata.* B 1/2 O
- » *umbrosa.* O ± B
- » *Valdensis.* ||| *
- » *varians.* R
- » *villosa.* R
- » *Vochinensis.* |||
- » *Wildeana.* R
- » *Zelevori.* ||| R
- » *Zimeterii.* |||

Scabiosa caucasica. R V +

- » » *alba grandiflora.*
- » *cretica.* R
- » *graminifolia.*
- » *Lagodechiana.*
- » *lyratifolia* (fl. grenat vif). R
- » *ochroleuca.* R (fl. jaune paille).
- » *Olgaë.* R
- » *petræa.* R

Schivierackia podolica. R

Scilla nutans. O ÷

Scrophularia Hoppii. R ≠ (Juratense).

- » *trifoliata.* Très belles fleurs rouge brique vif.

Scutellaria alpina. ± R

- » » *à fl. blanches.*
- » *altissima.* R ≠
- » *Baikalensis.* R (Macrantha).
- » *lupulina.* R
- » *orientale.* R

Sedum acre. ||| ≠

- » *aizoon.* R
- » *album.* ≠
- » *alpestre* (repens). R
- » *altissimum.* R ≠
- » *anglicum.* |||
- » *annuum.*
- » *anopetalum.* R
- » *asiaticum.*
- » *atratum.* |
- » *brevifolium.* |||
- » *Cepæa.* |
- » *cœruleum.* |
- » *corsicum.* ||| R
- » *crenatum.* R

- Sedum dasiphyllum.** ||| R
 » **divergens.** |||
 » **gemmi ferum.** R
 » **hirsutum.** |||
 » **Hispanicum.** |
 » **kamtschaticum.** R ≠
 » **Laggeri.** R
 » **Lydium.** R
 » **majelense.** |||
 » **maximowiczii.** R ≠
 » **maximum.** R ≠
 » **Middendorffianum.** R
 » **obtusifolium.** R
 » **oppositifolium.** R B R ≠
 » **pilosum.** ||
 » **populifolium.** R
 » **purpurescens.** R ≠
 » **reflexum (rupestre).** R ≠
 » **Selskianum.** R ≠
 » **Sempervivum (Cotyled Semp.).** R |||
 » **spectabile.** R V B
 » **splendens.**
 » **spurium.** R B ≠
 » **stoloniferum.** R
 » **villosum.** H

Sempervivum arachnoideum.

- » **atroviolaceum.**
 » **bungeanum.**
 » **calcareum.**
 » **debile.**
 » **Juratense.**
 » **Kapaornikense.**
 » **mettenianum.**
 » **montanum.**
 » **ornatum.**
 » **patens.**
 » **pyrenaicum.**
 » **Requienii.**
 » **robustum.**
 » **spinulifolium.**
 » **tectorum.**
 » **tenellum.**
 » **Thomayeri.**
 » **tomentosum.**
 » **triste.**
 » **Valesiacum.**
 » **Wulfeni.**
 » **mélange de plusieurs espèces.**

Senecio abrotanifolius. R

- » **adonidifolius.** R
 » **aurantiacus (Cineraria aurant.).** R
 » **carniolicus.** R |||
 » **clivorum.** R V
 » **cordatus.** R O
 » **coriaceus.** R
 » **doronicum (soleil des Alpes).** R
 » **Doria.** V
 » **Fuchsii.** O ÷÷
 » **incanus.** ||| R T
 » **Jacobæus.** R H

Senecio jacquinianus. O ÷÷

- » **leucophyllus.** * |||
 » **macrophyllus (pl. géante).** V
 » **othonæ.** R
 » **palmatifidus.** R
 » **quinquæligulatus.** R
 » **sarracenicus.** O ÷÷
 » **sulfureus.** R
 » **Tanguticus.** ::
 » **Tyroliensis.** R

Serratula nudicaulis. R

Seseli cæspitosa. ±

- » **gummifer.** Pl. à fl. bleuâtre. R ≠

Sibbaldia procumbens. X R

Sideritis Eubæa. R

- » **hissopifolia.** R ≠
 » **taurica.** R Mel

Silene acaulis. ||| R ±

- » **alba.**
 » **grandiflora.**
 » **alpestris.** ± R
 » **alpina.** ||| ≠
 » **armeria.** |
 » **asterias.** ||
 » **asterias grandiflora.**
 » **bryoides.** ± |||
 » **Campanula.** |||
 » **ciliata.** R
 » **compacta.** |||
 » **cordifolia.** |||
 » **Correvoniana.** R |||
 » **exscapa.** ||| ±
 » **fimbriata.** R
 » **Legionensis.** ||| R
 » **Lerchenfeldiana.** R
 » **maritima.** ||| R
 » **monachorum.** ||| N
 » **odontopetala.** R
 » **oreades.** R
 » **otites.** ≠
 » **pudibunda.** ||| R N
 » **pumilio.** |||
 » **pusilla.** ||| N
 » **quadrifida.** ||| N
 » **reichenbachiana.** R
 » **rupestris.** ||| R X
 » **saxifraga.** R ≠
 » **Schafta.** R ||| B ≠

L'une des rares plantes saxatiles d'automne ; fl. d'un carmin vif, culture facile.

- » **valesia.** ≠

- » **Zawadsky.** R ||| ≠

Silphium terebinthinaceum. V

Sissimbrium strictissimum.

A naturaliser dans lieux arides.

Sissirinchium anceps. ≠

Smilacina racemosa. O X

- » **stellata.** O X

Sobolewsia clavata. R

Soldanella alpina. R T

» *montana*. R T

» *pusilla*. R T

» *pyrolæfolia*. R T

Solidago alpestris. R

» *arctica*. R

» *canadensis*. V

» *humili-*. R

Solidago puberula. V

» *pygmæa*. R

» *reflexa*. Mel V

» *Riddeli*. V

» *rigida*. Mel

» *rigidiscula*. Mel

» *Shortii*. V + Mel

» *spectabilis*. V +

Spartium junceum. Le beau genêt d'or du Midi. Mel

Spiræa Aruncus (Reine des Bois). O ÷÷

» *cæspitosa*. ||| R

» *filipendula*. H

» *Kamtschatica*. H

» *palmata*. H

» *Ulmæa*. Med H

Stachys corsica. R T

» *glutinosa*. R

» *lanata*. B ≠ Mel

Statice latifolia. V R

» *Suworowi*. |

Statice des Canaries.

» *arborescens* (Statice en arbre).

» *brassicæformis*.

» *hybrida*.

» *imbricata*.

» *microphylla*.

» *macroptera*.

» *Perezii*.

» *Perezii* × *imbricata*.

» *puberula*.

Ces superbes plantes s'élèvent très facilement de graines. Non rustiques chez nous elles constituent une précieuse décoration pour serres froides et appartements. Elles donnent, toute l'année, de grandes panicules de fleurs bleues et blanches.

Stipa gigantea. R

» *pennata*. R ≠

Stobæa membranifolia. V

» *radula*. V

Streptopus amplexifolius. O ×

Stylophorum diphyllum. O ÷÷

» *japonicum*. O

» *lasiocarpum*. O

Swertia longifolia. T

» *perennis*. T

Symphandra armena. ||| R

» *Hoffmanni*. ||| R

Tamus communis. f O Med

Tanacetum vulgare. Mel Med

Telekia speciosa. V + Mel

» *speciosissima* (vrai). ||| N

Telephium imperati. ||| S

» *orientale*. :: S

Teucrium Chamædrys. B R ≠ Med Mel

» *flavum*. R ∧

» *lucidum*. R |||

» *marum*. ||| ∧

» *montanum*. ||| R

» *multiflorum*. R

» *orientale*, à fl. très élégantes. R ≠

» *polium*. R B ≠

» *pseudo-Chamædrys*. R

» *pyrenaicum*. B R

» *Scorodonia*. ÷÷ Med

Thalictrum aquilegifolium. R O ÷÷ ≠

» *atropurpureum*.

» *Chelidonii*. R

» *Delavayi*. V R +

» *diptercarpum*. V R +

» *Fendleri*. R

» *glaucum*. H R V

» *majus*. R ≠

» *minus*. R ≠ ::

» *odoratum*. R

» *rubellum*. R

» *saxatilis*. ||| R

Thermopsis montana. :: R V

Thlaspi bellidifolia. R |||

» *cepæfolia*. R |||

» *rotundifolia*. ||| T

» *violascens*. R

Thymus serpyllum. R ± ≠ Mel Med

Tiarella cordifolia. O ÷÷

Tofieldia calyculata. H T

» *glacialis*. H T

Tolmæa Menziesii. O

Towsendia Wilcoxiana. |||

Trachelium cœruleum. ∧

Tradescantia virginica. V

Trautvetteria palmata. O ×

Trientalis europea. O ×

Trifolium alpinum. Pr R

Tritoma, voir *Kniphofia*.

Trollius asiaticus. H

» *aurantiacus*. H

» *calthæoides*. H

» *europæus*. H Med

» *hybridus* (variété superbe). H

» *yunnanensis*. H

Tulipa greigii.

» *marjoletti*.

Tunica saxifraga. ||| ≠

» *alba*. ||| ≠

Tussilago Farfara (Taconnet). Med

Ulex europæus (ajonc). † ×

Umbilicus pendulinus. |||

» *semenovi* (v. en outre *Cotyledon*). |||

Uniola latifolia. V +

Vaccinium Myrtillus (*Myrtille*). × ::

Vaccinium uliginosum. X ::
 » *Vitis-Idæa* (*Airelle*). X ::
Valeriana alliariaefolia. R +
 » *integrifolia*. R
 » *montana*. R |||
 » *officinalis*. H Med
 » *pyrenaica*. R
 » *Saliunca*. ||| R
 » *supina*. ||| R
 » *tripteris*. R |||
Vella spinosa. |||
Veratrum album. R Med
 » *californicum*.
 » *nigrum*. R
Verbascum Olympicum. ≠
 » *Florariensis*. R
 » *Phoeniceum*. R
 » *Thapsus*. ≠ Mel (Bonhomme).
 » » à fl. blanches.
Verbena venosa. R
 » *officinalis*. Med
Vernonia altissima. V
Veronica Allionii ± ||| R
 » *alpina*. ||| N
 » *aphylla*. ||| R
 » *armena*. R
 » *austriaca*. R
 » *bellidioides*. R X
 » *Biebersteiniana*. R
 » *caucasica*. R ±
 » *Chameedys*. R
 » *crassifolia*. R V +
 » *foliosa*. R
 » *fruticulosa*. ± ||| R
 » *gentianoides*. ± R
 » *incana*. ±
 » *longifolia* (*maritima*). V + Mel
 » *alba*.
 » *rosea*.
 » *multifida*. R
 » *officinalis*. ± ÷÷
 » *orchidea*. R
 » *orientalis*. R
 » *paniculata*. V + R Mel
 » *pectinata*. R
 » *peduncularis*. R
 » *Ponæ*. R
 » *prostrata*. ± R
 » *satureyoides*. ||| R
 » *saxatilis*. ||| R
 » » à fl. blanches.
 » *serpyllifolia*. ± R
 » *spicata*. ± R S
 » *spuria*. R
 » *stenophylla*. R
 » *tenuifolia*. R
 » *Teucrium*. R Pr ≠ Mel
 » *Traversi*. † R +
 » *urticifolia*. O ÷÷
 » *virginica*. V Mel

Veronica Whitalli. R
Vesicaria utriculata. ||| ≠ Mel
Viola altaica. R
 » *arenaria*. R
 » *atlantica*. R
 » *Bertolini*. R
 » *biflora*. O RT
 » *Bosniaca*. R
 » *calcarata*. R Pr
 » » *alba*.
 » » *grandiflora*.
 » *campestris*. R
 » *canadensis*. R
 » *cenisia*. ||| R
 » *chinensis*. R
 » *cognata*. R
 » *cornuta*. R B
 » » à fl. blanches.
 » » var. "Admiration".
 » » var. "Firmament".
 » » var. *grandiflora*.
 » » var. "La Reine".
 » » var. *lutea*.
 » » var. "Perfection".
 » » var. à fl. roses.
 » » var. "Sensation".
 » » mélange de toutes coul.
 Les Pensées vivaces de ce groupe cornuta sont des plus faciles à élever et à cultiver; elles fleurissent de mai jusqu'en hiver et sont des plus précieuses d'entre les pl. à garnitures de rochers, plates-bandes, corbeilles, etc.
 » *delphinifolia*. R
 » *dissecta*. ÷÷
 » *elatior*. H R
 » *Florariensis* (variété hybride, voisine de rothomagensis et qui fleurit perpétuellement; l'une des meilleures fl. alpines). R ||| B V ≠
 » *gracilis*. R
 » *heterophylla*. |||
 » *Jovi*. R
 » *latisepala*. R
 » *lutea*. R
 » » *grandiflora*
 » *lutescens*. ≡ N R
 » *mirabilis*. R
 » *multifida*. R
 » *munbyana*. R
 » *odorata*. R
 » *palmaris*. R
 » *palustris*. H
 » *pinnata*. R
 » *pratensis*. R
 » *pubescens*. O R
 » *pumila*. R
 » *purpurea*. R
 » *rothomagensis*. R |||

Viola splendida. R B

• *splendida hybrida.*

Superbe Pensée des Alpes reçue
des Abruzzes et qui fleurit long-
temps.

• *uliginosa.* R

• *Valderia.* ||| R

Vittadenia triloba. |||

Wahlenbergia lobelioides. R

• *Hederacea.* T

Wulfenia carinthiaca. ||| X

Wyettia angustifolia. R +

Xanthoceras sorbifolia. †

Yucca glauca. V



LITTÉRATURE (Ouvrages de M. Henri CORREVON).

NOS ARBRES DANS LA NATURE

Bel album élégamment relié, comprenant 100 planches coloriées (peintures de M^{lle} A. Correvon et M. F. Correvon) et 146 pages de texte dont la presse unanime a salué l'apparition avec beaucoup de faveur en recommandant le volume.

Voici des extraits de quelques journaux.

Gazette de Lausanne, 5 décembre 1920 :

« Voilà un bien bel ouvrage, et qui ferait douter de la crise du livre. M. Henry Correvon, auteur d'ouvrages connus sur les arbres et les fleurs, nous donne aujourd'hui une luxueuse anthologie des arbres de la Suisse, en un volume orné de 100 planches en couleur. M. Correvon fait pour les arbres ce que Paul Robert a fait pour les oiseaux; il nous les présente en botaniste, pour les faire mieux connaître, mais surtout en artiste, pour les faire aimer davantage... Parce qu'il fera aimer la beauté des arbres, le livre de M. Correvon sera vraiment un ouvrage d'éducation nationale; et non pas seulement de cette éducation qui se donne à l'école, mais de cette autre, plus efficace quand il s'agit de communiquer des dispositions morales, qui est l'œuvre de la famille et de la société...

Semaine Littéraire, du 4 décembre 1920 :

« Nous devons déjà à la collaboration de M. H. Correvon et de la Maison Atar deux volumes qui ont contribué à développer chez nous les connaissances botaniques : *Flore alpine*, si délicieusement illustré par Ph. Robert, et *Fleurs des Champs et des Bois*, avec planches de S. Rivier. Saluons un dernier venu de cette collection : *Nos arbres dans la Nature*...

Feuille d'avis de Neuchâtel.

« Le livre qui vient de paraître, fort de 354 pages, attire et retient l'attention par plusieurs particularités bien personnelles et qui nous changent un peu des atlas et des albums auxquels les éditeurs nous avaient habitués. Il n'a rien de l'aridité monotone d'une nomenclature scientifique et cependant le lecteur, désireux de connaître le nom des arbres qu'il rencontre au cours de ses promenades dans nos forêts et nos parcs, sera renseigné par : *Nos arbres dans la Nature*...

La Suisse Libérale, 16 décembre 1920 :

« Mais il n'y a pas que l'exécution matérielle à signaler dans les *Arbres* de Correvon. Il y a d'abord la beauté des originaux, huile ou aquarelles, qui rendent à merveille l'aspect de nos arbres. Les auteurs auraient pu viser uniquement à l'effet artistique, faire des tableaux agréables à l'œil, des bouquets d'arbres plaisants, de jolis motifs; c'eût été sacrifier la science à l'effet; ils auraient pu aussi ne faire que des planches documentaires, rigoureusement et exclusivement scientifiques, coucher les arbres sur le papier avec la précision d'une planche anatomique. Ce n'était pas le but à atteindre. Il s'agit de rendre familière la silhouette de nos arbres, de les faire aimer pour qu'on les respecte. Dans ce but, les auteurs ont allié l'utile à l'agréable, la science à l'art et donnent des *portraits* d'arbres aussi exacts qu'artistiques...

La Liberté, du 4 décembre 1920 :

« L'idéal a été atteint de créer un ouvrage digne de figurer dans toutes les bibliothèques, qui satisfasse à tous les goûts et qui rende des services. Les artistes auront du plaisir à le feuilleter; la jeunesse un utile enseignement; les amis de la nature y retrouveront, les soirs d'hiver, sous la lampe, avec une pointe de nostalgie, les joies de leurs promenades le long des champs et sous la voûte amicale des bois. Enfin, les travailleurs, ceux qui, après plusieurs années de labeur ont pu faire bâtir la villa de leurs rêves, y pourront chercher et choisir les arbres qui feront leur horizon et abriteront leur bonheur.

La Tribune de Genève,

« ...Ce volume nous montre ce qu'on ne vit jamais jusqu'ici dans un livre : l'arbre peint dans la nature, le *portrait* de l'arbre vivant sur son terrain. C'est là un service inappréciable rendu par M. Correvon à nous tous qui vivons en un temps où l'on mesure enfin les erreurs d'une civilisation pédante et doctrinaire.

« Le sage, disait Epictète, est celui qui vit conformément à la nature. » Or, si, pour s'y conformer, il faut la connaître, que voilà un grand nombre de générations qui n'en ont guère pris le chemin ; et comme M. Correvon a raison de nous le faire regagner !! Il s'y est pris de fort adroite et attrayante façon.

« Les Arbres, pour lui et sous sa plume, deviennent des personnages, dont les plus vénérables par leur âge, par les circonstances qu'ils traversèrent, par leurs qualités propres, sont l'objet d'une savoureuse description. Avec leur histoire, c'est un peu celle de notre sol que nous apprenons par un de ses côtés les plus poétiques.

« Si M. Henry Correvon rend à la nature un culte constant, celle-ci l'en a bien récompensé. Elle l'a doté d'une sœur et d'un fils habiles à peindre les végétaux... »

En vente chez l'auteur, au prix de 30 francs. "**FLORAIRE**" Chêne-Bourg.

EN SOUSCRIPTION :

Second volume de « **Fleurs des Champs et des Bois** »

La belle œuvre artistique de M^{lle} Rivier dans notre ouvrage sur les Fleurs des Champs et des Bois, des Haies et des Murs, va avoir une suite. Cet album, qui fut si apprécié et si répandu, est loin d'être complet puisque, en cent planches comprenant cent cinquante espèces, on est loin d'avoir donné un aperçu de notre flore naturelle. C'est pourquoi nous avons décidé de publier une nouvelle série contenant plus de cent espèces, où M^{lle} Rivier s'est surpassée et a produit des merveilles que nous serons heureux d'offrir au public. Ce nouveau volume augmentera la série comprenant : *Flore alpine*, *Fleurs des Champs et des Bois* et *Nos arbres dans la Nature*.

Prix de souscription à "Floraire". 25 fr.

Une fois paru, l'ouvrage se vendra 30 fr.

Album des Orchidées de l'Europe centrale et septentrionale

Sous ce titre, nous avons publié en 1899 une collection de 60 planches coloriées représentant les Orchis, les Ophrys et autres Orchidées qui croissent spontanément en Europe (les régions méditerranéennes exceptées) avec 90 pages de texte. Ce volume a été rapidement épuisé et depuis quinze ans on nous prie de le rééditer. C'est ce que nous allons faire, en modifiant le texte pour le mettre mieux à la portée du grand public et le dépouiller de ce qu'il avait de trop scientifique et pédant. Ce sera, en somme, une refonte de notre volume *Orchidées rustiques*, épuisé dès 1893, et du dit album, un ouvrage pratique et de vulgarisation donnant la culture des Orchidées terrestres, leur distribution dans la nature, leur description sommaire et la manière d'en disposer dans les jardins.

La confiance que nous avons dans l'avenir et la certitude que nous marchons vers des temps meilleurs nous soutiennent dans notre entreprise, qui sera couronnée de succès dans la mesure où nos amis nous aideront en souscrivant.

Prix, en souscription, 25 fr. — Après parution, 30 fr.

EN PRÉPARATION : Les Plantes vivaces cultivées dans nos jardins.

PLANTES DES MONTAGNES ET DES ROCHERS

FOUGÈRES et ORCHIDÉES RUSTIQUES

Leur Culture dans les Jardins

par

H. CORREVEON

Un volume illustré in-12.

Honoré de la médaille d'or de la Société nationale d'Horticulture de France
et de plusieurs prix d'honneur aux Expositions d'horticulture.

A la demande, fréquemment renouvelée, de rééditer plusieurs de ses ouvrages sur les plantes (dont quinze sont entièrement épuisés à l'heure actuelle), M. H. Correvon a répondu par un nouveau travail, beaucoup plus considérable que tous les autres et qui peut être considéré comme les résultant tous. C'est un gros volume in-12, de 491 pages, illustré par M. Fernand Correvon et dont voici la table des matières :

- Préface.
- Chap. I. — Les plantes dans les montagnes. Leur caractère particulier; leur nature; leurs conditions d'existence.
- » II. — Acclimatation, semis et culture des plantes de montagnes.
- » III. — Cultures spéciales. Cultures dans le sphagnum, en terrines, en baquets; la tourbière et la moraine.
- » IV. — Les plantes silicoles ou calcifuges par le Dr Rosenthal.
- » V. — Les plantes saxatiles et murales; les murs fleuris.
- » VI. — Construction des rocailles.
- » VII. — Jardins alpins et jardins botaniques alpins.
- » VIII. — Liste des plantes de montagnes cultivées dans les jardins. Leur indigénat, l'époque de leur floraison, leur description sommaire avec indication de la culture convenant à chacune d'elles.
- » IX. — Floraire. L'ombrosum; toit fleuri; gazons fleuris; cultures sur radeau.
- » X. — La fougère.
- » XI. — Les orchidées de pleine terre.
- » XII. — Cactées rustiques.
- » XIII. — Les lys.
- » XIV. — La « Florarina ».
- Index alphabétique des genres du chapitre VIII.
- » des chapitres X, XI, XII et XIII.
- » des noms français.

Ce volume est en vente chez l'auteur, à « Floraire » au prix de
15 francs, port en sus.

LISTE DES OUVRAGES DE M. H. CORREVEON

Les plantes des Alpes. Genève 1885 . . .	Epuisé.		
Les Fougères rustiques. Genève 1890 (3 exemplaires retrouvés)		8.	
Les orchidées rustiques. Genève 1893. . .	Epuisé		
Le jardin de l'herboriste. Genève 1896. . .	»		
Flore coloriée de poche. (1 ^{re} et 2 ^{me} édit.) . . .	»		
Flora tascabile. (1 ^{re} et 2 ^{me} édit.) . . .	»		
Les plantes alpines et de rocaïlles.	»		
Les Fougères de pleine terre.	Prix : Fr.	4.	
Les Iris dans les jardins. (Correvoon et Massé). . . .	»	»	6.
Nos cimetières. (Publié par les soins de la commission d'art public).	Epuisé		
Culture des plantes alpines dans le Sphagnum. »			
Della cultura delle piante alpine nelle regioni secche e calde.	Prix Fr.	1.	
Album des Orchidées de l'Europe. (En réimpression)	Epuisé.		
Atlas de la Flore alpine. (Edité par les soins du Club alpin)	Epuisé.		
Fleurs et Montagnes. Un vol. de poésies . . .	»		
Par monts et par vaux (courses de montagnes) »			
Nos arbres. Un volume in-8, richement illustré. »			
La Flore alpine. Un vol. richement illustré (2 ^{me} édit. entièrement revue et transformée . . .	Epuisé.	»	30.
The Alpine Flora, translated into english by Mr. E.-W. Clayforth ; a superb vol. with 180 pictures of alpine pl. in watercolours	»	»	30.
Fleurs des champs et des bois; 100 planches représentant 180 plantes des champs, des bois, des murs, peints par M ^{lle} Rivier. C'est l'un des meilleurs livres qui ait jamais été publiés sur le sujet.	»	»	30.
En préparation : 2 ^{me} volume Fleurs des champs et des bois, etc.			
Les plantes des montagnes et des rochers.	»	»	15.
Plantes et santé, publié en 1917.	Epuisé.	»	6.
Nos arbres dans la nature. 100 planches coloriées . . .	»	»	30.

Les volumes de M. H. Correvoon ont remporté le prix d'honneur aux deux Expositions nationales suisses de 1896 et 1914 et un grand nombre de médailles d'or et d'argent, etc.

The books of Mr H. Correvoon have got the «Prix d'honneur» in the National Swiss exhibitions of 1896 and 1914, and a great number of diplomes, of gold and silver medals and of distinctions.

510.1
1921 - 1923



LISTE DES GRAINES

OFFERTES PAR L'

Établissement Horticole

« FLORAIRE »

(Jardin alpin d'acclimatation)

H. CORREVON, propriétaire

CHÊNE-BOURG

PRÈS GENÈVE (SUISSE)



36^{ME} CATALOGUE DE GRAINES



Seeds of alpine
and perennial plants

OFFERED BY THE

FLORAIRE Nursery, GENEVA

LES
PLANTES des MONTAGNES et des ROCHERS
FOUGÈRES et ORCHIDÉES RUSTIQUES
Leur culture dans les Jardins

PAR

H. CORREYON

Un volume illustré in-12

Honoré de la médaille d'or de la Société nationale d'Horticulture de France
et de plusieurs prix d'honneur aux Expositions d'horticulture.

Le Guide Pratique de l'amateur de plantes

A la demande, fréquemment renouvelée, de rééditer plusieurs de ses ouvrages sur les plantes (dont quinze sont entièrement épuisés à l'heure actuelle), M. H. CORREYON a répondu par un nouveau travail, beaucoup plus considérable que tous les autres et qui peut être considéré comme les résumant tous. C'est un gros volume in-12, de 491 pages, illustré par M. Fernand CORREYON et dont voici la table des matières :

Préface.

- Chap. I. — Les plantes dans les montagnes. Leur caractère particulier; leur nature; leurs conditions d'existence.
- » II. — Acclimatation, semis et culture des plantes de montagnes.
- » III. — Cultures spéciales. Cultures dans le sphagnum, en terrines, en baquets; la tourbière et la moraine.
- » IV. — Les plantes silicicoles ou calcifuges, par le Dr Rosenstiehl.
- » V. — Les plantes saxatiles et murales; les murs fleuris.
- » VI. — Construction des rocailles.
- » VII. — Jardins alpins et jardins botaniques alpins.
- » VIII. — Liste des plantes de montagnes cultivées dans les jardins. Leur indigénat, l'époque de leur floraison, leur description sommaire, avec indication de la culture convenant à chacune d'elles.
- » IX. — Floraire. L'ombrosum; toit fleuri; gazons fleuris; cultures sur radeau.
- » X. — La fougeraie.
- » XI. — Les orchidées de pleine terre.
- » XII. — Cactées rustiques.
- » XIII. — Les lys.
- » XIV. — La « Florarina ».
- Index alphabétique des genres du chapitre VIII.
- » des chapitres X, XI, XII, et XIII.
- » des noms français.

Ce volume est en vente chez l'auteur, à « Floraire », au prix de 15 francs, port en sus.

LISTE DES GRAINES

OFFERTES PAR L'ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

„FLORAIRE”

(JARDIN ALPIN D'ACCLIMATATION)

H. CORREVON

PROPRIÉTAIRE A CHÊNE-BOURG

PRÈS GENÈVE (SUISSE)

Nos semences se vendent au prix de 75 cent. à 1 fr. le paquet.

Les personnes que le choix d'une collection embarrasse peuvent nous abandonner ce soin. Nous faisons des collections de graines **à notre choix.**

12 espèces pour	fr.	6.50
25 » »	»	12.50
50 » »	»	25.—
100 » »	»	50.—

Nous préparons, sur demande, des collections de graines d'espèces propres aux usages suivants :

Rochers et jardins alpins.

Murailles fleuries.

Pentes arides.

Marécages.

Sous-bois.

Prairie alpine.

Sols calcaires.

Sols non calcaires.

Bordures.

Pl. vivaces pour plates-bandes.

Meilleures plantes pour bosquets.

Pl. mellifères pour abeilles.

Pl. médicinales.

Pl. à parfums.

En collections aux conditions indiquées ci-dessus.

NOTICE

Orders for seeds received here at Floraire are punctually attended to, and the parcels of seeds are sent direct to England. We generally forward them as "samples" (6 d. postage). We send them registered for the trifling extracharge of 2 ½ d. more. Good sized packets of seeds are sold 10^d each, the only difference being that in the case of rarer seeds fewer are put into the packet.

Our seeds are our own crop or have been recoited on the Alps by our own people.

We do special collections for special exigences; as following; Alpine rockeries — Wallgarden — Dry slopes and barren places — Wet places, Marshes and bog gardens — Underwoods — Alpine and Swiss meadows — Chalk or clay soils — Peat — Borders and herbaceous perennials — Dwarf and edging plants — Bees' plants (Melliferous) — Medicinal plants.

Explication des Signes.

Explanation of the marks in the seedlist.

Ab	=	Plantes pour abeilles. — For bees.
Aq	=	Plantes aquatiques. — Water plants.
Ar	=	Plantes propres à être naturalisées sur les pentes sèches et arides. — To naturalise on dry slopes and barren places.
Arb	=	Arbuste pour rocailles. — Rockery shrubs.
Bord	=	Plante à bordure. — Dwarf and creeping, good for the edging of borders.
Env	=	Plantes envahissantes. — Underground creeping.
Gr	=	Plantes grimpantes. — Climbing.
H	=	Humidité. — Dampness.
Med	=	Plantes médicinales. — Medicinal plants.
N	=	Nord. — To place Northside.
O	=	Plante d'ombre. — Plant for the shade.
½ O	=	Mi-ombre. — Half shade.
(Pyren)	=	Graines rapportées cet été des Pyrénées.
Pr	=	Propres à émailler la prairie. — Swiss meadow.
R	=	Plantes de rochers sans exigences spéciales. — Easy grown rock plants.
S ou s	=	Plante spéciale pour soleil. — Sun wanting plant.
Sp	=	Culture dans le Sphagnum. — Sphagnum culture or in the English « moraine ».
T	=	Tourbière. — English « moraine ».
V	=	Plantes vivaces. — Perennial border plants.
tap	=	Tapissantes. — Creeping.
π	=	Espèce de culture spéciale. — Special treatment ¹ .
~	=	Plantes délicates à protéger l'hiver. — Tender plants.
///	=	Plantes murales propres à semer dans les murs. — Wall plants.
+	=	Meilleures espèces pour longue floraison et fleur coupée. — Best sorts for cutting and the best lasting flowers.
O	=	Annuelle. — Annual.
 	=	Bisannuelle. — Biennial.

N. B. — Nous marquons généralement d'un X sur leur paquet les espèces de germination lente. — We generally mark with a X the packets seeds slowly germinating. Some genus (Ranunculaceae, Primulaceae, Rutaceae, etc.) are long to germinate. All our seeds are fresh and must all come up if well treated.

¹Nous rappelons ici que le volume de M. H. Correvon, *Les plantes des montagnes et des rochers*, contient toutes les instructions nécessaires pour la culture des plantes délicates ainsi que pour l'élevage des plantes alpines par semis.

DU SEMIS DES PLANTES ALPINES

AVIS IMPORTANT

Nos graines sont toujours fraîches et ont leur faculté germinative en tant qu'elles ont été récoltées à Floraire ou par nos employés dans les montagnes. Mais il est des clients qui se plaignent de ne pas réussir et c'est pour ceux qui n'ont pas encore l'expérience des graines alpines que nous redonnons ici les renseignements qui ont déjà été publiés tout au long et au détail dans notre volume *Plantes des Montagnes et des Rochers* (Ch. II).

Faire un terreau très léger, sablonneux, juste assez nourrissant pour donner les éléments nécessaires à de toutes jeunes plantes. Nous le composons de : un tiers de tourbe ou terre de bruyère, un tiers de terre franche et un tiers de sable granitique ou calcaire suivant l'espèce. On sème en terrines, en pots ou en caissettes avec un fort drainage. Dans nos pays à climat continental, il est bon d'établir, en-dessus du drainage, une petite couche de Sphagnum qui entretient l'humidité constante et modérée, et même, ceci pour les climats plus secs et plus chauds encore, il faut mélanger un peu de Sphagnum tamisé à cette composition. Les pots ou terrines doivent être placés, enterrés si possible, dans une couche froide et bien aérée. S'il tombe de la neige, il est bon de la laisser arriver sur le sol des semis. L'influence de la neige sur la germination des graines est certaine. Un de nos amis ayant lu ce que nous avons publié à ce sujet nous a montré dans un jardin de la montagne des semis d'une espèce à germination difficile, capricieuse et lente qui ont levé chez lui, après avoir été exposés à la neige pendant un long hiver, au premier printemps et dans une telle abondance qu'on peut dire que toutes les graines ont germé. En tous cas, n'allez pas placer vos semis dans une serre chaude ainsi que l'ont fait plusieurs de nos correspondants qui n'ont, cela va de soi, pas réussi.

Le semis sur place n'est à recommander que quand il s'agit de naturaliser des plantes dans des pelouses, des sous-bois et des coins arides et sauvages qu'on veut animer de fleurs, ou bien encore dans des fentes des murs pour établir des « murs fleuris ».

Il faut, en semant, enterrer très peu, surtout s'il s'agit d'espèces aux graines très fines, et faire attention à l'arrosage qui doit se faire très légèrement pour qu'il n'arrache ou n'enterre pas les graines.

Il va sans dire qu'il ne s'agit ici que des espèces de germination difficile et non des plantes vivaces ordinaires dont la plus grande partie se sèment en plate-bande ou sous couche, en pleine terre et comme cela se pratique pour les salades, les choux et les pensées.

Il faut se souvenir en outre qu'il est des espèces dont les graines germent lentement et difficilement. C'est le cas pour les Gentianées, les Renonculées, les Ombellifères, les Liliacées et plusieurs autres genres. Nous marquons d'une croix sur le paquet les espèces de ce groupe-là.

Nous n'indiquons sur cette liste déjà très longue, que les espèces les plus demandées et les plus courantes. Nous avons récolté un beaucoup plus grand nombre de graines, mais n'en pouvons donner la liste ici. Qu'on sache seulement que nous possédons, outre les espèces indiquées ici, des graines de très nombreuses espèces rares et que nous fournissons sur demande.

Quand on nous demande des collections, nous les formons d'espèces les plus faciles à cultiver et de germination prompte. Nous répétons que, dans ce cas, nos clients veulent bien nous donner quelques indications sur les conditions offertes aux plantes, exposition, climat, etc.

Enfin, dites-vous bien que le plus tôt vous commandez vos graines le mieux vous serez servis.

Paiement.

Net à 30 jours.

Nous prions nos nouveaux clients que nous ne connaissons pas encore de bien vouloir joindre à leur commande le montant soit en chèque sur la Suisse, soit en un mandat postal.

Réclamations.

Les graines étant *toujours fraîches*, leur germination est assurée si l'on procède suivant les instructions données; nous n'admettons en conséquence aucune réclamation concernant la germination.

Nous sommes toujours prêts, d'ailleurs, à donner tous les conseils qui nous seront demandés (timbre pour la réponse, s. v. p.).

Toute réclamation, pour être prise en considération, doit être faite dans les 8 jours après la réception de la marchandise.

Prière d'indiquer les adresses exactes et bien lisibles à chaque commande, et d'affranchir suffisamment les correspondances. Etant donné la quantité considérable de lettres qui nous sont présentées mal affranchies, nous nous voyons dans la nécessité de les refuser dorénavant.

GRAINES DE PLANTES

DE

Montagnes et de Rochers, d'Arbustes de rocailles et de Plantes vivaces.

Acæna glabra.
» **glauca.**
» **inermis.**
» **ovalifolia.**
» **Sanguisorba.**
» **sarmentosa.**
Plantes tapissantes pour l'ombre.

Acantholimon Balansae.

» **Fomini.**
» **glumaceum.**
» **graminifolium.**
» **lepturoides.**
» **venustum.**

Plantes de rochers extrêmement belles, grand soleil et sec.
Ont donné cette année des graines fertiles à cause du sec.

Acanthus mollis. V s

» **spinosissimus. V s**

Achillea ageratum. Ar s Pr

» **aizoon. ///**
» **atrata. /// R**
» **Clavenæ. R ///**
» **filipendula. V + Pl. solide fleuris-**
» **sant tout l'été; s**
» **herba Rota. /// s**
» **holosericea. R**
» **impunctata. /// s**
» **Kellereri. R**
» **lanulosa. R**
» **lingulata. R**
» **macrophylla. O**
» **millæfolium. Ar Pr**
» **roseum.**
» **mongolica. R**
» **moschata. /// R s**
» **nana. S π**
» **sarracenicæ. R s**
» **serbica. R Bord ///**

Achillea sericea, belle espèce basse, à fleur
jaune vif. **Ar. Env.**

» **tomentosa. Bord R s tap**
» **Vandasii. R s**

Aconitum anthora. R s

» **Cammarum. ½ O V**
» **Columbianum. ½ O V**
» **Fischeri. O V**
» **lycoctonum. ½ O V**
» **napellus. ½ O V Med**
» **» à fleurs blanches.**
» **» à fleurs roses.**
» **paniculatum. ½ O V**
» **septentrionale. ½ O V**
» **variegatum. ½ O V**
» **Vilmorinianum. ½ O V**
» **Wilsoni. ½ O V**

Actæa rubra. O

» **spicata. O**

Actinella scaposa. R

Adenophora liliifolia. V s

» **Potanini. R V**
» **stylosa. R V**
» **verticillata. V s**

Adenostyles albifrons. R O

» **alpina. R O**
» **leucophylla. R s**

Adonis pyrenaica. s

» **vernalis.** Grande anémone à fleur
d'or; mars-avril. **S**
» **Walziana. S**

Aethionema armenum. /// S

» **antitauri. /// S**
» **cappadocum. /// S**
» **cordatum (Eunomia cordata). /// S**
» **creticum. /// S**
» **Florariensis. /// S**
» **gracilis. /// R s**
» **grandiflorum. /// S**

Aethionema iberideum. ///

- » Kotschy. /// S
- » pulchellum. /// R
- » saxatile. /// R s
- » schistosum. /// R s
- » sp. Asia Minor. /// s
- » stylosum. /// S
- » Thomasianum. /// S
- » trinervium. /// S
- » warleyensis. ///

Aethopappus pulcherrimus. R

Agathea colestris. ^

- » petiolata (nouveau). /// R

Agave virginica. S

Agrostemma coronaria (coquelourde). V

Ajuga pyramidalis. R

- » genevensis. R Pr Env
- » reptans. Pr tap R

Alkana orientalis. R

Akebia quinata. Gr

Alchemilla alpina. Med Pr

- » splendens. Pr R
- » vulgaris. Pr Med

Allium pedemontanum. R

- » Moly. R Pr
- » Ursinum. O Med
- » Victoriale. R Med

Alsine austriaca. ///

- » Banatica. R
- » Bauhinorum. ///
- » caucasica. R
- » hirsuta. ///
- » juniperifolia. ///
- » liniflora. R
- » mucronata. ///
- » recurva. ///
- » Rosani. /// R
- » stricta. T
- » tenuifolia. R
- » verna. ///
- » villarsii. ///

Althæa ficifolia. V (jaune)

- » Soleil pâle (jaune double).
 - » rosea (Rose trémière). V Med Ab
- A fl. simples ou doubles; à semer ou planter dans les grands jardins ou en bordure des massifs d'arbustes; fleurissent de mai à octobre.

Alyssum amaranth. ///

- » alpestre. ///
- » argenteum. R S
- » calyocarpum. R
- » condensatum. R S
- » creticum. ///
- » halimifolium. /// R s

Alyssum idæum. ///

- » lucidum. R
- » maritimum. R
- » Möellendorffianum. ///
- » montanum. R
- » murale. ///
- » orientale. R
- » persicum. R
- » petræum. R
- » pyrenaicum. ///
- » repens. ///
- » rostratum. R
- » rupestre. ///
- » saxatile. R /// (Corbeille d'or).
- » var. citrinum.
- » var. compactum.
- » speciosum. R
- » spinosum roseum. ///
- » spinosum. /// R S
- » tortuosum. R
- » Wiersbickii. R Ar
- » Wulfenianum. ///

Amelanchier vulgaris. Arb

Amphycome arguta. R S V

Amsonia latifolia. V

Anagallis tenella. T Sp

- » grandiflora. O
- » linifolia. ^

Anchusa italica. Mel V

- » var. Dropmoreana. Mel. V
- » var. Floaire. Mel V

Bonnes Bourraches vivaces de grandes dimensions, aux innombrables fl. d'un bleu intense (mai-octobre).

Androsace albana. π ///

- » Brigantiaca. R
- » carnea. R
- » Chaixi. O
- » chamaejasme. R ///
- » ciliata. R ///
- » coronopifolia. O
- » cylindrica. π ///
- » foliosa. R
- » glacialis. π ///
- » Halleri. ///
- » Haussmanni. π ///
- » Hedraeantha. ///
- » Helvetica. π /// S
- » imbricata (argentea). π ///
- » lactiflora. O
- » lactea. R
- » Laggeri. R /// (Pyrén)
- » lanuginosa. R
- » Mathildæ. ///
- » obtusifolia. R

Androsace oculata. R

- » Pacheri. ///
- » prætutiana. ///
- » primuloides. R
- » pubescens. ///
- » pubescentula. O
- » sarmentosa. R
- » sempervivoides. R
- » septentrionalis. R
- » villosa. R S (Pyrén)
- » vitaliana. /// R S
- » vitaliana. /// R S (Pyrén)

Anemone albana. R

- » alpina. R $\frac{1}{2}$ O Pr
- » amoena. R
- » Baldensis. R
- » blanda. R
- » Chinensis. R
- » decapetala. R
- » dichotoma (pennsylvanica). R Env
- » fulgens. V s
- » globosa. R
- » Halleri. R
- » Hepatica. R Bord
- » Hortensis, en belles variétés.
- » japonica. V
- » magellanica. R
- » montana. R
- » multifida. R
- » narcissiflora. R Pr
- » nemorosa. O sous bois.
- » » var. bracteata.
- » » à fleurs bleues.
- » nigricans. R
- » polyantha. R
- » pratensis. R
- » pulsatilla. B R S Pr
- » » var. alba.
- » ranunculoides. R
- » rivularis. R H
- » Robinsoniana. R
- » rubra. R
- » sulfurea. R Pr
- » stellata. S R
- » sylvestris. A R
- » transylvanica. R
- » trifoliata. R
- » vernalis. R
- » virginiana R

Anemonopsis macrophylla. O

Angelica Archangelica (Angélique). V Med

Antennaria alpina. R B

- » carpathica. R
- » dioica. R B
- » magellanica. R
- » plantaginea. B P

Antennaria triplinervis. B R

Anthemis austriaca. R

- » Biebersteini. R
- » carpathica. R
- » montana. R
- » nobilis (camomille romaine). Med
- » rigescens. R V Pr
- » tinctoria. R + Pr

Anthericum ramosum. R (Lis des rochers).

Anthyllis montana. R B

- » vulneraria. Pr R Med

Antirrhinum asarina. /// R S

- » glutinosum. ///
- » majus, type sauvage. /// S V
- » » corail. V
- » » Lightrose. V
- » » orangé vif. V
- » » variétés en mélange.
- » sempervirens. /// (Pyrén)
- » » var. roseum.
- » siculum. ///

Aphyllanthes monspeliensis. R S

Apiostuberosa. Gr

Aponogeton distachyon. Aq.

Aposeris foetida. O Env

Aquilegia alba. V Pr R

- » » grandiflora.
- » alpina. O R (1)
- » (Récoltés dans les Alpes.)
- » alpina des jardins.
- » artica. R
- » atrata. R Pr
- » californica. R V
- » » hybrides.
- » canadensis. R
- » cœrulea. V
- » Einseleana. V
- » flabellata. R
- » formosa. Pr
- » glandulosa. R
- » Haylodgensis.

Superbe hybride à grandes fl. et à longs éperons.

Helenæ. R

hybrida, extra (Floraire). V

Fl. multicolores, grands éperons, teintes les plus harmonieuses; pl. d'un effet superbe, composant des tableaux merveilleux.

hybrides à grandes fleurs récoltées dans un jardin de la Haute Engadine.

hybrides « Exhibition » (anglaises).

Othonis. R

oxypetala. R

Aquilegia pubiflora. R

- » pyrenaica. **R (Pyrén)**
- » Reuteri. **R**
- » rosa. **R Pr**
- » skinneri. Fl. rouge et jaune. **R**
- » transylvanica. **R**
- » vulgaris. **Pr R**
- » vulgaris, variétés cultivées à la haute montagne; superbe choix.

Les ancolies sont d'excellentes pl. d'ornement, de culture très facile, s'accommodant également de l'ombre et du soleil, mais préférant la mi-ombre et la fraîcheur. Leurs graines germent de suite. A recommander les var. de vulgaris pour jeter dans un sous-bois ou une pelouse fraîche; effet merveilleux, floraison abondante en mai-juin.

Arabis albida. R

- » alpina. **R**
- » » nana compacta.
- » Ferdinand-Coburgi.
- » pendula.
- » » superba.
- arenosa, bellidifolia, caucasica, cebenensis, cenisia, collina, coerulea, Drummondi, Halleri, hybrida, japonica, lucida, Ludoviciana, nordmanniana, ovirensis, pendula, procurrens, pumila, purpurascens, rosea, scopoliana, Soyeri, Stelleri, Sturii. **R ///**

Arctostaphylos alpina.

- » Uva Ursi (raisin d'ours). **R Med**

Arctotis grandis. O (Aster argenté du Cap.)

Arenaria Balearica. ///

- » biflora. ///
- » graminifolia. **R Pr**
- » grandiflora. **R**
- » Keriniana. **R**
- » Kotschyana. ///
- » laricifolia. ///
- » lateriflora. ///
- » longifolia. ///
- » nardiflora. ///
- » purpurescens. **R**
- » Sajenensis. **R**
- » Saxifraga. ///
- » sericea. **R**
- » tetraquetra. ///
- » tridentina.
- » verna. **R**

Armeria alpina. R

- » Bee's Ruby. **R**
- » cæspitosa. ///

Armeria graeca. R

- » Halleri. **R**
- » majellensis. **R B**
- » maritima. **R B (vulgaris).**
- » » à fl. blanc pur.
- » plantaginea. **R**
- » setacea. **R**
- » vulgaris. **R Bord Ar**

Arnica longifolia. Pr

- » montana. **T Sp R Med Pr**

Aronicum glaciale. R

- » scorpioides. **R T**

Artemisia absinthium. Ar Med

- » annua. **O (balsamique).**
- » arborea. **R ///**
- » atrata. ///
- » austriaca. **R**
- » cretacea. ///
- » discolor. **R**
- » glacialis. ///
- » glauca. **B Ar Env**
- » granatensis. **R ///**
- » lanata. ///
- » maritima. ///
- » mutellina. (Génipi). **Med R**
- » nana. **R**
- » sacrorum. **Ar**
- » spicata (vrai Génipi). **Med ///** π
- » Tournefortiana. **Ar**
- » tridentita. **R s**
- » valesiaca. ///
- » vestita. **Ar**
- » Villarsii. ///
- » vulgaris. **Ar Med**

Pl. de grand soleil, à naturaliser sur pentes arides, sauf les esp. marquées ///

Arum italicum. O

Asarum canadense. O Bord

- » canasicum, **R O**
- » europæum. **O Bord**

Asclepias Cornuti. V Ab Env

- » tuberosa. **V + Ab**

L'une des plus brillantes des pl. vivaces; 50 cent. haut, fl. en ombelles étalées, d'un orangé très vif, grand effet. (Août-octobre).

Asparagus acutifolius. R S

- » tenuifolius. **R S**

Asperula azurea.

- » cynanchica. **R**
- » galioides. **R**
- » hirta. **R**
- » odorata. **O Med Sous-Bois.**
- » orientalis. **R**
- » taurina. **O Sous-Bois.**

Asperula tinctoria. R
Asphodelus albus (*Asphodèle*). Ar
Asphodeline cretica. V
 » *lutea.* V (Bâton de Jacob).
Aster alpinus. R
 » » à fl. blanches. R
 » » à fl. roses.
 » » superbus.
 » *amelloides.* + Ab
 » *Amellus.* Pr Ab Ar
 » *Amellus roseus.* +
 » *bessarabicus.* V Ab
 » *caucasicus.* R
 » *cordifolius.* V Ab
 » *Datschyi.* V
 » *diplostephioides.* R Bord
 » *galliculatus.* R
 » *himalaicus.* R
 » *hybridus.* + Ab
 » *Ibericus.* + V
 » *lævis.* V
 » *macrophyllus.* V
 » *novi-Belgii.* Ab
 » var. « *Crépuscule* ».
 » *Porteri.* /// Ab
 » *pseudo-Amellus.* R V
 » *Ptarmicoides.* V
 » *pyreneus* (vrai). R
 » *roseus.* V +
 » *sericeus.* R
 » *suffruticosus.* R
 » *vestitus.*
Astilbe Davidi. H
 Délicate panicule de fleurs roses,
 dressée en gros épis.
 » Hybrides variées.
 » *rivularis.* H
Astragalus alopecuroides. R
 » *alpinus.* R
 » *aristatus.* ///
 » *cicer.* Med Ar
 » *depressus.* R
 » *exscapus.* S (du Simplon).
 » *glycyphyllós.* Ar
 » *himalaicus.* R
 » *monspessulanus.* /// R
 » *Onobrychis.* R
Astrantia carinthiaca. R
 » *gracilis.* R
 » *major.* H R Pr Ab
 Plante très montagnarde et des
 plus faciles à cultiver; l'une des
 meilleures plantes mellifères.
 » *major* à fleurs roses.
 » *minor* /// N
Athamante cretensis. R ///

Athamante Matthioli. R
Atragene alpina. $\frac{1}{2}$ O Gr
 » *Coreana,* à fl. jaunes. Gr
Atropa Belladonna (*Belladone*). O Med
 » » à fruits jaunes.
Aubrietia Bakeri.
 » *Columnae.*
 » *croatica.*
 » *deltoides.*
 » *Eyrii.*
 » *erubescens.*
 » *Fire King.*
 » *Florariensis.*
 » *græca.*
 » *grandiflora.*
 » *Hendersonni.*
 » *hybrides de Floaire.*
 » *hybrida superba.*
 » *italica.*
 » *Floaire.*
 » *Kötschyi.*
 » *Leichtlini.*
 » *libanotica.*
 » *Lilac Queen.*
 » « *Lloyd Edward* ».
 » *Marshalli.*
 » *Moehreimi.*
 » *olympica.*
 » *Paul's lilac.*
 » *Peter Barr.*
 » *Pinardi.*
 » *Pritchardi.*
 » *purple King.*
 » *purpurea.*
 » *Richardsoni.*
 » *Rosea grandiflora.*
 » *Souvenir de W. Ingram.*
 Petites Crucifères vivaces for-
 mant des tapis couverts de fl. d'un
 lilas plus ou moins vif suivant les
 espèces. Excellentes pour les mu-
 railles, les rochers et les bordures
 en plein soleil. Elles se sont natu-
 ralisées sur les murs des environs
 de Vevey où, dès le mois de fé-
 vrier, elles forment une décora-
 tion merveilleuse. Culture facile.
 Fleurs de janvier en juin, sui-
 vant les endroits.
Azalea procumbens. ///
Banffia petræa. ///
Baptisia australis. V
Bartsia alpina. π
 » *spicata.* π
Bellidiastrum Michelli. H
Bellis cœrulescens. /// R

Bellis mexicana. **R**
Bellium bellioides. ///
 » *nivale.* ///
Berberis Wilsoni; le plus beau du genre
 nouvellement introduit de l'Asie
 centrale.
Berkheya purpurea. **R**
Berteroa incana. **R**
 » *mutabile.* **R**
Betonica alopecuros. **R**
 » *grandiflora.* **Pr R**
 » *grandiflora superba.* **Pr R**
 » *hirsuta.* **Pr R**
 » *officinalis.* **Pr R**
 » *orientalis.* **Pr R**
Betula nana. **Arb**
Bidens dahlioides. *Dahlia* vivace et rus-
 tique.
Biscutella lævigata. **Pr R Ab**
 » *lucida.* **R**
Blitum virgatum (Epinard-fraise).
 » *capitatum.* **R**
 Plantes curieuses portant comme
 des fraises d'un vermillon très vif,
 à l'aisselle des feuilles.
Bocconia microcarpa. **V**
Borago laxiflora. **R H**
 » *officinalis.* **Ab**
 » *officinalis alba.*
 » *orientalis.* **R**
Brassica repanda. /// **R**
Braya pinnatifida. **π**
Brickellia grandiflora (Ageratum jaune).
Briza major.
 » *media.*
Bromus squarrosus. **R**
Budleya variabilis.
 Arbuste à croissance rapide, à
 floraison abondante (fleurs en
 grappes violet et or) et qu'on
 élève facilement de graines.
Bulbocodium latifolium. **R**
 » *vernum.* **Pr R**
Buphtalmum grandiflorum. **R**
 » *salicifolium.* **Pr**
 » *speciosissimum* (très rare). /// **N**
Bupleurum falcatum. **R Pr**
 » *fruticosum.* **Arb**
 » *longifolium.* **R**
 » *ranunculoides.* **R**
 » *stellatum.* **R ///**
Calamintha acynos. **R**
 » *alpina.* **R**
 » *grandiflora.* **R**
Calandrina umbellata. **R**
Calla palustris. **Aq**

Caltha palustris. **H**
 » *polysepala.* **H**
Calystegia dahurica. **Gr**
Camassia exulenta. **Pr R**
Camomille (v. *Anthemis nobilis*).
Campanula acutangula. ///
 » *Abietina.* **R**
 » *alata.* **V**
 » *alliarifolia.* **V + Fl.** blanches
 décoratives.
 » *Allionii.* **R ///**
 » *Ardonensis.* ///
 » *barbata.* **R Pr**
 » *Baumgartani.* **R**
 » *bellidifolia.* ///
 » *betonicæfolia.* **R**
 » *bononiensis.* **R**
 » *Canterburiana.* **R**
 » *capitata.* **R**
 » *carnica.* ///
 » *carpathica.* **B V R**
 » » *alba.*
 » » » *grandiflora.*
 » » » *var. compacta.*
 » » » *Riverslea.*
 Le *C. carpathica* (facile à élever
 de semis) est une excellente plante
 de rochers, de plates-bandes et de
 bordures; fleurit de mai jusqu'en
 automne; grandes fleurs, violettes
 ou blanches; plantes basses et for-
 mant tapis.
 » *cenisia.* /// **π**
 » *cervicaria.* **R**
 » *collina.* **R Env**
 » *crispa.* **R ///**
 » *cristallocalyx.* **R**
 » *Cymbalaria.* ///
 » *dahurica.* **Pr R**
 » *elatinoides.* /// **O**
 » *eriocarpa.* **V**
 » *excisa.* /// **π**
 » *Fenestrellata.* ///
 » *flexuosa.* /// **S**
 » *fragilis.* /// **~**
 » *garganica.* /// **R**
 » » *villosa.* ///
 » *glomerata.* **Pr R**
 » » *var. à fl. blanches.*
 » » *var. acaulis.*
 » *grandis.* **V**
 » » *à fl. blanches.*
 » *incurva.* **R**
 » *istriaca.* ///
 » *lactiflora.* **R ½ O**
 » *lamiifolia.* **R**

Campanula lanata. /// (velutina).

- » latifolia. **R V O** Sous-Bois.
- » » à fl. blanches.
- » » azurea.
- » libanotica. **R**
- » longistyla. **R**
- » macrantha. **V**
- » » à fl. blanches.
- » macrorrhiza. ///
- » medium, type des Hautes-Alpes. **R ||**
- » medium, type des jardins, mélange de toutes couleurs (Campanule Carillon). + **V R Pr**
- » la même à fl. doubles. +
- » michauxioides. **R**
- » mirabilis. ///
- » Mœhreimi. **V**
- » montana. **R**
- » muralis (Portenschlagiana). ///
- » Muretti. ///
- » nitida. **R**
- » nobilis. **R**
- » Pallasiana. **R**
- » patula. **Pr**
- » pelviformis. **R**
- » persicifolia. **V R O**
- » » alba superba.
- » » azurea.
- » » à fl. doubles.
- » petraea. /// (Récolt. dans les Alpes-Marit.).
- » phytidocalix. **R**
- » psylostachia. **R**
- » pulla. ///
- » pulloides. **R**
- » punctata. **R Env**
- » » à fl. blanches.
- » pusilla. /// **R**
- » » à fl. blanches.
- » pyramidalis. /// **R Ab Ar**
- » » alba.
- » Raddeana. **R**
- » rapunculoides. **Pr Env**
- » rhomboidalis. **Pr R**
- » rotundifolia. **Pr R**
- » rotundifolia alba.
- » rupestris. ///
- » ruthenica. **R Pr**
- » salicifolia. **R**
- » Sarmatica. **R Pr**
- » saxifraga. **R ///**
- » Scheuchzeri. **R**
- » » à fl. blanches.
- » sibirica. **R**
- » soldanellæflora. **R**

Campanula speciosa. **R (Pyrén)**

- » Speculum. **O**
- » spicata. **R**
- » stenocodon. ///
- » subpyrenaica.
- » thrysoidea. **R**
- » tomentosa. ///
- » Tommasiniana. ///
- » Trachelium. **R Pr Ar**
- » » à fl. blanches.
- » » à fl. doubles.
- » Tyrolensis. ///
- » urticifolia. **R** Sous-Bois.
- » Valdensis. ///
- » Vanneri. ///
- » velutina. ///
- » Venzloi. /// **R**
- » versicolor. /// **R**
- » Vidali. ^
- » Waldsteiniana. ///
- » Wilsoni. ///
- » Zoyzii. /// π
- Canarina Campanula. ^
- Cardamine alpina. /// π
- » asarifolia. **H**
- » chenopodifolia. **R**
- » resedifolia. ///
- » sibirica. **H**
- » trifoliata. **O**
- Carduus acanthoides. **Pr**
- » aurisocus. **Pr**
- » defloratus. **Pr**
- » nutans. **Pr Ab**
- Carex Baldensis. **H**
- » bicolor. **H**
- » Buchananii (feuill. brun).
- Carlina acaulis. **R Pr Ar**
- » acanthifolia. **R Ar**
- » cynara (Chardon d'or). **R Ar**
- Cathcartia villosa. **O X**
- Catananche coerulea. **R**
- Cedronella triphylla. ^
- Centaurea alpina. (jaune paille) **R**
- » Babylonica. **V**
- » dealbata. **R**
- » macrocephala. **V**
- » montana. **R O Bord**
- » » à fl. blanches.
- » nervosa. **Pr**
- » orientalis. **R**
- » præalta. **R Ar**
- » Ruthenica. **R** (jaune)
- » rutifolia. **R**
- » uniflora. **R**
- Centranthus angustifolius. **R ///**
- » ruber (Valér. rouge des murs).

Centranthus ruber alba.

» *atrorubens.*

Les *Centranthus* ou Valérianes des murs sont recommandables comme pl. de haute décoration pour la garniture de plates-bandes, des grands rochers, des pentes arides, des murailles surtout. Elles fleurissent abondamment de juin jusqu'en hiver et font un tableau merveilleux dans un paysage.

Cephalaria alpina. **V Ab R**

» *leucantha.* **Ab**

Cerastium glaciale. **/// π**

Cerastium album, alpinum, argenteum (Argentine), Biebersteini, Chloræfolium, Columnæ, illyricum, strictum, tomentosum, uralensis, villosum, vulgatum.

Pl. solides pour rochers ensoleillés, murs, bordures, etc., fleurs blanches, feuillage plus ou moins argenté.

Cerinthæ alpina. **R Ab**

Chænostoma fastigiata.

» *viscosa.*

Chamæpeuce diacantha. **Ar R**

Cheiranthus Allionii, sorte de giroflée odorante aux fleurs du plus bel orangé, se succédant de juin à fin novembre; pl. de grand effet. |
+ **R Ab**

» *Cheiri (Giroflée des murs).* **/// V +**

» *Cheiri var. horticoles.*

» *Kewensis.* **R**

» *nanus.* **R**

Chelidonium Franchetianum. **O**

Chelone barbata. **V + Ab**

L'une des plus brillantes d'entre les plus vivaces; fl. vermillon ardent (juin-novembre).

» *barbata amarantina.* **V**

» » *hybrida.* **V**

» *imberbe.* **V**

» *obliqua.* **V**

» *Torreyi.* **V**

Chicorium Intybus. **Ar (bleu azur)**

» à fleurs blanches.

Chlora perfoliata. **R O**

Chrysanthemum alpinum. **R**

» *arcticum.* **R**

» *coronopifolium.* **R**

» *maximum.* **V + (grande marguerite blanche).**

» *var. Etoile d'Anvers.*

» *uliginosum.* **V**

Chrysogonum virginianum. **R**

Chrysopsis villosa. **R**

Chrysosplenium alternifolium. **/// H N**

» *oppositifolium.* **/// H N**

Cimicifuga cordifolia. **O**

» *fetida.* **O**

» *racemosa.* **O**

» *simplicifolia.* **O**

Cineraria aurantiaca. **R**

» *campestris.* **R**

» *maritima.* **R**

» *suaveolens.* **V Ab**

Circæa Lutetiana. **O** Sous-Bois.

Cirsium acaule. **Pr Ab**

» *Eriophorum.* **Pr R Ab**

» *Erysithales.* **O Ar**

» *ferox.* **R Ar**

» *heretophyllum.* **H**

» *monspessulanus.* **H**

» *spinosissimum.* **R H**

Cistus albidus. **^ Arb**

» *crispus.* **Arb**

» *florentinus.* **Arb**

» *ladaniferus.* **^ Arb**

» *laurifolius.* **Arb**

» *monspeliensis.* **^**

» *salviæfolius.* **Arb**

» *vaginatus.* (Bertolettianus). **^**

Ce sont les délicieux Cistes des garrigues de la Méditerranée.

Claytonia perfoliata. **H T R**

Clematis flammula (liane de neige). **Gr**

» *Fremonti.* **V +**

» *graveolens* (fl. jaunes). **Gr**

» *integrifolia.* **V +**

» *montana.* **Gr**

» » *var. rosea.*

» *recta.* **V R Ar**

» » *purpurescens.* **+**

» *stans.* **V +**

» *Tangutica* (fl. jaunes). **Gr**

» *vitalba.* **Gr**

Cneorum tricoccum. **Arb ^**

Codonopsis lanceolata. **S R**

» *ovata.* **S R**

Colchicum alpinum. **R**

» *autumnale.* **Ab Pr**

Colletia Chilensis. **Arb**

Collomia grandiflora. **O**

Colluria geoides. **R**

Coluteocarpus reticulatus. **R ///**

Comarum palustra. **H**

Commelina cœlestis. **^**

Convallaria majalis (*Muguet*).

» » *var. à fl. roses.*

Convolvulus cantabricus. **^ R**

Convolvulus althacoides. ///
 » mauritanicus. R
Coreopsis grandiflora. V + Pl. vivace
 de première valeur.
 » lanceolata. V +
 » oculata. V +
 » palmata. V
 » tenuifolia. V
 » tinctoria. O
 » tripteris. V
 Pl. vivace de toute première
 importance; cult. facile; fleuris-
 sant tout l'été; jaune très vif;
 grand effet.
Coris monspeliensis. R
Cornus canadensis. T
 » suecica. T
Coronilla cappadocica.
 » coronata. Ab Arb
 » Emerus. Ab Arb
 » montana. Pr R Ab Ar
 » varia. Pr Ar
Corrigiola telephiifolia. R Ar
Cortusa Matthioli. R O
 » grandiflora. R O
 » pubens. R O
Corydalis australis. R
 » bulbosa (cava). O Sous-bois.
 » cheilanthifolia. /// N
 » glauca. O
 » lutea. /// R
 » ochroleuca. /// R
 » ophiocarpa. O Env
 » rupestris. ///
 » sibirica R
 » thalictrifolia. R
 » tuberosa. O Sous-bois.
Cotoneaster adpressa.
 » applanata
 » congesta.
 » Davidiana (horizontalis). Ab
 » Franchetti.
 » frigida.
 » humifusa.
 » moupinensis.
 » pannosa.
 » prostrata.
 » rupestris.
 » thymifolia.
 » vulgaris.
 Excellents arbustes pour rocailles, re-
 cherchés des abeilles.
Cotyledon (Umbilicus) chrysanthus. R///
 » libanoticus. ///
 » oppositifolius. R ///
 » Pestalozza ///

Cotyledon platyphyllus. ///
 » sempervivum (Sedum semp.). ///
 » umbilicus. ///
Crambe cordifolia. V
 » maritima. V
Crepis aurea. R H
 » blattaroides. R
 » pygmæa R /// (Pyrén)
Crocus vernus. Pr R
Crucianella stylosa. R Bord
 » carmine.
Crythmum maritimum. R
Cuphæa miniata.
Cupressus glabra (Arizonica). Le plus ré-
 sistant des cyprès.
Cyclamen Atkinsii. R
 » Balearicum (vrai). R
 » Coum type. Pr O
 » var. à fl. blanches et roses.
 » europæum. R
 » album.
 » hederæfolium. R
 » album.
 » ibericum. R
 » latifolium. R
 » Rohlsianum. R (Cyrénaïque).
Cypripedium Calceolus. O
Cystopteris bulbifera (Bullilles)
Cytisus albus.
 » argenteus.
 » capitatus.
 » caramanicus.
 » hirsutus.
 » nigricans.
 » purpureus.
 » radiatus.
 » scoparius (Sarthamnus scoparius)
 Tous ces Cytises nains sont
 d'entre les meilleurs arbustes pour
 rochers et jardins pittoresques.
 On les obtient facilement et rapi-
 dement par semis au soleil.
Daphne alpina.
 » buxifolia.
 » caucasica.
 » cneorum.
 » Gnidium.
 » Laureola.
 » mezereum.
 » à fl. blanches.
 » oleoides.
 » Philippi.
 » pseudo-mezereum (luteum).
 » striata.
Delphinium Belladonna. + V
 » cachemirianum. R

Delphinium coelestris. V R

- » chinense. Superbe, à fl. d'un bleu très pur. **R + V**
- » elatum (type). **R**
- » formosum. **V +**
- » » coelestinum.
- » grandiflorum. **R V +**
- » » var. album.
- » » var. azureum.
- » » var. Tom Thumb.

Le *D. grandifl.* est l'une des meilleures plantes pour nos jardins; il donne tout l'été des fl. d'un bleu superbe et ne s'élève pas à plus de 50 centimètres. Semis faciles.

- » hybridum, mélange des meilleures variétés. Excellentes pl., robustes et florifères, donnent les plus beaux tons bleu pur plus ou moins vifs, plus ou moins violacés; très faciles à élever et se développant rapidement.
- » hybridum à fl. doubles (mélange).
- » » H. Correvon (à fl. jaune paille).
- » Mœhreimi. **V**
- » nudicaule. **R**
- » sulfureum (Zalil). **R V**
- » superbissimum. **V**

Dentaria bulbifera. R (bullilles).

- » digitata. **R** Sous-bois.
- » pinnata. **R** Sous-bois.
- » savensis. **R**

Dianthus acaulis. R /// (D. frigidus).

- » alpinus. **R ///**
- » arenarius. **R**
- » armeria. **R** Sous-bois. **Ar**
- » arvernensis. **R Bord ///**
- » asper **R**
- » Bannaticus. **R**
- » barbatus (Œillet des poètes). **+**
- » brevicaulis. **R**
- » cæsius. **R**
- » » var grandiflorus.
- » capitatus. **R Ar**
- » Caryophyllus. **V +**
- » » Œillet marguerite. **V +**
- » » Œillet des jardins à fl. doubles.
- » » Œillets des jardins à fl. jaunes doubles.
- » » Œillets Chabaud variés.
- » carthusianorum. **Pr R**
- » chinensis. **V +**
- » » laciniatus. **+**

Dianthus ciliatus. R

- » collinus. **R**
- » crinitus. **R**
- » cruentus. **R**
- » Cyri. **R**
- » deltoïdes. **R Pr Ar Bord**
- » » albus.
- » dentosus. **R**
- » » superbus.
- » diadematus. **R**
- » diffusus. **R**
- » Freynii. **π**
- » furcatus. **R (Alpes-Marit.).**
- » gallicus (vrai), délicieusement parfumé. **R ///**
- » gelidus. **///**
- » giganteus. **R**
- » glacialis. **π**
- » Holtzeri. **R**
- » integer. **R**
- » Kamtschaticus. **R ///**
- » Liboschitzianus. **R**
- » Liburnicus. **R**
- » microlepis. **π**
- » monspessulanus. **Pr R**
- » purpureus (**Pyren.**)
- » neglectus. **/// R**
- » paucicalyx. **R**
- » petræus. **R**
- » Plumarius.

L'une des meilleures pl. à bordure et aussi l'une de celles qui garnissent le mieux les rocs, les sommets des murs, les pentes arides au soleil; flor. prolongée et abondante; fl. très odorantes.

- » Plumarius var. bicolor, candidus, floribundus, grandiflorus, hortensis, laciniatus, lilacinus, robustus, suaveolens, zonatus.

Ces variétés d'œillets rampants sont excellentes pour former des bordures, garnir des talus secs et le sommet des murs.

- » Plumarius var. Cyclope (très grandes fl.).
- » prolifer. **R**
- » puberulus. **R**
- » pungens. **R**
- » pyridicola. **/// R**
- » Requièni. **R**
- » rupicola. **R**
- » Seguièri. **R**
- » speciosus. **R Pr (Bernina).**
- » spinosus. **R ///**
- » stelleris. **O**

Dianthus strictus. R

- » subacaulis. /// R (du Ventoux).
- » subcaulescens. R
- » subfastigiatus. R
- » subneglectus. R
- » superbus. R ½ O Pr
- » var. albus.
- » var. nanus.

- » Sternbergi. R
- » sylvestris. R Pr Ar
- » vaginatus. ///
- » Velenasky. R
- » versicolor. R
- » viscidus. R
- » Warleyensis. R
- » Wimmeri. R

Dichondra repens. R

Dictamnus albus. V R

- » Fraxinella. V R

Digitalis ferruginea. R

- » grandiflora. R Med
- » lævigata. R
- » lanata. R
- » lutea. R Ar Pr
- » ochroleuca. R
- » orientalis. R
- » parviflora. R Ar
- » purpurea. V Med
- » à fl. blanches.

Les Digitales sont des plantes solides, à flor. prolongée; culture très facile.

Dimorphoteca aurantiaca. O

Dioscoræa caucasica. Gr O

- » pyrenaica. R (Pyrén)

Diotis candidissima. R ^

Dodecatheon giganteum. R

- » Jeffrayi. R
- » Mædia. R

Doronicum carpetanum. R

- » caucasicum R
- » corsicum. R
- » excelsum. V +
- » Pardalianches. R

Doryenium herbaceum. R

- » suffructuosum. R

Draba affinis, aizoides, alpina, altaica, armata, athoa, aurea, Bertholoni, borealis, bronchialis, bruniifolia, carinthiaca, chamaejasme, contorta, corsica, cuspidata, Dedeana, diversifolia, glacialis, Gygas, Haynaldi, hirta, hispanica, incana, Johannis, Kotschyi, lactea, laponica, lasiocarpa, laxa, Loiseleurii, longirostpa, magellanica, nivalis,

olympica, pycnosperma, repens, rupestris, Salomoni, Scandinavica, stellata, streptocarpa, subamplexicaulis, Thomaii, Traunsteineri, tridentata, vesicaria, Zahlbrückneri.

Draba frigida. /// π

- » oxycarpa. /// π
- » pyrenata. /// π
- » rigida. /// π
- » scabra. /// π

Les Draves sont des plantes rasées et touffues, fleurissant au premier printemps, propres à animer les fissures des rochers et les murs.

Dracocephalum austriacum. R

- » bullatum. R
- » botryoides. R
- » nutans. R
- » Ruprechtii. R
- » Ruyschianum. R
- » speciosum. R
- » thymifolium. R

Dracunculus vulgaris. R s

Drosera longifolia. Sp Med

Dryas Drummondii. R s

- » integrifolia. π
- » lanata. R s
- » octopetala. R s

L'une des plus gracieuses plantes tapissantes pour rochers, grandes fl. blanches; semis facile.

- » octopetala minor. R s

- » tenella. π

Echinocactus minuscule. Cactée rustique.

Echinopsis multiceps. Cactée rustique.

Echinops niveus. V Ar

- » Ritro. V + Ar (du Dauphiné).
- » sphærocephalus. Ar

Echium petraeum (Lithorp petr.). +//

- » rubrum. R
- » simplex (des Canaries). ^
- » Wildpretii (des Canaries). ^

Edelweiss (voir Leontopodium).

Edrayanthus bosniacus. ///

- » caricinus. ///
- » caudatus. ///
- » croaticus. /// R
- » dalmaticus. /// R
- » dinaricus. ///
- » graminifolius. /// R
- » Kitaibeli. /// R
- » Pumilis. ///
- » serpyllifolius. /// R
- » tenuifolius. /// R

Empetrum nigrum. T R

- Ephedra altissima*. **R s**
 » *Helvetica* **S Ar**
 L'une des pl. les plus curieuses
 de la flore alpine.
Epilobium alpinum. **/// N**
 » *angustifolium*. **O R Ar Env**
 » *Fleischeri*. **///**
 » *glabellum*. **/// N**
 » *Hectori*. **R**
 » *hirsutum*. **H**
 » » à fl. blanches.
 » *Linnæoides*. **R**
 » *origanifolium*. **R N**
 » *pubens*. **R N**
 » *rosmarinifolium*. **R Ar**
Eranthis cilicica. **R**
 » *hiemalis*. **Pr R**
Eremostachys laciniata. **V**
Eremurus altaicus.
 » *Bungei*.
 » *Elwesianus*.
 » *Himalaicus*.
 » *Him-robustus*.
 » *indensis*.
 » *Kaufmanniam*
 » *robustus*.
 » *Tubergeni*.
 » *Warei*.
Erica carnea. **R s**
 » *ciliaris*. **T**
 » *cinerea*. **T**
 » *stricta*. **R S Ar**
 » *vulgaris* (*Calluna*). **R s**
Erigeron alpinus. **R**
 » *aurantiacus*. **R**
 » » *hybridus*. **R**
 » *caucasicus*. **R**
 » *cilicicus*. **R**
 » *compositus*. **R**
 » *elatio*. **V**
 » *flagellaris*. **R Bord Ar**
 » *galatelloides*.
 » *glabellus*. **R Bord**
 Très voisin de l'Aster des Alpes.
 » *hybridus*. **R**
 » *leiomerus*. **R ///**
 » *macranthus*. **R**
 » *oreganum*. **R**
 » *Philadelphicus*. **R V +**
 » *polymorphus*. **R**
 » *pulchellus*. **R**
 » *speciosus*.
 Excellente plante vivace, à
 grands capitules lilas foncé autour
 d'un disque d'or; juin-automne.
 » *trifidus*. **R**

- Erigeron uniflorus*. **R**
Erinacea pungens. **R s**
Erinus alpinus. **/// R**
 » à fl. blanches. **/// R**
 » à fl. carmin vif. **/// R**
 » *hirsutus*. **/// R**
 » à fl. blanches. **/// R**
 » *hispanicus*.
 » *roseus*.
Eriogonum arboreum. **R**
 » *Jamesi*. **R**
 » *flavum*. **R**
 » *racemosum*. **R**
 » *umbellatum*. **R**
Eriophorum angustifolium. **H T**
 » *Scheuchzeri*. **H T**
 » *vaginatum*. **H T**
Eriophyllum cæspitosum. **R /// Ar**
Eritrichium nanum (Roi de l'Alpe). **/// T**
 » à fl. blanches.
Erodium amanum. **R ///**
 » *cheilanthifolium*. **R ///**
 » *chrysanthum*. **R ///**
 » *Crispii*. **R ///**
 » *daucoides*. **R**
 » *Gruinum*. **R O**
 » *Guicciardi*. **R**
 » *hymenoides*. **R ///**
 » *macradenum*. **R ///**
 » *Manescavi*. $\frac{1}{2}$ **O**
 Bonne pl. de roc. fleurissant
 tout l'été et l'automne.
 » *Olympicum*. **R**
 » *Romanum*. **R**
Eryngium alpinum (*Panicaut* ou *Chardon*
bleu des Alpes). **R V Pr +**
 » *amethystinum*. **R**
 » *Bourgati* (*Le superbe chardon bleu*
des Pyrénées). **R Pr +**
 » *cæruleum* (*chardon bleu grec*). **+ Ar V**
 » *Davosianum*.
 » *Florariensis*. **R V +**
 » *giganteum* (*chardon bleu du Cau-*
case). **R Ar Pr +**
 » *hybridum*. **V R**
 » *maritimum*. **R V +**
 » *Olivierianum*. **V**
 » *planum* (*chardon bleu de l'Atlas*). **Ar V**
 » *serbicum* (vrai). **R V +**
 » *Spinalba* (du Mt-Ventoux). **R Ar**
 » *violaceum*. **V +**
 » *yuccaefolium*. **V**
Erysimum Allionii (*Cheiranthus*). **V R**
 + **Ar**

Plante excellente à floraison prolongée. Fl. orangé très vif; parfum suave; culture extra-facile.

Erysimum cheiranthoides. Ar

- » **Helveticum. Ar**
- » **Kotschyannum. ///**
- » **nanum. R ///** **Ar**
- » **ochroleucum. R**
- » **pachycarpum. ///**
- » **pulchellum. R**
- » **purpureum. R ///**
- » **Rhæticum. Ar**
- » **rupestre. ///**

Erythraea centaurea. Pr Med

- » **diffusa.**
- » **gothica. T**
- » **linarifolia. T**
- » **littoralis. T**
- » **ramosissima. T**
- » **Rumelica. T**

Eschscholzia aurantiaca. B Ar +

Plante semi-vivace naine qui se resème d'elle-même avec abondance et donne toute l'année et jusqu'en hiver de grandes fl. de pavots d'un orangé très vif.

Eschscholzia à fl. blanches, à fl. roses, à fl. carmin, à fl. jaunes pâle, etc. en coul. sépar. ou en mélange.

Eupatorium ageratoides. V +

- » **verticillatum. V**

Euphorbia altissima. R Ar

- » **chamaecysa. Ar**
- » **Dendroides. ^**
- » **Girardiana. R**
- » **Lathyris. R Med**
- » **Myrsinites. ///** **R**
- » **robusta. Ar**
- » **spinosa. R ///** **Ar**

Euphrasia lutea. R

- » **montana. Med**
- » **officinalis. Med**

Falcaria Rinini. Ar Pr

Falkia repens. /// **^**

Farsetia eriocarpa. R Ar

Ferula communis. V

- » **glauca. V**

Grandes ombellifères au feuillage finement divisé et décoratives.

Festuca crinum-ursi. Bord R Ar

Fœniculum vulgare (Fenouil).

Fragaria indica. R Sous-bois.

Fragaria roseiflora. R

Francoa appendiculata. R

Fritillaria askabadensis. R

Fritillaria delphinensis. R Pr

- » **imperialis. V**
- » **Meleagris. R Pr**
- » **pyrenaica. R**

Funkia cœrulea. O

- » **cordata. O**

Gagea Liotardi. R

Galega officinalis. Pr Ar V

Gaillardia grandiflora. V +

Belle plante vivace à très grandes fl. de soleil, rouge et jaune; grand effet; culture facile (juil.-déc.).

Gaillardia sanguinea. La même à fl. rouge très vif.

Galium purpureum. Très précieuse plante d'ornement pour rochers et jardins alpins; gazon fin, fl. d'un brun noir. **R Pr Ar ///**

- » **verum. Pr**

Galatella incana. V +

Galtonia candicans (Jacinthe du Cap). **V**

Gaura Lindheimeri. V Ab +

Plante vivace à longs épis rose chair, excellente pour la fleur coupée; juin-novembre.

Gaya simplex. R

Genista andreana (fl. rouge et jaune).

- » **anxantina.**
- » **germanica.**
- » **horrida. (Pyrén).**
- » **junceæ.**

Le brillant Genêt jaune d'Espagne, l'un de nos meilleurs et plus solides arbustes.

- » **prostrata. R ///**
- » **radiata. Ar R**
- » **sagittalis. Pr R Ar**
- » **tinctoria. Ar**

Tous ces Genêts sont excellents pour garnir les rocailles au soleil. Floraison prolongée, plantes solides.

Gentiana acaulis.

L'une des meilleures plantes des Alpes; germination lente, mais sûre. **R Pr Bord**

- » **alpina** (vrai). **R π**
- » **angulosa. T R Sp**
- » **angustifolia. R Bord**
- » **asclepiadea. H ½ O**
- » » à fleurs blanches.
- » **bavarica. T Sp π** Du plus beau bleu qui existe.
- » **brachyphilla. T R π**
- » **bracteosa. Sp**

Gentiana campestris. Pr O

- » Clusii. **R**
- » crassicaule. **R**
- » cruciata. **Pr R**
- » dahurica. **R Pr**
- » decumbens. **R**
- » depressa. **R**
- » Dinarica. **R**
- » excisa. **R Pr**
- » Favrati. **R π**
- » Fetisowii. **R**
- » Freyniana. **R T π**
- » frigida. **R T π**
- » Gentianella (Hort. Ang.). **R Bord**
- » germanica. **O Pr**
- » glomerata. **R**
- » Grombezewskiyi. **R**
- » hybrida (straminea × Kesseler.). **R**
- » imbricata. **T Sp**
- » Kesselringii. **R**
- » Kochiana. **R T**
- » Lagodechiana. **R T**
- » lutea. **R Med Pr**
- » macrophylla. **R**
- » Moorcroftiana. **R**
- » nivalis. **T O**
- » Olivieri. **R**
- » pannonica. **T**
- » parryi. **R**
- » phlogifolia. **R**
- » Pneumonanthe. **T H**
- » Przewalskii. **R**
- » punctata. **T R**
- » purpurea. **T R**
- » var. nana.
- » Rocheliana. **R**
- » Sceptum. **T**
- » schistocalyx. **R**
- » septemfida (très belle et facile). **R**
- H T**
- » septemfida cordifolia.
- » latifolia.
- » straminea. **R**
- » tenella. **Pr T O**
- » Tibetica. **R**
- » Tshiantanica. **R**
- » uliginosa. **O**
- » utriculosa. **O**
- » verna. **R T Pr**
- » à fl. blanches.
- » grandiflora.
- » Walujéwi. **R**

Geranium aconitifolium (rivulare). R

- » albiflorum. **R**
- » armænum. **R**
- » cinereum. **R ///**

Geranium Endresii. R Env Sous-bois.

- » Fremonti. **R**
- » grandiflorum. **R Env**
- » ibericum. **R V**
- » macrorhizum. **R O Sous-bois.**
- » maculatum. **R**
- » nodosum. **H R**
- » phæum. **Pr R**
- » platypetalum. **R**
- » platyanthum. **R**
- » pratense. **R Pr Ab**

Excellente plante pour rochers et plates-bandes, fleurissant tout l'été; germe de suite et produit la même année ses belles fleurs bleu violet foncé.

- » Richardsoni. **R**
- » sanguineum. **R Ar**
- » à fl. blanches. **R**
- » sessiflorum. **R**
- » sylvaticum. **R Sous-bois**
- » tuberosum. **R**

Gerbera Jamesoni. ~ + s

Geum atrosanguineum. R H Pr +

- » bulgaricum. **H**
- » chilense (à fl. rouge très vif).
- » coccineum (*idem*). **V + R**
- » grandiflorum. **H R +**
- » à fl. doubles.

» Florariense. Pl. basse, à fl. jaune brillant et sépales bruns (mai-novembre).

- » Heldreichii. **R**
- » heterocarpum. **R**
- » intermedium. **H**
- » macrophyllum. **R**
- » montanum. **R Pr**
- » aurantiacum.
- » hybridum.
- » maximum.

- » M^{rs} Bradschaw. **R**
- » pyrenaicum. **R Pr**
- » reptans. **/// R**
- » Rhæticum. **/// R**
- » rivale. **H**

- » grandiflorum.
- » sibiricum. **R**
- » tyrolense. **R ///**

Gillia coronopifolia. ||

Gillenia trifoliata. V H +

L'une des meilleures et des plus florifères d'entre les plantes vivaces d'ornement; fl. blanc rosé, gracieusement suspendues sur tiges rouge brun (mai-septembre).

- » stipulacea. **V H**

Gladiolus palustris. H

Glaucium cappadocicum. R

- » **corniculatum. R**
- » **luteum. V R Ar**
- » **rubrum. V A**
- » **tricolor. V R Ar**
- » **grandiflorum.**

Pavots marins, au feuillage argenté, avec fl. jaunes ou rouges, à semer sur des grèves, dans des lieux arides et à planter dans les lieux pittoresques.

Globularia Alypum. ///

- » **cordifolia. /// R Ar Bord**
- » **nana. /// R Ar**
- » **nudicaulis. R Bord**
- » **trychosantha. R /// Ar**
- » **vulgaris. R Ar**

Glossocomia Clematidea. R

Gnaphalium Leontopodium. R

- » **supinum. R**

Goodenia (Selliera) repens. H

Grenovia aurea (des Canaries). ^

Grindelia robusta. + V

Gutierrezia Euthamiae. R V

Gymnadenia conopea. R

Gymnolomia multiflora. R V

Gypsophila alpicola. R ///

- » **altissima.**
- » **cerastioides. ///**
- » **libanotica. R**
- » **paniculata. V + Ar**
- » **compacta.**
- » **repens. R /// Ar**
- » **var. major.**
- » **Rokejeka. R**
- » **scorzoneræfolia. V Ar**
- » **transylvanica. R**
- » **trichotoma. R**

Haberba Rhodopensis. /// N

- » **Ferdinand-Coburgi. /// N**

**Hacquetia Epipactis. O Sous-bois (Don-
dia Ep.).**

Happlocarpha Leichtlini. R

Hedysarum obscurum. R

Helenium autumnale. V Ab

- » **Hoopesi. V +**
- » **pumilum magnificum. V +**
- Helianthella quinque-nervis. V +**
- » **uniflora. V +**

Helianthemum alpestre (jaune).

- » **amabile (carmin).**
- » **apenninum (blanc).**
- » **atrosanguineum (rouge vif).**
- » **aurora (saumon).**
- » **bicolor (jaune et rouge)**

Helianthemum canum (jaune).

- » **coccineum (rouge ardent).**
- » **cruentum (rouge vif).**
- » **cupreum (cuivré).**
- » **Fumana (jaune).**
- » **grandiflorum (jaune). Pr**
- » **mutabile (changeant).**
- » **polyfolium (blanc).**
- » **procumbens (jaune).**
- » **rhodanthum (rougeâtre).**
- » **roseum (rose clair).**
- » **sulfureum (jaune clair).**
- » **vulgare (jaune). Pr**

Ce sont des pl. à gracieux feuell. persistant, aux fl. nombreuses, se succédant presque toute l'année quand on a soin de couper les tiges après la fleur; culture très facile. Pl. naines et touffues, excellentes pour les rochers et talus arides. Lèvent facilement et rapidement. Excellentes p^r bordures.

Helichrysum anatolicum. R S

- » **augustifolium. R S**
- » **diosmaefolium.**
- » **lanatum. R S**
- » **odoratum. R S**
- » **Stœkas. R S ///**

Heliopsis lævis. V +

- » **scabra. V +**
- » **« Soleil d'or ». V +**

Grandes pl. à fl. jaune vif, ornementales, solides et d'entre les meilleures pour la fleur coupée.

Heliotropium europæum. O

Helleborus colchicum. R O

- » **corsicus. R**
- » **fœtidus. R Ar Sous-bois.**
- » **niger (Rose de Noël). ½ O**
- » **occidentalis. R (Pyrén).**
- » **orientalis. R ½ O**
- » **viridis. R O**

Heracleum giganteum. V

- » **Mantegazzianum.**

L'une des meilleures plantes mellifères; formes gigantesques; belle pl. à isoler ou à semer dans les lieux ombragés et humides.

V H O Ab

- » **pyrenaicum. V (Pyrén)**

Herniaria glabra.

L'H. glabra est la meilleure pl. tapissante pour garnir les lieux secs et arides, en plein soleil, les sols maigres et stériles, qu'elle recouvre rapidement.

Hesperis matronalis (*Giroflée vivace*). **Ab**
 » » var. *candidissima*. **V +**
Heuchera purpurescens. **O**
 » *rubescens*. **O**
 » *sanguinea*. **R +**
 » » *alba*.
 » » *grandiflora*.
 » » *maxima*.
 » » *rosea*.
 » » *splendens*.
 » » *Zabeli*. **+**
Hibiscus militaris. **V**
 » *palustris*. **V**
 » *roseus*. **V**
Hieracium albidum. **R ///**
 » *aurantiacum*. **R Pr Ar**
 » *lanatum*. **R ///** **S**
 » *pilosella*. **Ar**
 » » *rubra*.
 » *rubrum*. **R**
 » *stoloniflorum*. **R Pr Ar**
Hippocrepis comosa. **R**
Homogyne alpina. **R O**
Horminum pyrenaicum. **R O**
Houstonia cœrulea. **T Sp**
Hugueninia tanacetifolia. **R O**
Hutchinsia alpina. **/// N**
 » *Auerswaldi*. **/// N**
 » *brevicaulis*. **/// N**
Hylomecon vernale. **O**
Hyoscyamus niger (*Jusquiame*). **Med**
Hypericum Androsæmum. **R Sous-bois**.
 » *aureum*. **Arb**
 » *Balearicum*. **Arb** **~**
 » *Coris*. **/// R s Ar**
 » *elongatum*. **R**
 » *empetrifolium*. **R**
 » *fragile*. **/// R**
 » *Henryi*. **R**
 » *hircinum*. **Ar R**
 » *Hookeri*. **R**
 » *hyssopifolium*. **R**
 » *Kalmianum*. **Arb**
 » *Kotschyanum*. **/// R**
 » *linarifolium*. **R T**
 » *montanum*. **R**
 » *nummulariæfolium*. **/// R (Pyrén.)**
 » *Olympicum*. **R ///** **Ar**
 » *Oriente*. **R**
 » *origanifolium*. **/// R**
 » *patulum*. **Arb R Ar**
 » *perforatum* (*Millepertuis*). **Med**
Pr Ar
 » *poliphyllum*.
 » *prolificum*. **Arb**
 » *przewalskyi*.

Hypericum ptarmicæfolium. **R ///** **Pr**
 » *pulchrum*. **R**
 » *repens*. **Bord ///** **Ar**
 » *rhodopeum*. **R**
 » *rumelicum*. **R**
 » *tomentosum*. **R**
 » *transylvanicum*. **R**
Hypochæris Helvetica. **R Pr**
Hyssopus officinalis. **R Med Ab Ar**
 » » à fl. blanches.
 » » à fl. rouges.
 » *aristatus*. **R Ab**
 » *sibiricus*. **R Ab**
Iberis gibraltarica. **R Ab**
 » *Garrexianna*. **R Ar**
 » *Jordani*. **R**
 » *jucunda*. **/// R**
 » *saxatilis*. **/// R**
 » *sempervirens*. **R ///** **Ab Ar**
 » » *nana*.
 » *spatulata*. **R ///** **(Pyrén)**
 » *Taurica*. **/// Ab Ar**
Impatiens glanduligera. **O H Ab Sous-bois**.
 » *noli tangere*. **H O Sous-bois**.
Imperatoria angustifolia. **R O Med**
 » *Ostruthium*. **R H O Med**
Incarvillea Delavayi.
 (*Gloxinia vivace*). L'une des
 meilleures plantes vivaces d'or-
 nements que nous ait fourni l'Asie;
 s'élève facilement de semis.
 » *grandiflora*. **R V**
 » *Olga*. **V R**
 » *variabilis*. **O**
Inula ensifolia. **R Bord Ar**
 » *glandulosa*. **V + R**
 » » *grandiflora*.
 » *Helenium* (aunée). **Med**
 Plante officinale stomachique
 de grande valeur, appréciée déjà
 des Romains; belle plante d'or-
 nement.
 » *limonifolia*. **R s**
 » *hirta*. **V Ar**
 » *macrocephala*. **V**
 » *Royleana*. **R V +**
Ipomæa Pandurata. **Gr**
Iris albida. **R**
 » *chamaeiris*. **R**
 » *chrysographis*. **R**
 » *Clarkei*. **R**
 » *ensata*. **R**
 » *Forresti*. **R**
 » *fetidissima*. **O R Sous-bois**.
 » *gigantea*. **R**
 » *Guldenstædtiana*. **V**

Iris imbricata. R
 » **Junionana. R**
 » **lævigata (Kœmpferi). H V**
 » **musulmanica. R**
 » **ochraurea.**
 » **prismatica. R**
 » **pseudo-Acorus. H Aq**
 » **pumila. R**
 » **pyrenaica. R (Pyrén)**
 » **sibirica. H V R**
 » **» alba.**
 » **sisyrinchium. R**
 » **stenogyna. V**
 » **stylosa. V**
 » **versicolor. R**
 » **virginica. R**
Isatis alpina vera. R
 » **tinctoria. Ar**
Isopyrum thalictroides. O
Jasione humilis. R
 » **montana. R**
 » **perennis. R**
Jeffersonia diphylla. O
Juniperus Cedrus (Pic Ténériffe).
 » **nana. Arb Ar**
 » **Sabina. Arb Ar**
Kernera saxatilis (Cochlearia sax.). /// R
Knautia arvensis.
Kniphofia (Tritoma).
 » **caulescens (Trit. en arbre).**
 » **grandiflora.**
 » **hybrida.**
 » **Tuckii.**
Lactuca perennis. R Ar ///
 » **» alba.**
Laserpitium gallicum. R Ar
 » **halleri. R Ar Pr**
 » **latifolium. R Ar**
 » **siler. R Ar**
Lathyrus grandiflorus. V Gr
 » **incurvus. R V Env**
 » **latifolius. V + Ar**
 » **» alba.**
 » **maritimus. R**
 » **odoratus.**
 (Pois de senteur); variétés en-
 glaises en mélange.
 » **pyrenaicus. R Env (Pyrén)**
 » **sylvestris. Ar**
Laurentia tenella. H R T Sp
Lavandula delphinensis. R Med Ab Ar Bord
 » **officinalis. R Bord Med Ab Ar**
 » **» alba.**
 » **spica. R**
 » **Stockas. R**

Les Lavandes sont l'une des

pl. aromatiques les plus appré-
 ciées pour parfumer les demeures.
 Semis facile.
Lavatera maritima. ~
**Leontopodium alpinum (Etoile du gla-
 cier.).**
 Semer dans un sol léger et tenir
 plutôt sec; repiquer jeune et cul-
 tiver au soleil et dans sol calcaire.
 Diviser tous les deux ans.
 » **altaicum.**
 » **Aragonense. (Pyrén)**
 » **Himalayense.**
 » **japonicum.**
 » **Lindavicum.**
 » **sibiricum.**
 » **transylvanicum.**
 » **tibeticum.**
Lepidium stylatum. V
Levistichum officinale. V Med
 Plante usitée dans les monta-
 gnes pour la guérison des mala-
 dies de poitrine; très efficace.
Liatris graminifolia. V +
 » **scariosa. V +**
 » **spicata. V +**
Ligularia sibirica. V R
Lilium croceum. V R
 » **Martagon, Sous-bois. O Pr**
 » **» album.**
 » **pyrenaicum. O**
Linaria alpina. R ///
 » **» alba.**
 » **» rosea.**
 » **anatolica. R**
 » **bipartita elegans. O**
 » **cilicica. Env**
 » **cymbalaria. /// O**
 » **» alba.**
 » **dalmatica. R Ar Ab**
 » **genistifolia. R Ar**
 » **italica. R Ar**
 » **macedonica. R Ar**
 » **maroccana hybrida. O**
 » **Nyssana. R**
 » **origanifolia. /// R**
 » **pallida. /// R**
 » **Pancicii. R**
 » **pilosa. ///**
 » **purpurea. R Ar Ab**
 » **reticulata caureo-purpurea. O**
 » **striata. Ar Ab**
 » **supina. R**
 » **triornitophora. /// T R**
 » **tristis. R**
Lindelofia spectabilis. R

Linum alpinum. R ///

- » **austriacum. R ///**
- » **campanulatum. R**
- » **catharticum. O**
- » **collinum. R**
- » **extra axillare. R**
- » **flavum. R ///** **Pr Ar Ab**
- » **grandiflorum (à fl. rouge vif). O**
- » **Lewisii. R**
- » **hirsutum. ///** **R**
- » **maritimum. R**
- » **narbonense. R +**
- » **nervosum. R**
- » **perenne (sibiricum). V R Ar Pr**
- » **à fl. blanches.**
- » **sibiricum. R Ar Pr**
- » **salsoloides. ///** **R**
- » **tenuifolium. ///** (à fl. roses)
- » **usitatissimum. (Le lin bleu des champs.)**

Lithospermum Fræbeli. R

- » **graminifolium. ///** **R**
- » **intermedium. ///** **R**
- » **latifolium. R**
- » **oleoides. ///**
- » **petraeum (Echium). ///** **R**
- » **à fl. roses.**
- » **purpureo-ceruleum. S.-bois. O R**

Les lith. gramin., interm. et petraeum fleurissent abondamment l'été et donnent aux rochers ensoleillés une valeur artistique de premier ordre (bleu et rose).

Lloydia serotina. T R

Lobelia cardinalis (vrai). H

- » **erinus. O**
- » **fulgens. V**
- » **Gerardiana. V**
- » **inflata. R**
- » **Kamtschatica. R**
- » **linnæoides. T**
- » **speciosa. R**
- » **syphilitica. H R Sous-bois.**
- » **alba.**
- » **rosea.**
- » **tupa. H**
- » **urens. T R**

Lonicera alpigena. O

- » **cœrulea. O**
- » **nigra. O**
- » **pyrenaica. R ///** (Pyrén)
- » **tibetica. R Arbustes de rochers.**

Lunaria rediviva. O, Sous-bois.

Lotus corniculatus. Pr

Lupinus poliphyllus.

- » **albus.**

Lupinus poliphyllus Moerheimii.

Les Lupins sont excellents pour la décoration de plates-bandes et jardins. Très parfumées, très abondantes, leurs fl. sont l'un des ornements les plus recommandables pour l'amateur qui aime la Beauté. Culture très facile, surtout dans les sols siliceux.

Luzula albida. O Sous-bois.

- » **nivea (idem).**
- » **sylvatica (idem).**

Lychnis alpina. R

- » **alba.**
- » **chalconica. V (Croix de Malte).**
- » **alba.**
- » **Delevayi. R V**
- » **flos cuculi. H Pr**
- » **flos Jovis. R**
- » **alba.**
- » **fulgens. R V +**
- » **Haageama. R V**
- » **Lagascæ. ///**
- » **viscaria. R Pr**
- » **alba.**
- » **splendens.**

Lynosiris vulgaris. R + Ar Ab

Lysimachia acrodonia. H

- » **atropurpurea. R Pr**
- » **clethroides. H**
- » **dahurica. H**
- » **Delavayi. V R**
- » **dubia. H**
- » **ephemerum. H Aq**
- » **histriangensis. R**
- » **thyrsiflora. H Aq**
- » **verticillata. H V Sous-bois. Pr**
- » **violacea. H**
- » **vulgaris. Aq H**

Lythrum Salicaria. H Aq Ab

- » **virgatum. H Ab**

Malaxis monophyllus. H Orchid.

Malva Alcea. R Pr Ar

- » **crispa. Med**
- » **moschata. R Pr Ar**
- » **alba.**
- » **sylvestris. (Mauve) Med**

Malvastrum capense. ^

Mandragora officinalis. R Med

Margyricarpus setosus. R Arb

Marrubium candidissimum. R s

- » **sericeum. R**
- » **spinulosum. R**

Matthiola fenestralis. R ^

- » **incana, variétés (giroflée).**
- » **pedemontana. R ///** **Ar**

Matthiola rupestris. R
 » **sinuata.** R
 » **tricuspidata.** R
 » **tristis.** /// R Ar
 » **valesiaca.** /// R Ar
Matricaria officinalis (Matricaire). Med V
Mayanthemum bifolium. O
 » **canadense.** O
Mazus rugosus. H T V
Meconopsis cambrica. O (Pyrén)
 » **aurantiaca.**
 » **fl. pl.**
 » **integrifolia.** O
 » **nepalensis.** O
 » **paniculata.** O
 » **petiolata.** O
 » **Prattii.** O
 » **rudis.** O
 » **sinuata latifolia.** O
 » **Wallichiana.** O
Medicago Echinus. R
Melandrium rubrum. Pr R
Melica altissima. O
 » **atrosanguinea.** R +
Melilotus albus.
 » **officinalis.**
 Pl. médicinales et surtout mellifères de grande valeur.
Melissa officinalis (Mélisse). Med Ab
Melittis Melyssophyllum. R O Sous-bois.
Mentha Gibraltaria. R Med
 » **Pulegium.** Med
 » **Piperita.** Med
Menyanthes trifoliata (Trèfle d'eau).
Merendera Bulbocodium. R
Mertensia cillata. R ½ O
 » **oblongifolia.** R ½ O
 » **paniculata (sibirica).** R ½ O
 » **primuloides.** R ½ O
Mesembrianthemum cristallinum (glaciale).
Meum athamanticum. Pr Med R
 » **Mutellinum.** R ///
Michauxia campanuloides. R ||
Micromeria rupestris. R ///
 » **piperella.** ///
Mimulus cardinalis. H
 » **alsinoides.** H
 » **luteus.** H
 Excellente pl. à naturaliser sur le bord des eaux et dans les lieux humides; fleurit tout l'été.
 » **var. Monarque.**
 » **moschatus** (musc). ^
 » **primuloides.** H Sp T
 » **ringens.** H R

Mitchella repens. T
Mitella pentandra. O
Mœhringia muscosa. ///
 » **papulosa.** ///
 » **pendula.** /// N
 » **polygonoides.** ///
 » **sedoides.** ///
Molospermum cicutarium. R
Monarda dydima. V +
 » **alba.**
 » **fistulosa** (thé d'Oswego). V Ab
 » **florariensis.** V +
 » **Kalmiana.** V Ab
 » **purpurea.** V +
 » **superba.** V +
Morine longifolia. R
 » **elegans.** R
Mulgedium alpinum. O Ab Sous-bois.
 » **Bourgæi.** O Ab Sous-bois.
 » **plumieri.** Ab R
Myosotis alpestris. R
 » **lithospermifolia.** R
 » **palustris.** H
 » **albus.**
 » **var. semperflorens.** II
 » **pyrenaica.** R
 » **Welwitchii.** R
Myrrhis odorata. O Pr Sous-bois.
Narcissus poeticus (Narcisse). Pr
Nardus stricta. R Ar
Nepeta lanceolata. R Ar Ab
 Pl. mellifère de premier ordre.
 » **nuda.** R Bord Ab
Nicotiana affinis. O
Nierembergia fruticosa. ^
Nigella damascana (L'amour en cage). O
Nigritella augustifolia. T π
Nuphar luteum. Aq
Nymphæa alba. Aq
Obeliscaria columnaris. R
Ocimum Basilicum Basilic. O
Oenothera acaulis. R
 » **biennis grandiflora.** || Ar
 » **Fraseri.** V R
 » **Lamarkiana.** Ar
 » **macrocarpa** (*Missouriensis*). R V
 » **Bord**
 » **pumila.** R
 » **rosea mexicana.** R
 » **speciosa.** R V
Omphalodes cappadocica. ½ O
 » **linifolia.** O
 » **Lucilæ.** /// N
 » **nitida.** ½ O
 » **verna.** Bord
Ononis cenisia. R ///

Ononis Columnæ. **R**

» *fruticosa.* **R Arb**

» *natrix.* **R Ar**

» *rotundifolia.* **R**

Onobrychis saxatilis. **R**

Onopordon bracteatum. **Ar**

Onosma Bourgæi. **/// R Ar**

» *Cassium.* **/// R Ar**

» *echioides.* **/// R Ar**

» *Helveticum.* **/// R Ar**

» *sericea.* **/// R Ar**

» *stellatum.* **/// R Ar**

» *taurica.* **R**

Ophiopogon japonicum. **O**

Opuntia (1).

» *arkansana.*

» *Camanchica.*

» *cantabrigensis* (à formes gigantesques).

» *fulgens.*

» *gigantea.*

» *greenii.*

» *longispina.*

» *macrorrhiza.*

» *mesacantha.*

» *ophiocarpa.*

» *orbicularis.*

» *phæacantha.*

» *Raffinesquiana.*

» *rubra* (rouge vif).

» *Salmonia* (fl. rouge saumon).

» *spinacantha.*

» *vulgaris.*

» *Xanthostemma rosea.*

Origanum pulchrum. **/// R**

» *hybridum.* **///**

» *majorana* (Marjolaine)

Ornithogalum nutans. **R**

» *pyrenaicum.* **Pr O**

Orobis niger. **R O formosus. **R****

» *lathyrioides.* **R**

» *lutens.* **R Pr**

» *variegatus.* **R**

» *pyrenaicus.* **R (Pyrén)**

» *variegatus.* **R**

» *vernus.* **O**

Ostrowskya magnifica. **R**

Othonopsis cheirifolia. **R S**

Oxalis acetosella. **O**

» *atrosanguinea.* **R**

Pl. naine et tapissante au feuill.

brun foncé, propre à semer dans les lieux arides.

Oxalis cernua. **R**

» *floribunda alba.* **R**

» » *rosea.* **R**

Oxyria digyna. **/// N**

Oxytropis Baikalsensis. **R S**

» *campestris.* **R S**

» *fœtida.* **R ///**

» *Halleri.* **R S**

» *Laponica.* **R S**

» *montana.* **R ///**

» *ochroleuca.* **R S**

» *pilosa.* **R**

» *pyrenaica.* **R S (Pyrén)**

» *sordida.* **R s**

» *sulfurea.* **R S**

» *tyroleusis.* **R s**

Pæonia albiflora.

» *anomala.*

» *coralina.*

» *decora* (Romanica).

» *hybrides d'albiflora.*

» *lobata.*

» *lutea.* Pivoine arborescente, à fleur jaune vif; facile à cultiver.

» *Mlokosievitchii.*

» *officinalis.*

» *peregrina.*

» *Russi.*

» *tenuifolia.*

» *triternata.*

» *Veitchi.*

Panocratium maritimum. **R**

Panicum virgatum. **V +** Superbe graminée ornementale.

Papaver alpinum. **/// R**

» » En teintes séparées ou mél. dans les var. rouge vif, écarlate, rose, blanc pur, jaune soufre, orangé, etc. — A semer dans un sol aride et caillouteux ou en murailles; à naturaliser dans les jardins de montagnes, surtout calcaires.

» *atlanticum.* **O Ar**

» *bracteatum* (*involucratum*). **V**

» *Burseri.* **///**

» *hybridum* « Croix fédérale ».

» *Kernerii.* **///**

» *nudicaule.* **/// R +**

(1) Ces *Opuntia* sont des Cactées dont les graines lèvent facilement et qui sont rustiques à nos hivers. Il suffit dans les pays du Nord, de tenir les plantes au sec (recouvertes de plantes inclinées) pendant la mauvaise saison. Elles fleurissent abondamment l'été si l'on a soin de les planter au grand soleil. En Allemagne, on en cultive de grandes collections, sans même les recouvrir de planches. L'*O. cantabrigensis* atteint chez nous, au pied d'un mur abrité, 1^m de haut et une superbe envergure.

papaver nudicaule à fl. blanches.

- » » à fl. jaune vif.
- » » à fl. rouge cramoisi.
- » Toutes teintes mélang.

Le papaver nudicaule est l'une des plus florifères et des plus précieuses d'entre les plantes alpines ou vivaces. Il aime la fraîcheur et la mi-ombre et constitue l'un des meilleurs ornements des rochers. Fleurit tout l'été et jusqu'en hiver, très facile à cultiver; bon pour la fleur coupée. En sol rocailleux, pavéux et maigre il fait merveille. orientale. **V R**

Le pavot d'Orient est la plus éclatante de nos fleurs de pl. terre. Sa grosse corolle d'un rouge ardent fait un effet grandiose dans les jardins. Culture facile.

- » orientale hybrides, comprenant toutes les variétés obtenues jusqu'à ce jour.

» pyrenaicum. ///

» radiculatum. **R**

» Rhæticum. **R ///**

» somniferum. Le pavot à opium à gr. fl. blanc pur. **Med Ab**

» spicatum. **R**

aracarium sylvestre. R

aradisia Liliago. Pr R

» Liliastrum. Lis de St-Bruno. **Pr R**

» » major.

aris quadrifolia. O

arnassia alpina. T

» asarifolia. **T**

» mysorensis. **T R**

» palustris. **T H R**

aronychia argentea. R ///

» Kapellae. **R**

» serpyllifolia. **R ///** (**Pyren**)

arochetus communis. ~

arrya Menziesii. R

» microcarpa. **R**

atrinia heterophylla. R

» intermedia. **R**

» rupestris. **R V**

edicularis atrorubens. T

» cenisia. **T**

» folissa.

» palustris. **T**

» pyrenaica. **T**

» recutita. **T**

» retroflexa. **T**

» tuberosa. **T**

» verticillata. **T**

Peganum crythmoides. R

» Harmata. **R**

Pelargonium Endlicherianum. ///

Peltaria alliacea. Pr R

» turkestanica. **Pr R**

Pentstemon acuminatus. R

» albus. **R**

» arizonicus. **R**

» Bradbury gem. **V R**

» cæruleus. **V R +**

» carinatus. **R +**

» deustus. **R**

» diffusus. **R +**

» digitalis. **V R + Ab**

» glaber roseus. **R +**

» glaucus. **R**

» Gordoni splendens. **R +**

» gracile. **R**

» heterophyllus. **R +**

» humilis. **/// R B**

» hybridus hortensis (les meilleures variétés des jardins; excellentes plantes de décoration, fleurissant jusqu'en décembre).

» lævigatus. **+**

» linarioides. **/// R Bord**

» Murrayanus grandiflorus. **R +**

» ovatus. **V +**

» pubescens. **V + R**

» purpureus. **V R**

» pygmæus. **R Bord**

» Richardsoni. **R +**

» rubricaulis. **R +**

» scouleri. **R +**

» secundiflorus. **V R**

» unilateralis. **V R +** D'un bleu superbe.

» venustus. **R +**

» Watsoni. **R V**

Les Pentstemons sont les Digitalis de l'Amérique du Nord; bonnes plantes vivaces de plates-bandes ou rochers, très ornementales et fleurissant longtemps. On ne saurait trop en vanter la rusticité et la longue floraison; fleurs bonnes pour les bouquets. Il en est dont les teintes bleu d'azur rappellent les gentianes des Alpes. Faciles à élever de semis.

Pericome caudata. V R

Petalostemon candidus. R

» tenuifolius. **R**

Petasites albus. O

» niveus. **O**

Peucedonum alsaticum. Pr R

Phaca alpina. **R**
 » astragalina. **R**
 Phlomis alpina. **V R**
 » chrysophylla. **V R**
 » fruticosa. **R**
 » Lychnitis. **R**
 » Samia. **V R +**
 Phlox decussata, les meilleures variétés
 des jardins en mélange. **V +**
 » Douglasi. **R**
 » nivalis. **R**
 » subulata. **R**
 Phygelius capensis. **V R Ab**
 Physalis alkeltengi (Alkékenge). **Ar**
 » Franchetti. **R Ar**
 Physoclaina orientalis. **R O**
 Physostegia virginiana. **V +**
 » alba.
 Phyteuma canescens. **R**
 » carestia. **R**
 » comosum. **///**
 » globulariaefolia. **///**
 » hemisphaericum. **///**
 » Michellii. **R**
 » orbiculare. **Pr R**
 » pauciflorum. **///**
 » Scheuchzeri. **///**
 » scorzoneraefolia. **R**
 » spicatum. **O R**
 » Wagneri. **R**
 Pinguicula alpina. **T**
 » grandiflora. **T**
 » fongifolia **T**
 » Reuteri. **T**
 » vulgaris. **T**
 Pinus Cembro (Arolle).
 Pistachia Lentiscus (Lentisque).
 Pivoines en mélange.
 Plantago argenta. **R**
 Platycodon autumnale. **V + R**
 » grandiflorum. **V + R**
 » album.
 » Mariesi. **R V Pr**
 » à fl. blanches.
 » grandiflora.
 Ce sont les superbes campanules
 japonaises aux grandes fleurs fran-
 chement découpées et vivement
 colorées en bleu intense, blanc,
 opale ou azur. Très rustiques, très
 florifères (juillet-octobre), plantes
 de grand effet et premier ordre
 pour décoration plates-bandes et
 rochers (Mellifères). Faciles à éle-
 ver de graines.
 Podophyllum Emodi. **O**

Polemonium cœruleum. **R V Pr Ab**
 » album.
 » Berninæ.
 » carneum (belles fl. roses).
 » filicinum. **R**
 » pauciflorum. **R**
 » reptans. **R**
 » Richardsoni. **R**
 » Tanguticum. **R**
 Les Polémoines sont d'admirables
 plantes vivaces, formant de
 jolies touffes d'une verdure fine
 et gaie, et portant de beaux pani-
 cules de fl. bleues, blanches ou
 jaunes odorantes.
 Polygala chamæbuxus. **O R**
 » rupestris. **R ///**
 » Varedæ. $\frac{1}{2}$ **O R ///**
 Polygonatum multiflorum. **Med O**
 » verticillatum. **O R**
 » vulgare. **O Med**
 Polygonum Auberti.
 » Baldschuanicum.
 Pl. grimpantes de grande va-
 leur ornementale.
 » Bistorta. **H Pr Med**
 » Brunonis. **R**
 » capitatum. **R**
 » Emodi. **R**
 » Sieboldi. **V**
 » sphærostachum. **T**
 » vacciniifolium. **H R**
 » viviparum. **T**
 Potentilla alchemilloides. **R**
 » alpestris. **R**
 » ambigua. **R**
 » argentea. **R Pr**
 » atrosanguinea. **V R +** à fl. rouge
 vif.
 » aurea. **/// R**
 » bifurca. **R**
 » caulescens. **///**
 » Clusiana. **///**
 » crinita. **R**
 » Engadinensis. **R**
 » Fenzlii. **///**
 » Fragariastrum. **R Sous-bois. Ar**
 » fragiformis. **R**
 » frigida. **/// π**
 » fruticosa. **Arb R**
 » fulgens. **R**
 » glandulosa. **R**
 » gracilis. **R**
 » grandiflora. **R**
 » Hippiana. **R**
 » Hookeriana. **R +**

Potentilla Hortensis (var. hort. melang.). +
 » *laciniosa*. R
 » *Leopoliensis*. R
 » *Levieri*. R
 » *montenegrina*. R
 » *mooniana*. R
 » *multifida*. R
 » *Nepalensis*. + V R
 Superbe espèce à fleurs rose tendre veinées de carmin (de juin en décembre).
 » *Niponica*. R
 » *nitida*. /// R
 » *nivalis*. R ///
 » *nivea*. ///
 » *norvegila*. R
 » *ochroleuca*. R
 » *pedemontana*. R
 » *peduncularis*. R
 » *petiolulata*. ///
 » *pulcherrima*. R
 » *pygmaea*. R ///
 » *pyrenaica*. R
 » *recta*. R
 » *rupestris*. R
 » var. *grandiflora*.
Salesowiana. R H Med
 » *sanguisorbæfolia*. R
 » *saxifraga*. ///
 » *sibbaldi*. /// R
 » *speciosa*. R
 » *sulfurea*. R
 » *tanacetifolia*. R
 » *taurica*. R
 » *Tormentilla*. R H
 » *tridentata*. R
 » *valderia*. R
 » *virgata*. R
 » *viscosa*. R
 » *Visiani*. R
 » *Willmottiana*. V +
 » *Wrangeliana*. R

Pratia angulata. T R

Prenanthes purpurea. O

Primula acaulis. R Pr

» var. à fl. bleues. R

» *Allionii*. ///

» *amœna*. R Pr $\frac{1}{2}$ O

» *angustidens*. π

» *Arctotis*. ///

» *Asthore*. R T

» *Auricula* (type alpin). R ///

» *Auricula* (Auricules des jardins).

» *Aylin* (Lyssadell). T R

» *auriculata*. T $\frac{1}{2}$ O

Primula Aylini. T H

» *Balbisii*. ///

» *Beesiania*. R T

» *Bellunensis*. ///

» *Bullesii*. ///

» *Bulleyana*. R T

» *calycina* (glaucescens). /// N

» *capitata*. π

» *capitellata*. T

» *cachemiriana*. R $\frac{1}{2}$ O

» » *alba*.

» » *grandiflora*.

» » *hybrida*.

» *ciliata*. ///

» *Clusiana*. ///

» *Cockburniana*. R

» *commutata*. R ///

» *cortusoides*. O

» *crispata*. T R

» *daonensis*. π

» *darialica*. R T

» *decipiens*. ///

» *denticulata*. R

» » *alba*.

» » *grandiflora*.

» *dentiflora* (Andrews). T

» *discolor*. ///

» *elatiar*. Pr $\frac{1}{2}$ O

» » *grandiflora*. $\frac{1}{2}$ O

» » *Theodora* (Hybride spontané, entre les Pr. *elatiar* et *Julia*, qui a surgi en 1915 dans notre alpinum).

» *erythrocarpa*. R

» *farinosa*. H R T Pr

» » *grandiflora*.

» » *groenlandica*.

» *Flørkeana*. /// N

» *Florariensis*.

Espèce géante, hybride probable entre les Pr. *Beesiania* et « *Unique* ». Elle atteint 90 cent. de haut, a des tiges portant jusqu'à 10 étages de fleurs rose carné vif avec un œil jaune d'or au centre. Une seule pl. a fourni 14 tiges fl. l'été passé, dans un sol frais. T R

» *floribunda*. T R

» *Forbesi*. ^

» *frondosa*. H

» » *cachemiriana*.

» *goldlacet* (Hort). R

» *grandis*. H

» *Groenlandica*. T R

» *helodoxa*. T R

Primula hirsuta (très belle espèce à fl.

- carmin). /// **N R**
 » *integrifolia*. **R N**
 » *involucrata*. **R H**
 » *japonica*. **R ½ O**
 » *alba*.
 » *atrosanguinea*.
 » *lilacina*.
 » *purpurea*.
 » *splendens*.
 » *Julia*. **R N**
 » *kewensis*. ^
 » *var. farinosa*.
 » *latifolia* (*graveolens*). /// **N**
 » *leucophylla* **R**
 » *Lishangensis*. **T R**
 » *longiflora*. **T R**
 » *luteola*. **O R**
 » *Lyssadell hybride*. **H R**
 » *macrocalyx*. **R**
 » *magellanica*. **T R**
 » *malacoides*. ^
 » *alba*.
 » *marginata*. /// **N B**
 » *mollis*. **R**
 » *Mooreana*. **T R**
 » *Munroi*. **T**
 » *Murettiana*. /// **N**
 » *œnensis*. /// **N**
 » *officinalis*. **Pr**
 » *variétés*.
 » *Palinuri*. **R ///**
 » *Pallasi*. **R**
 » *patens* (type sauv. du Sieboldi). **O**
 » *pedemontana*. /// **N**
 » *Poissoni*. **H**
 » *prænisens*. ^
 » *pulverulenta*. **H**
 » *pulveral*. forme Edinburgh.
 » *purpurea*. **T**
 » *reticulata*. ½ **O T**
 » *Rhætica*. /// **N**
 » *rosea*. **H**
 » *grandiflora*.
 » *saxatilis* (cort. variété chinensis).
 ½ **O**
 » *scottica*. **T**
 » *sibirica chinensis*. **R T**
 » *Sibthorpi*. **R Bord**
 » *Sieboldi* (var. Hortie). **R O**
 » *Sikkimensis*. **H ½ O**
 » *sino-Listeri*. **T R**
 » *Smithiana*. **T R**
 » *sphærocephala*. **T R**
 » *stricta*. **T**
 » *suaveolens*. **R**

Primula Theodora. **R**

- » *uralensis*. **R**
 » *variabilis*, var. anglaises en mélange.
 » *Veitchi*. **R**
 » *venusta*. ///
 » *veris* (mélange des meilleures variétés anglaises). **Pr R Bord**
 » *veris* var. à fl. bleues (anglaises).
 » *verticillata*. ^
 » *viscosa*. /// **N**
 » *alba*.
 » *vittata*. **R**
 » *Wilseni*. **T**

Primevères en mélange.

Prunella grandiflora. **Pr Bord**

- » *purpurea*. **Pr Bord**
 » *incisa rubra*. Carmin très intense; floraison prolongée; pl. excell. pour tapisser le sol. **Pr R Bord**
 » *laciniata grandiflora*. **R (Pyrén)**

Pterocephalus (*Scabiosa*) *Parnassi*. **R s**

Putoria calabrica. **R s**

Pycnanthemum lanceolatum. **R**

Pyrethrum atosanguineum. **V**

- » *corymbosum*. **Ar R**
 » *cinerariæfolium*, le Pyrèthre à poudre insecticide. **Med**
 » *hybridum*. **V +**

Les *Pyrethrums* hybrides (fleurs roses, rouges, grenat, carmin, blanches, etc.) sont les meilleures d'entre les fl. à bouquets (juillet-oct.).

» *macrophyllum*. **R Ar**

» *Roseum*. **V +**

» *album*. **R +**

» à fl. doubles. **+**

» *Tschihatscheffi*. **Bord**

Ramondia pyrenaica. /// **N (Pyrén)**

» *rosea*.

» *serbica*. /// **N**

Ranunculus aconitifolius. **H R Sous-bois**

- » *alpestris*. /// **N**
 » *anemonoides*. **R**
 » *bilobus*. /// **N**
 » *creticus*.
 » *glacialis*. **T R**
 » *graminæus*. **R S**
 » *illyricus*. **R**
 » *millæfoliatus*. **R**
 » *monspessulanus*. **R**
 » *montanus*. **Pr R**
 » *parnassifolius*. **R S**
 » *pyrenæus*. **Pr R**
 » *rutæfolius*. **R**
 » *Seguieri*. **R ///**

Ranunculus Thora. R
 » **Traunfellneri. R N**
Rehmania angulata. R s
Reseda glauca. R (Pyrén)
 » **luteola. Pr Ar**
 » **odorata. O**
 » **suffruticosa.**
Rhamnus punsila. Arb
Rheum Emodi. V
 » **palmatum. V**
Rhodiola linifolia. ///
 » **rosea (Sedum Rhodolia). ///**
 » **rubra. ///**
Rhododendron chamæcistus. ///
 » **ferrugineum (La Rose des Alpes).**
 » **album.**
 » **hirsutum.**
 » **intermedium. R**
 » **Lapponicum.**
Rodgersia æsculifolia. H
 » **podophylla. H**
Rodhea japonica. O
Romanzoffia Sitchensis. T H
 » **Unalascensis. R**
Romneya Coulteri. V S
 » **hybrida. V S**
 » **trychocalyx. V S**
Rosa alpina.
 » **pimpinellifolia.**
 » **pyrenaica.**
 » **rubiginosa.**
 » **rubrifolia.**
Rosmarinus officinalis. R S
Rubus laciniatus. Gr
 » **saxatilis. R**
 » **xanthocarpus. R**
Rudbeckia bicolor. V +
 » **conspicua. V +**
 » **fulgida. V +**
 » **hirta. V +**
 » **laciniata. V +**
 » **nitida. V +**
 » **occidentalis. V +**
 » **purpurea. V +**
 » **grandiflora. V +**
 » **pinnata. V +**
 » **var. Soleil d'or.**
 » **speciosa.**

Les Roubecques sont d'entre les meilleures et les plus précieuses des pl. vivaces; leurs fleurs, très apparentes, en capitules jaune et noir chez la plupart, rouge sombre ou carmin chez intermedia, purpurea, durent longtemps et

sont excellentes pour la fleur coupée. Culture des plus facile.

Ruellia ciliosa. R
Rumex alpinus (Remède contre le cancer).
 » **flexuosus (feuillage brun foncé). R**
Ruscus aculeatus. Arb
 » **hypophyllum. Arb**
 » **racemosus. Arb**
Ruta graveolens. R Ar Med
 » **montana. ^**
 » **patavina. R s Ar**
Sagina subulata. R
 » **Linnæi. R**
Salix reticulata. R Arb
 » **retusa. R Arb**
Salvia azurea grandiflora. V
 » **candelabrum. R**
 » **cypria. R**
 » **glutinosa. R O Sous-bois.**
 » **Horminum. Med**
 » **officinalis. R Med Ab Ar**
 » **à fl. blanches.**
 » **à fl. rouges.**
 » **major.**
 » **patens. ^ Du plus beau bleu.**
 » **pratensis. Pr R Ab**
 » **à fl. blanches.**
 » **ringens. R Ab**
 » **scabiosæfolia. R Ab**
 » **Sclarea. R s Ar Med Ab**
Samolus Valerandi. H T
Sanguinaria canadensis. O
Sanguisorba canadensis. H
 » **Vallistellinæ. H**
Sanicula europæa. Sous-bois.
 » **Marylandica. Sous-bois.**
Santolina chamæcyparissus. Pr Med
 » **rosmarinifolia. R**
Saponaria bellidifolia. R
 » **Boissieri. ///**
 » **cæspitosa. /// R (Pyrén)**
 » **cypria. /// R**
 » **glutinosa. Ar**
 » **lutea. ///**
 » **ocymoides. /// R Pr Ar**
 » **var. alba.**
 » **rosea.**
 » **splendens.**
 » **officinalis. Med Ab Ar**
 » **à fl. doubles.**
 » **pulvinaris. ///**
Sarcocapnos speciosa. ///
Sarracenia purpurea. T
Satureya intermedia. R
 » **diffusa. R Bord Ab**

Satureya Hortensis (Sariette). R Ab» montana. /// **R Ar Ab****Saussurea alpina. R ///**» chinensis. **R**» decurrens. **R**» depressa. **R**» discolor. **R ///****Saxifraga aconitifolia. N (1)**» adscendens. **R**» ægylops. **R**» æmula. **R**» affinis. **R**» aizoides. **H ///** **R**» Aizoon. /// **R**» ajugæfolia. **H (Pyrén)**

» Alberti. ///

» Allionii. **R Bord ½ O**» altissima. /// **R**» ambigua. /// **R**» anceps. ½ **O**» androsacea. **H**» aphylla. /// **N π**

» apiculata. ///

» » micrantha. ///

» » superba. ///

» aquatica. **T (Pyrén)**» aretioides. /// **(Pyrén)**

» Arwrightii. ///

» aspera. ///

» atropurpurea. **R Bord**» augustana. /// **N**» australis. /// **R**» autumnalis. **H**» Balcana. /// **R**» Baldoni. /// **R**

» Bertoloni. ///

» Bathonensis. **R**» biflora. /// **N π**» blepharophylla. /// **N π**

» Borissi. ///

» Boryi. ///

» » major. ///

» Boydei. ///

» brevifolia. /// **R**» bronchialis. **R**» Brunoniana. **R π**

» bryoides. ///

» Burnati. ///

» Burseriana. ///

» cæsia. ///

» cespitosa. **R Bord**» » var. rosea. **R Bord**» canaliculata. **R ///**» capitata. **R (Pyrén)****Saxifraga carinthiaca. ///**

» carniolica. ///

» carpathica. **R T**» cartilaginea. /// **R**» catalaunica. /// **R**» cernua. **T**

» cervicornis. ///

» Cherrytree. **R**» Clusii. **T (Pyrén)**» cochlearis. /// **S R**» Colvillei. **R**

» coniferæ. ///

» Corbariensis. ///

» cordifolia. **R**

» coriophylla. ///

» corsica. **R**

» Cotyledon. ///

» » hybrida.

» crustata. /// **R**

» » major.

» cuneata. ///

» cuneifolia. **R O Bord**» cymbalaria. **O**

» cymosa. ///

» dalmatica. /// **R**» decipiens. **Bord**

» » var. grandiflora hybrida.

» » var. lutescens.

» Delavayi **R**

» Delphii. ///

» demissa. **H**» dentata. **R**» diapsenioides. /// **π**» diversifolia. **T H**» elatior. /// **R**

» Elisabethæ. ///

» Escheri. **R**» exarata. **R**

» Facchini. ///

» Ferdinand-Coburgi. ///

» flagellaris. **T R**» flavescens. /// **R**» florulenta. /// **N**» Forbesi. **R**» Fortunei. **R ^**

» Friedrich-Augusti. ///

» Gaudini. /// **R**» gemmifera. **R**» Geum. **R ½ O Bord (Pyrén)**» geranioides. **R**

» Gibraltarica. ///

» globulifera. /// **R**

» Godselfii. ///

» granulata. **T R**

Saxifraga Grisebachii. ///

- » Guthrieana. **R**
- » Haagii. ///
- » Hausmanni. /// π
- » hederacea. /// π
- » Hedraëantha. ///
- » heucherifolia. **R N**
- » Hieracifolia. **H**
- » Hirculus. **H T**
- » Hostei. ///
- » Huetti. **O**
- » hybrida carminea. **R**
- » hypnoides. **R Bord**
- » intricata. **R**
- » iratiana. **R**
- » irrigua. **R ||**
- » Islandica. **R**
- » juniperina.
- » Kinleyi. //
- » Kolbii. ///
- » Kolenatiana. /// **R**
- » Kotschyi. ///
- » Kyrillii. ///
- » Labradorica. **R**
- » lævis. /// **N**
- » Lantoscana. /// **R**
- » lasiophylla. **R O**
- » latina. /// **N**
- » lingulata (vrai). /// **R**
- » Lloyd-Edwards. **R**
- » longifolia. /// **R (Pyrén)**
- » Ludoviciana. ///
- » luteo-purpurea. ///
- » luteo-viridis. ///
- » macedonica. ///
- » Mac Nabiana. /// **R**
- » mædia (*calyciflora*). ///
- » marginata. /// **R**
- » micranthidifolia. **R H**
- » murithii. /// **N**
- » muscoides. **R**
- » mutata. **R /// H**
- » nervosa. **R**
- » nivalis. **R N**
- » Obristii. ///
- » ochroleuca. ///
- » oppositifolia. /// **N R**
- » pyrenaica. (**Pyrén**)
- » pectinata. /// **R**
- » pedatifida. **R**
- » pedemontana. /// **N**
- » peltata. **H**
- » pennsylvanica. **H**
- » Petraschii. ///
- » petræa. ///
- » planifolia. ///

Saxifraga porophylla. ///

- » Portæ. ///
- » primuloides. **O R**
- » Probyni. ///
- » Prostii. **R Bord**
- » pseudo-sancta. ///
- » pubescens. **R O**
- » pulchella. **R**
- » retusa. /// **N**
- » Reyheri. **R**
- » Rhei superba. **R**
- » robusta. ///
- » Rocheliana. ///
- » var. purpurea. ///
- » Rossii. ///
- » rosularis. ///
- » rotundifolia. **O**
- » Salomoni. ///
- » sancta. ///
- » sarmentosa. **R**
- » scardica. ///
- » var. obtusa.
- » sedoides. /// **O**
- » Seguiéri. /// **N**
- » sempervivoides. ///
- » splendens. ///
- » spontemica. **R**
- » spruneri. ///
- » squarrosa. ///
- » stabiana. ///
- » stellaris. **H T**
- » stenoglossa. ///
- » stenopetala. **R**
- » Sternbergi. **R**
- » Sturmiana. ///
- » supra aizoides. **T**
- » Taygetaya. /// **R**
- » Tellimoides. **H ½ O**
- » tenella. **R**
- » Thessalica. ///
- » Tombeanensis. ///
- » trifurcata. ½ **O Bord**
- » umbrosa. **Bord O (Pyrén)**
- » Valdensis. /// π
- » varians. **R**
- » villosa. **R**
- » Vochinensis. ///
- » Wildeana. **R**
- » Zelebori. /// **R**
- » Zimeterii. ///

Scabiosa caucasica. R V +

- » alba grandiflora.
- » columbaria. **R Pr**
- » cretica. **R**
- » graminifolia. **R s**
- » Lagodechiana. **R**

Scabiosa lyratifolia (fl. grenat vif). **R Pr**

» ochroleuca. **R** (fl. jaune paille).

» Olgæ. **R**

» petræa. **R**

» vestina. **R**

Schivereckia podolica. **R**

Scilla nutans. **O** Sous-bois.

Scolymus grandiflorus. **R s**

Scrophularia Hoppii. **R Ar** (Juratense).

» trifoliata. **R**

Scutellaria alpina. **R Bord Ar**

» » à fl. blanches.

» altissima. **R**

» Baikalensis. **R** (macrantha).

» cordifolia. **R**

» lupulina. **R**

» orientale. **R**

» tuberosa. **R**

Sedum acre. **/// Ar Bord**

» acutifolium. **R**

» aizoon. **R**

» album. **Ar Bord**

» alpestre (repens). **R O**

» altissimum. **R Ar**

» anglicum. **///**

» annuum. **O ///**

» anopetalum. **R**

» asiaticum. **R**

» atratum **O**

» brevifolium. **/// (Pyrén)**

» Cepæa. **O**

» cœruleum. **O**

» coloniensis. **///**

» corsicum. **/// R**

» crenatum. **R**

» dasiphyllum. **/// R**

» divergens. **///**

» elegans.

» Emphorbivides. **R**

» Fabaria. **R**

» Forsterianum. **R**

» glauduliferum. **///**

» Greigii. **R**

» hirsutum. **/// (Pyrén)**

» Hispanicum. **O**

» kamschaticum. **O Bord Ar**

» Laggeri. **R**

» Lydium. **R**

» majelense. **///**

» maximowiczii. **R Ar**

» maximum. **R Ar**

» mellitulem. **^**

» Middendorffianum. **R**

» mortanum. **R**

» nicaense. **///**

» obtusifolium. **R**

Sedum olympicum. **R**

» oppositifolium. **R Bord Ar**

» pilosum. **||**

» populifolium. **R**

» pulchellum. **R**

» purpurescens. **R Ar**

» reflexum (rupestre). **R Ar**

» Selskianum. **R Ar**

» Sempervivum (*Cotyled Semp.*). **R**

» spectabile. **R V Bord**

» » splendens.

» spurium. **R Bord Ar**

» » splendens. **R**

» Stahlîi. **R**

» stellatum. **R**

» stoloniferum. **R**

» Telephium. **R**

» villosum. **H**

Sedum en mélange.

Sempervivum arachnoideum.

» acuminatum.

» atroviolaceum.

» austriacum.

» bungeanum.

» calcareum.

» ciliolum.

» Comoli.

» frigidum.

» debile.

» glaucum.

» grandiflorum.

» Heuffeli.

» Juratense.

» Kapaornikense.

» mettenianum.

» montanum.

» ornatum.

» patens.

» pyrenaicum.

» Requierii.

» robustum.

» rubellum.

» rupicolum.

» sabaudum.

» spinulifolium.

» tectorum.

» tenellum.

» Thomayeri.

» tomentosum.

» triste.

» Valesiacum.

» Webbianum.

» Wulfeni.

» mélange de plusieurs espèces.

Senecio abrotanifolius. **R**

» adonidifolius. **R**

Senecio aurantiacus (Cineraria aurant). R

- » **carniolicus. R**
- » **clivorum. R V**
- » **cordatus. R O**
- » **coriaceus. R**
- » **Doronicum (soleil des Alpes). R**
- » **Doria. V**
- » **Fuchsii. Sous-bois.**
- » **incanus. /// R T**
- » **Jacobæus. R H**
- » **jacquinianus. O Sous-bois.**
- » **leucophyllus. π ///**
- » **macrophyllus (pl. géante). V**
- » **othonæ. R**
- » **palmitifidus. R**
- » **platyglossus. R**
- » **pulcher. R**
- » **quinquæligulatus. R**
- » **sarracenicus. O Sous-bois.**
- » **sulfureus. R**
- » **Tanguticus. Sous-bois.**
- » **Tyrolensis. R**
- » **uniflorus. π**
- » **Wilsonianus. Sous-bois.**

Serratula nudicaulis. R

Seseli cæspitosa. R Ar

- » **gummifer. Pl. à fl. bleuâtre. R Ar**
- » **glaucum. Ar Pr**

Sibbaldia procumbens. × R

Sideritis Eubæa. R Ab

- » **hissopifolia. R Ar**
- » **taurica. R Ab**

Silene acaulis. /// R

- » **alba.**
- » **grandiflora.**
- » **alpestris. R ½ O**
- » **alpina. /// Ar**
- » **armeria. O Ar**
- » **splendida.**
- » **asterias. Ar R**
- » **grandiflora.**
- » **Bertoloni.**
- » **bryoides. /// R**
- » **Campanula. ///**
- » **ciliata. R (Pyrén)**
- » **compacta. ///**
- » **cordifolia. ///**
- » **Correvoniana. R ///**
- » **dinarica. R**
- » **Drummondi. R**
- » **exscapa. /// R**
- » **fimbriata. R V**
- » **Legionensis. /// R**
- » **Lerchenfeldiana. R**
- » **maritima. /// R**
- » **monachorum. /// N**

Silene odontopetala. R

- » **oreades. R**
- » **otites. Ar**
- » **pudivunda. /// R N**
- » **pusilla. /// N**
- » **quadrifida. /// N**
- » **Reichenbachiana. R**
- » **rupestris. /// R ×**
- » **saxifraga. R Ar**
- » **Schafta. R /// Bord Ar**

L'une des rares plantes saxatiles d'automne; fl. d'un carmin vif, culture facile.

- » **valesia. Ar**
- » **Zawadsky. R /// Ar**

Silphium terebinthinaceum. V

Sissimbrium strictissimum. Ar

Sissirinchium anceps. Ar

Smilacina racemosa. O

- » **stellata. O**

Smilax aspera. Gr s

Sobolewsia clavata. R

Solanum Dulcamara. R Med

- » **rubrum. Med**

Soldanella alpina. R T

- » **montana. R T**
- » **pusilla. R T**
- » **pyrolæfolia. R T**

Solenanthes apenninus. R Ar

Solidago alpestris. R

- » **arctica. R**
- » **axillaris. R**
- » **canadensis. V Ab**
- » **humilis. R**
- » **puberula. V Ab**
- » **pygmæa. R**
- » **reflexa. Ab +**
- » **Riddeli. V**
- » **rigida. Ab**
- » **rigidiscula. Ab**
- » **Shortii. V + Ab**
- » **spectabilis. V +**

Spartium junceum. Le beau genêt d'or du Midi. Ab Ar R

Spiræa Aruncus (Reine des Bois). S.-bois.

- » **cæspitosa. /// R**
- » **filipendula. H**
- » **Kamtschatica. H**
- » **palmata. H**
- » **Ulmaria. Med H**

Stachys glutinosa. R

- » **lanata. Bord Ab Ar**
- » **lavandulaefolia. R**

Statice latifolia. V R + Ar

- » **Suworowi. O**
- » **tatarica. R**

Statice des Canaries (Statice en arbre).

- » *arborescens.*
- » *brassicæformis.*
- » *hybrida.*
- » *imbricata.*
- » *microphylla.*
- » *macroptera.*
- » *Perezii.*
- » *Perezii* × *imbricata.*
- » *puberula.*

Ces superbes plantes s'élèvent très facilement de graines. Non rustiques chez nous, elles constituent une précieuse décoration pour serres froides et appartements, de grandes panicules de fleurs bleues et blanches.

Stipa gigantea. R

- » *pennata.* R Ar

Stobæa membranifolia. V Ab

- » *radula.* V Ab

Streptopus amplexifolius. O

Stylophorum diphyllum. O

- » *japonicum.* O
- » *lasiocarpum.* O

Swertia longifolia. T

- » *perennis.* T

Sylibum Marianum. Ar Med

Symphandra armena. /// R

- » *Hoffmanni.* /// R

Synthis reniformis. R O

Tamaris æstivalis. Arb

- » *Kaschgarica* (mûri pour la première fois à Floraire).

Tamus communis. O Med Gr

Tanacetum vulgare. Med Ab V +

Telekia speciosa. V + Ab

- » *speciosissima* (vrai). /// N

Telephium imperati. /// S Ar

- » *orientale.* S Ar

Tetragonolobus siliquosus. H Pr

Teucrium Chamædrys. R Bord Ab Ar Med

- » *aureum.* R ///
- » *flavum.* R ~
- » *lucidum.* R /// Ar
- » *marum.* /// R
- » *montanum.* /// R Ar
- » *multiflorum.* R
- » *orientale*, à fl. très élégantes. R Ar
- » *polium.* R Bord Ar R
- » *pseudo-Chamædrys.* R Bord Ab Ar
- » *pyrenaicum.* R Bord (Pyrén)
- » *Scorodonia.* Med Sous-bois.

Thalictrum aquilegifolium. R O S.-bois.

- » *atropurpureum.* R O Sous-bois.
- » *Chelidoni.* R

Thalictrum Delavayi. V R +

- » *dipterocarpum.* V R +
- » *Fendleri.* R
- » *foetidum.*
- » *glaucum.* H R V
- » *majus.* R Ar
- » *minus.* R Ar
- » *odoratum.* R (Pyrén)
- » *rubellum.* R
- » *saxatilis.* /// R Ar

Thlaspi bellidifolia. R ///

- » *cepæfolia.* R ///
- » *densiflora.* R
- » *Riverstoni.*
- » *rotundifolia.* /// T
- » *violascens.* R

Thymus serpyllum. R Med Ab Ar

- » *vulgaris.* R Bord Ab Ar

Tiarella cordifolia. O

Tofieldia calyculata. H T

- » *glacialis.* H T

Tolmiea Menziesii. O

Towsendia Wilcoxiana. ///

Trachelium cœruleum. /// R Ab

Tradescantia virginica. V

Trientalis europea. O π

Trifolium alpinum. Pr R Ab Med s

- » *Badium.* R Pr
- » *rubens.* Pr

Tritoma, voir *Kniphofia*.

Trollius asiaticus. H

- » *aurantiacus.* H
- » *caltheoides.* H
- » *europæus.* H Med Pr
- » *hybridus* (variété superbe). H
- » *pumilus.* R
- » *yunnanensis.* H

Tropæolum pentaphyllum. R

Trycirtis macropoda.

Tulipa greigii. R s

- » *marjoletti.* R s
- » *praestens* (Tulipe branchue).

Tunica saxifraga. /// Ar R Pr

- » *alba.*

Tussilago Farfara (Taconnet). Med Ar

Ulex europæus (ajonc). Arb

Umbilicus pendulinus. ///

- » *semenovi* ///
- (v. en outre *Cotyledon*).

Uniola latifolia. V +

Vaccinium Myrtillus (Myrtille). T

- » *uliginosum.* T R
- » *Vitis-Idæa* (Airelle). T R

Valeriana alliarifolia. R +

- » *celtica.* π
- » *dioica.* Ar

Valeriana globulariaefolia. /// (Pyrén)

- » integrifolia. R
- » longiflora. ///
- » montana. R ///
- » officinalis. H Med
- » pyrenaica. R (Pyrén)
- » Saliunca. /// R
- » supina. /// R
- » tripteris. R ///

Vella spinosa. ///

Veratrum album. R Med

- » californicum. R
- » nigrum. R

Verbascum Lychnitis. Ar Ab

- » mucronathum. V Ar
- » pulverulentum. V Ar Ab
- » Olympicum. V Ar
- » Florariensis. R
- » Phœniceum. R
- » Thapsus. (Bonhomme). Med Ab
- » à fl. blanches.
- » Willmotti. R V
- » Wilsoni. V Ar Ab

Verbena venosa. R

- » officinalis. Med

Vernonia altissima. V +

Veronica Allionii. /// R Bord

- » alpina. /// N
- » aphylla. /// R
- » armena. R
- » austriaca. R Bord Pr
- » bellidioides. R
- » Biebersteiniana. R
- » caucasica. R Bord
- » Chamædrys. R Bord
- » crassifolia. R V +
- » foliosa. R
- » fruticulosa. /// R
- » gentianoides. R Bord
- » incana. R Bord
- » longifolia (maritima). V + Ab
- » alba.
- » rosea.
- » melissaefolia, pinguaefolia, subsessilifolia, Trahernae. R
- » multifida. R
- » officinalis. O Sous-bois. Med
- » orchidea. R Ar
- » orientalis. R
- » paniculata. V + R Ab
- » pectinata. R
- » peduncularis. R
- » ponæ. R (Pyrén)
- » prostrata. R Ar Bord
- » satireyoides. /// R
- » saxatilis. /// R

Veronica saxatilis à fl. blanches.

- » serpyllifolia. R
- » spicata. R S Ar
- » spuria. R Ab
- » stenophylla. R
- » tenuifolia. R
- » Teucrium. R Pr Ab
- » Traversi. R Arb +
- » urticifolia. O
- » virginica. V Ab
- » Whitalli. R Bord

Vesicaria utriculata. /// Ar Ab

Viola altaica. R

- » arenaria. R
- » atlantica. R
- » Bertolini. R
- » biflora. O R T ///
- » Bosniaca. R
- » calcarata. R
- » alba.
- » grandiflora.
- » campestris. R Pr
- » canadensis. R
- » cenisia. /// R π
- » chinensis. R
- » cognata. R
- » cornuta. R Bord Pr (Pyrén)
- » à fl. blanches.
- » var. « Admiration ».
- » var. « Firmament ».
- » var. grandiflora.
- » var. « La Reine ».
- » var. lutea.
- » var. « Perfection ».
- » var. « Perfection alba ».
- » var. à fl. roses.
- » var. « Sensation ».
- » mélange de toutes coul.

Les Pensées vivaces de ce groupe cornuta sont des plus faciles à élever et à cultiver; elles fleurissent de mai jusqu'en hiver et sont des plus précieuses d'entre les pl. à garnitures de rochers, plates-bandes, corbeilles, etc.

- » cucullata. R Bord
- » delphinifolia. R
- » dissecta. Pr Sous-bois.
- » elatior. H R
- » Florariensis (variété hybride, voisine de rothomagensis et qui fleurit perpétuellement; l'une des meilleures fl. alpines). R /// Bord Ar
- » gracilis. R
- » lord Nelson.

Viola Jovi. R
 » latisepala. R
 » lutea. R (fleurit toute l'année).
 » grandiflora.
 » mirabilis. R
 » multifida. R
 » munbyana. R
 » odorata. R
 » palmaris. R
 » palustris. H
 » Papilio. Voisine de Florariensis.
 » pinnata. R
 » pratensis. R
 » pubescens. O R
 » pumila. R
 » purpurea. R

Viola rothomagensis. R /// Fl. tout
 l'année.
 » splendida. R Bord
 » splendida hybrida.
 Superbe Pensée des Alpes reçue
 des Abruzzes et qui fleurit long-
 temps.
 » uliginosa. R
 » Valderia. /// R
 Vittadenia triloba. ///
 Wahlenbergia lobelioides. R
 » Hederacea. T R N
 Wulfenia carinthiaca. /// N
 Wyettia angustifolia. R +
 Xanthoceras sorbifolia. Arb

Nous regrettons d'avoir à constater que les graines d'Aquilegia alpina fournies l'an dernier ont été mélangées par suite d'une inadvertance d'un employé avec des vulgaris et que les Nepata Mussini et macrantha que nous avions reçues d'une grande maison de l'étranger, aient été fausses.

EN SOUSCRIPTION DÈS CE JOUR A FLORAIRE :

- H. CORREVON. — *Champs et Bois fleuris*, avec 75 planches coloriées (dont 50 nouvelles) de M^{lle} Rivier (faisant suite au volume *Fleurs des Champs et des Bois*) 30 fr.
 Prix de souscription jusqu'au 1^{er} Mai. 25 »
- H. CORREVON. — *Album des Orchidées d'Europe*, 2^{me} édition entièrement revue et augmentée, prix de souscription 25 fr.

Gardening Books

Of the 21 books Mr. CORREVON has published on gardening matters, more than half of them are already exhausted. The continual and pressing demand for them has decided the author to reproduce three of them in one volume which forms a complete summary of what has been already published.

This makes a big volume in-12, illustrated, of 491 pages.

LES

PLANTES des MONTAGNES et des ROCHERS

FOUGÈRES et ORCHIDÉES RUSTIQUES

Leur Culture dans les Jardins

Contents of the book :

Préface.

- Chap. I. — Les plantes dans les montagnes. Leur caractère particulier, leur nature ; leurs conditions d'existence.
- » II. — Acclimatation, semis et culture des plantes de montagne.
- » III. — Cultures spéciales. Cultures dans le sphagnum, en terrines, en baquets ; la tourbière et la moraine.
- » IV. — Les plantes silicicoles ou calcifuges.
- » V. — Les plantes saxatiles et murales ; les murs fleuris.
- » VI. — Construction des rocailles.
- » VII. — Jardins alpins et jardins botaniques alpins.
- » VIII. — Liste des plantes de montagnes, cultivées dans les jardins. Leur indigénat, l'époque de leur floraison, leur description sommaire avec la culture convenant à chacune d'elles.
- » IX. — Floraire. L'ombrosum ; toit fleuri ; gazons fleuris ; cultures sur radeaux.
- » X. — La fougeraie.
- » XI. — Les orchidées de pleine terre.
- » XII. — Cactées rustiques.
- » XIII. — Les lys.
- » XIV. — La « Florarina ».
- Index alphabétique des genres du chapitre VIII.
- » des chapitres X, XI, XII et XIII.
- » des noms français.
-

Price : **15 francs.** To be had at Floraire.

Liste des Ouvrages de M. H. Correvon :

Les plantes des Alpes. Genève 1885	Epuisé
Les Fougères rustiques. Genève 1890	»
Les orchidées rustiques. Genève 1893	»
Le jardin de l'herboriste. Genève 1896	»
Flore coloriée de poche. (1 ^{re} et 2 ^{me} éditions)	»
Flora tascabile. (1 ^{re} et 2 ^{me} éditions)	»
Les plantes alpines et de rocailles.	»
Les Fougères de pleine terre.	»
Les Iris dans les jardins. (Correvon et Massé)	Fr. 6 —
Nos cimetières. (Publié par les soins de la commission d'art public)	Epuisé
Culture des plantes alpines dans le Sphagnum.	»
Della cultura delle piante alpine nelle regioni secche e calde.	Fr. 1 —
Album des Orchidées de l'Europe. (En réimpression)	»
Atlas de la Flore alpine. (Edité par les soins du Club alpin)	Epuisé
Fleurs et Montagnes. Un volume de poésies	»
Par monts et par vaux. (Courses de montagnes)	»
Nos arbres. Un volume in-8 ^o , richement illustré	»
La Flore alpine. Un volume richement illustré (2 ^{me} édition, entièrement revue et transformée)	Fr. 30 —
The Alpine Flora, translated into english by Mr. E. W. Clayforth; a superb vol. with 180 pictures of alpine pl. in watercolours	Fr. 30 —
Alpenblumen, mit 180 colorierten Tafeln	» 30 —
Fleurs des champs et des bois; 100 planches représentant 180 plantes des champs, des bois, des murs, peints par M ^{lle} Rivier. C'est l'un des meilleurs livres qui ait jamais été publiés sur le sujet	Fr. 30 —
En souscription: 2 ^{me} volume Fleurs des champs et des bois, etc.	» 30 —
Les plantes des montagnes et des rochers	» 15 —
Plantes et santé, publié en 1917 (sera réédité prochainement)	Epuisé
Nos arbres dans la nature, 100 planches coloriées	Fr. 30 —
Unsere Bäume, mit 100 colorierten Tafeln	» 30 —

Les volumes de M. H. CORREVON ont remporté le prix d'honneur aux deux Expositions nationales suisses de 1896 et 1914 et un grand nombre de médailles d'or et d'argent, etc.

The books of Mr H. CORREVON have got the « Prix d'honneur » in the National Swiss Exhibitions of 1896 and 1914, and a great number of diplomes, of gold and silver medals and of distinctions.



